



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

BRUBUS

IN

613.

2/3

B 85

R

DE RATIONE VICTVS

IN SINGVLIS FEBRIBVS

secundum Hippocratem,

IN GENERE ET SIGILLATIM

LIBRI III.

AVTHORE BRVDO LVSITANO

Medico, Dionysij filio.



VENETIIS. MDLIX.

Soy de la Librería
del Colegio
de la Concepcion
de Alcalá.

CAPITULUM
LIBRORVM BRVDI
LVSITANI
DE RATIONE VICTVS
Febricitantium.



LIBRI PRIMI.



Is ceptionem continet, an crasso
uictu alendi sint acute febricitan-
tes, ut arbitratus est Petronas,
pro quo variae rationes hic adfe-
runtur. Cap. 1

Quod tenui uictu alendi sunt acu-
te febricitantes, iuxta rationalium medicorum
sententiam. Cap. 2

Ostendit quid per crassum, tenuem, exacte tenuem,
tenuissimum, ultimo tenuissimum, uictum Hipp.
intelligat. Cap. 3

Ostendit qualiter sint intelligendae crassi, symmetri,
& tenuis uictus notiones, quas Galenus primo
Aphorismo assignauit. cap. 4

Locum citat Galeni à quo ostenditur qualiter intel-
ligenda sit tenuis uictus ratio. cap. 5

Quod uictus forma à robore uirtutis, & à distantia
status sumenda sit. cap. 6

Rationes eorum qui à constitutione morbi, & à ro-

LIBRI I.

bore uirtutis, uictus formam sumendam esse opinantur. cap. 7

Quod in multis locis Hippocrates secundæ positioni consentit in inuestigatione formæ uictus. cap. 8

Non satis esse ad rectam formæ uictus inuentionem, uirtutis robur, & morbi constitutionem considerare, sed ijs præcognitionem status adiungendam esse. cap. 9

Iuxta status distantiam, singulis morborum acutorum conuenientem elicere uictus formam docet. cap. 10

An medico liceat quatuor dierum abstinentiam febricitantibus aliquando consulere. cap. 11

Virtutis imbecillitas præsens, & quæ in posterum futura erit, è quibus sit cognoscenda. cap. 12

Quo nam signo discernatur morbus qui ad quartum terminari debeat. cap. 13

Acuti morbi quo maxime deprehendantur signo, & quæ nam sit acutarum febrium leuissima, & quem habeat terminum. cap. 14

E quibus signis, morbum ad septimum & ad undecimum terminandum fore sciamus. cap. 15

Parum referre ad rectam formæ uictus inuentionem, an terminus diebus intermedijs accidat. cap. 16

Quænam febris intra quartum, & quæ intra septimum, undecimum, & quartumdecimum terminentur. cap. 17

An à statu, uel à crise, uel à termino uniuscuiusque morbi, quem à symptomatibus sumendum diximus, uictus ratio sumenda sit. cap. 18

CAPITULA

Tempora morborum tripliciter distingui. cap. 19

*Quotupliciter ab Hippocrate crisis nomen accipiat-
tur: & tres esse symptomatum primas causas. ca. 20*

*De qua status acceptio intelligendus sit aphorismus,
Contemplari igitur oportet aegrotatem si sufficiat
cum uictu ad statum aegritudinis, &c. cap. 21*

*Quod in ijs symptomatibus quae morbum insequun-
tur, cum ad maximam perueniunt magnitudinem,
statum esse intelligere oportet. cap. 22*

*Quod cum duo sint quae incremento symptomatum
finem imponant, nempe ultimum resistentiae natu-
ra, & perfecta morbi coctiones terminum non à
coctione, sed à robore uirtutis & symptomatum
magnitudine accipiendum fore ostendit. A qui-
bus ultimum resistentiae accipitur natura. cap. 23*

*Quod primus Hippocra. post assiduas observationes
iuxta symptomatum differentias, in singulis mor-
bis terminos, hoc est ultimum resistentiae naturae
diffiniuit. cap. 24*

*Statum, à quo uictus formam inuestigandam docuit
Hippocrates in aphor. Contemplari igitur oportet
&c. terminus esse ad quem usq; laborantis uir-
tus morbi acumen citra aliquam quatuor cricum
ferre possit. cap. 25*

*Quod uictus ratio conualituris pariter & morituris
adhibenda sit. cap. 26*

*Quod duae aliae sint morborum constitutiones, quae ui-
ctus rationem ualde dissimilem à iam dicta expo-
scant. Cap. 27*

L I B R I . I I .

In morbis ijs qui ab initio statim florent & uigent, non à distantia status, sed à coctione morbi uictus rationem sumendam esse ostendit. Cap. 28

Quotupliciter uirtus urgeat, & signa, per quæ uirtutem maximè, multum, & parum urgentem dignoscere possimus. Cap. 29

Quotupliciter morbus urgeat. Cap. 30

Tabella, qua facile quiuis in singulis morbis conuenientem uictus formam inuenire possit. Cap. 31

L I B R I S E C V N D I .

A quibus quantitas uictus sumatur. Cap. 1

An melius sit ad id quod magis est accedere, quàm ad minus, ubi à iusto modo sit abscedendum. Cap. 2

An forma uictus seruāda sit à morbi initio ad statum usque, & quantitas mutanda, an e contra. Cap. 3

A quibus numerus oblationis sumatur. Cap. 4

A quibus sumatur qualis uictus febricitantibus sit exhibendus. Cap. 5

An uictus affectum & eius causam respicere debeat. Cap. 6

An uictus opponi debeat intemperiei æquali gradu contrariæ qualitatis. Cap. 7

A tribus qualitatem uictus sumi. Cap. 8

A quibus sumatur quando exhibere cibum febricitantibus debeamus. Cap. 9

Eorum quæ de prisana Hippocrates scripsit nonnulla sunt

CAPITULA

sunt alijs cibarijs communia, & aliqua ptisanę peculiararia. cap. 10

Vbi mulsæ, ubi oxymelite utendum sit. cap. 11

A quibus ratio potus qui ægrotantibus ministrandus sit sumatur. cap. 12

Quod Lusitani medici & Hispani methodum Hippocratis in administratione uictus non insequantur. cap. 13

Minoratiuam euacuationem quę per pharmacum fit non esse semper administrandam in initijs febriũ putridarum. cap. 14

Qui inter initia morborum tenui magis uictu utuntur, cùmque prope statum peruentum est, solidiori, in damnum ægrotantium grauiter peccant. cap. 15

Uictus rationem quam medici Angli obseruant præceptis artis medicę magis consentire. cap. 16

Anglis ægrotantibus non esse tenuem uictum offerendum, sumpta indicatione à consuetudine, regione, & cœli temperie. cap. 17

Anglos uitiosis aut semicorruptis humoribus abundare, non crudis. cap. 18

Ægrotantibus Anglis tenuem uictum ob id ministrare ut redundantes in eorum uentriculis humores absumentur, errorem esse. cap. 19

LIBRI III.

LIBRI TERTII.

- Causo legitimo quis uictus competat* Cap. 1.
Causo notho seu spurio conueniens uictus qui sit.
 cap. 2
Quid Hippocr. per attractorias intelligat sorbitiones. cap. 3
Victus quos recentiores medici tradidere, causo non conuenire ostendit. cap. 4
Quis uictus synochys febribus competat. cap. 5
Inconuenientes esse uictus synochis, quos recentiores medici tradunt. cap. 6
Victum tertianæ continuæ conuenientem inquit. cap. 7
Contra exhibentes assa gallinaceorum hepata, in feb. continuis. Item cibum ex refrigerantibus herbis ante morbi cōttonem in continuis febribus non conuenire. cap. 8
Quis uictus continuæ à phlegmate conueniat. cap. 9
Phlegmatica febris quem exposcat uictum. cap. 10
Tertianæ conuenientem uictum inuestigat, primum exquisitæ, deinde alijs eius differentijs. cap. 11
Disceptatio an rectè consuluerint Arabes medici, in tertiana pura à cibis in quibus est caro abstinendum esse. cap. 12
Febri à pituita dulci, & salsa quis uictus conueniat. cap. 13
Craßiorem uictum exposcere tertianam quàm quotidianam.

C A P I T A.

- tidianam contra recentiores medicos.* cap. 14
An in febre phlegmatica procedendum sit tenui ui-
ctu ad septimum usque, ut arbitrati sunt antiquiores
Arabum. cap. 15
Febri quartanae quis uictus competat. cap. 16
Qua specie quartanae tenui sit utendum uictu ad ui-
gesimum usque diem cap. 17
Rationem inquirat quare diuersis cibarijs prauae sub-
stantiae aliquando sanentur ij qui quartana febre
laborant; occasionesque singulorum remediorum
signis docet cognoscere. cap. 18
Pestilenti febre conuenientem uictum inuestigat.
cap. 19
An alia conueniant in pestilenti constitutione gratia
praeservationis & curationis cap. 20
Victum inquirat colliquantibus febribus conuenien-
tem. cap. 21
Victum inuestigat qui morbillis & uariolis compe-
tat. cap. 22
An usus salitorum piscium in uariolis sit secundum
rationem. cap. 23
Victum conuenientem hemitritæo docet. cap. 24
Febri in qua exteriora frigent, & interiora calent,
& econtra, quis conueniat uictus. cap. 25
Quando à symptomatibus sumenda sit uictus ratio.
cap. 26
In uigilijs conuenientem uictum inuestigat. cap. 27
Victum docet, qui sitienti infirmo conuenit.
cap. 28

LIBR I. III.

Ad inducendam appetentiam quæ conueniant cibaria. cap. 29

Qui ad sedandam tuſſim proſit uiſtus. cap. 30

Ad obſtructiones iocineris & lienis quæ competant cibaria. cap. 31

Influxu uentris, quæ uiſtus ratio ſit obſeruanda. cap. 32

FINIS.

BRVDI LVSITANI DE VICTV
FEBRICITANTIVM

Secundum Hippocratem, & Galenum,

Ad Lectorem.



P R A E F A T I O.



VM omnis generis affectus qui homini accidere possunt, uia triplici soluantur, pharmaco, manuali operatione, & debita uictus administratione: partem eam quæ de pharmacis agit quando & qualia exhiberi debeant plurimi Græcorum luculenter tractarunt: disertissime quidem Galenus multis in locis utranque differuit: eam uero quæ rectam uictus administrationem docet, calamo ideo dignam nostro iudicauimus, quia qui speculationem generatim tractarunt rationali methodo, cum ad particularia peruentum est, hoc est ad singulas morborum species, deficere uidentur ab eo quod res exigit. Nam & illa animaduersione digna sunt, an ab ijs quæ in uniuersum dicta sunt amplectantur, aut extra sint. Et horum singula diuisione non caret. Qui autem eam in particularibus tractarunt, ut medici recetiores inartificiose quidem & subinde a uera deuiantes methodo, multa tradiderunt, quæ ægrotantibus minus salubria sunt. Rei præterea difficultas medicorum nostri temporis opinionum uarietas, in debita uictus administratione, dictorum Hipp. obscuritas, effecere, ut id quod à perspicua & completa doctrina deest, apponam.

Atque

P R A E F A T I O

Atque eo maxime quod medicæ artis pars quæ uictus rationem docet reliquis duab. potior sit, & magis necessaria. Illæ enim morbum & eius causas, hæc corporis facultates præcipuè respicit. Reliquæ duæ nisi hæc adsit consistere non ualent. At sola uictus ratione scimus multos à morbis liberatos quotidie: & plures essent profectò si medici quauis occasione pharmacorum auxilium non implorassent, quot enim sunt qui solo competenti uictu citra ullum discrimen ab affectibus liberari possent, qui propter rem pharmacis contunduntur? Ijs adde si in quauis illarum error contingat quantum sit exitialis, in acutis præsertim morbis, in quibus noxæ gratiores esse solent, ut scite à Galèno in secundo de ratione uictus scriptum est in hæc uerba: Si enim hominis naturam non noueris, metus est ne plus iusto uacues, uel nullo pacto uacuationem moueas, aut si moueris, non tamen sufficienter euacues. Quæ omnia magnas in morbis acutis pariunt offensas. Quapropter cum in arte medica ultra artificialem coniecturam, quam Græci tecmarfin dicunt, certitudo alia non sit, cautè agendum semperque ad id ubi errores minus discriminis afferunt magis accedendum. Nec in acutis duntaxat morbis maximam uim habet uictus ratio, sed etiam in diuturnis. Quod enim medicaminibus obtinere medicus non potuit, id conueniens uictus temporis longitudine efficit. Cuius argumentum est medicos ijs quos incuratos dimittunt, conuenientis uictus obseruare rationem, tanquam ultimum auxilium à quo superfit spes tandem, consulere. Quod autem in acutis admodum sit necessaria hæc speculatio ratio indicat. Nam si minus nutrias naturæ uiris adimis: sin magis, morbo fomenta ministras, utrumque autem medicus prudens dabit operam ut uitet. Nam ut à Galeno scriptum est in secundo de ratione uictus in morbis acutis, Verùm (inquit) si in uentrem absorptus fuerit cibus quod redundat superfluitq;, si aliàs, multo magis in acutis tollere est difficile. Præterea in eodẽ, Quod plus est, inquit exuperatq; noxas interdum inemendabiles facit. Eodem præterea

libro

A V T H O R I S

libro ipse Hipp. neque sanè calumniam effugere potest, inquit, qui ægrè ualentem ex uasorum inanitione non cognoscit torquetq; dixit, periculum siquidem aliquod affert erratum hoc, sed longè minus quàm alterum & risu dignum magis. Cum hæc igitur speculatio admodum sit febricitantibus necessaria, magniq; sit momēti in morbis acutis, cernens nostra ætate hanc partem artis à medicis uelut incultam & neglectam, & quosque citra rationalem methodum suum insequi modum, Hipp. dogmata post terga mittentes tanquam inutilia, & quæ ad artis opera adduci non possint; uisum est mihi de ratione uictus librum hunc componere, ut in eo mentem Hipp. & Gal. aperte ostendamus: & quàm facile sit secundum eorum doctrinam febricitantibus uictus administrationem debitam disseramus. Singulis postea febrium speciebus conuenientem uictum perscribemus. Postremò secundū naturam symptomatum uictus formam immutabimus. Vnum ergo prius admonentes ad rem festinabimus, Hippocratis & Galeni dictis fidem dari postulamus, reliquorum uerò Græcorum tum Arabum quantam ratio & ueterum autoritas concesserit. Illud quoque admonere oportet; quod ad modum quem obseruabo in adducendis aliorum medicorum opinionibus, citabo proprijs nominibus eos qui recte senserint, qui opinione mea à uero deuiauerint innominatos dimittam. Neminem uolo sua defraudare, gloria, præcipuè eò quod & ego ipse facile in ijs labi possum, unde iure mihi fiet, quemadmodum & ego feci. Nam in hoc Hippocratem in libro de arte insequor, qui ita scribit: Malis autem uerbis aliorum inuenta uituperare ars non est.

DIONISIUS MEDICVS

BRVDIVS EIVS FILIVS

INTERLOCVTORES.



Brudius.



BVND è à medicis hodie disceptatum est de epithematum impositione. In re alia non uideo inter medicos citius conuenire ac in debita uictus administratione. Quod argumentum est rectam exhibendi uictus rationem autem adeo manifestum esse, ut nullus superfit dubitationi locus, aut adeo difficilem ut supra omnem sit disputationem. Aut ideo quod ab ijs, quos in uictus exhibitione committunt erroribus parum posse ægrotantes lædi iudicant. D. In utraque artis medicæ parte, tum quæ de pharmacis, tum ea quæ manuali agit operatione, secundum antiquorum dogmata medici agere conantur. Sola in uictus ratione non aliter quàm si intra portum nauigarent nauticum directorium dimittunt. Cum tamen res aliter habeat. Nam si antiquis aliqua sit adhibenda fides, uni præcipue Hipp. Scripta quæ posteris reliquit, haud qualescunque, sed insignes maxime noxas incurrere acutè ægrotantes ab incompetenti uictu, & intempestiue exhibito aperte ostendunt. Quantæ autem huic uires sint, si recte administretur in roboranda natura, declarat ieiunantium ad quascunque leuiusculas obeundas actiones formidolosa, imbecillitas. B. Pater optime da quæso ut tecum de hac re sermonem habeam. Nam ocium huic speculationi opportunum rigida præbet hyems.

A

Ardet

P R A E F A T I O .

Ardet animus ab ijs quibus non paucis implicitus est nodis explicari . Scio te annos quadraginta peruigili lectione Græcorum & Arabum uolumina uoluiffe, ita, ut recentiorum nullum prætermiseris quorum calamus dignus fit nemine . Hoc temporis interuallo incessanter ægrotantium gemitibus assidens inusitata diligentia præstantissimi apud occidentalissimos hominū medici nomen es consecutus . Nec me fugit te dicere solitum, ingenuum artificem esse qui sciat quæ cæteri, & quare cæteros lateant . Hic unus instar multorum est D. Gaudio quod in hanc speculationem procliue studio ardenti te sentiam . Ego uerò quod mea dedit scire ætas libenter tibi aperiam . Id enim iam diu decreueram ut id quod in arte medica longo usu, aut humano generi commodum, aut noxium inueneram, in te ipso ad obliuionem senij (ut Plato ait) uelut comentarios mihi reponerem . Simul ut mihi ad manus cum morte iam decertanti tertius à parte meo succedas, medico apud principes Hispanorum viros præclaro, ita ut per artis medicæ peritia nostræ domui iam familiaris inhabitet . Nam nodus triplex non facile soluitur, ut Hæbreorum sapienti placuit .

2
A V T H O R A D L E C T O R E M D E
A R G V M E N T I S T R I V M L I B R O R V M
S E Q V E N T I V M.



VT Singula quæ in hoc continentur opusculo facile inueniri possent, in libros tres hanc de victu speculationem partiti sumus.

In primo de forma victus loquemur; eius autem anacephalcosin habes in duobus ultimis capitib.

In secundo de quantitate & qualitate victus, & de numero & hora administrationis agemus.

In tertio singulis febribus conuenientem victum inuestigabimus: cui adiecta est victus ratio secundum symptomatum naturam.

BRVDI LVSITANI³ DE RATIONE

VICTVS

*In febribus Liber primus, qui est de forma
victus.*

DISCEPTATIO AN CRASSVS VI-
ctus acute febricitantibus conueniat,
VT MEDICVS CONTRA METHODICOS
disputans in hoc capite asserit.



CAPVT PRIMVM.



IRCA victus admini-
strationem uarias esse cō-
stat apud medicos opinio-
nes. Fuerunt qui crasso
semper victu quibuscun-
que in morbis alendos
egrotantes opinati fue-
runt, ut olim Romæ Pe-
tronas, cuius meminit Gal. in Proœmio libri de ra-
tione victus in acutis. Sunt qui semper tenui. Sunt
in primis egritudinis diebus magis crasso, deinde ma-
gis tenui. Sunt, & qui contrā censeant. Cum
is primum obseruant modum, ut pote, qui rem
attigisse rationibus proprijs, magis uidentur,

A 3 sermo-

DE VICTU FEBRICIT.

Aphor.

sermonem habebimus . Et , ut disceptatio rectè procedat , præmittere oportet crassi , tenuis , & symmetri uictus , notiones , ut constet id de quo disputatio est . Est quidem uires augere potens alimētum quod plenum aut crassum uocatur , à Græcis διατα ἀδρὰ dicitur . Conseruās uerò quod symmetrum existit . Quod uerò comminuit tenue , λεπρόν διατα Græci nuncupant . Has à methodico confesas habere notiones uolumus . Insuper & illud , raro accidere , ut robur corporis egrotantium maius reddere quam acceperimus , studeamus , imò magna ex parte properandum esse in longis morbis uires seruare , in acutis parum debilitatas conseruare . Concessa hæc omnia sunt à Gal. in Aphorif. Tenuēs & exquisiti uictus , &c. Ex quibus apertè ostenditur , egrotantibus symmetrum , tenuem , aut tenuissimum , conuenire uictum , eum uerò qui crassus dicitur , solum sanis concedendum corporibus , secundum rationalium medicorum dogmata .

Eorum uerò qui contrà sentiunt nempe quibuscunque in morbis crasso uictu , qui uires augeat utendum esse , rationes audire oportet . In omni morbo ob naturæ robur sequi euasione[m] sapius , ob imbecillitatem uerò , in mortis discrimen laborante deuenire . Cibo & potu cum natura uires assumat , talem iccirco ac tantum indulgendum , ut laborantis naturam roborare ualeat . Id cum crassus solum uictus præstet , quibuscunque in morbis ministrandum fore . Præterea aut uirtus corporis mor-

bo superioreſt, aut aqualis, aut inferior. Quae nam uerò ſpes ſupereſt tenui aut ſymmetro uienti uictu, dum natura ab initio morbo eſt imbecillior, cum horum neuter uires naturæ augeat. At poſſe ex ijs aliquot craſſo liberari uictu, experientia eorum qui peſtilenti febre detinentur, qua nulla alia exitioſior eſt, conſtat: Cum qua duellum ſi committat natura, ut plurimum ſuccumbit, ut aſſeruit Gale. in expoſitione illius, Quibuſcunque criſis fit, ab ea tamen multos à medicis deſtitutos ſanatos eſſe, quos uulguſ ipſa natura edoctrum, craſſo uictu nutriuert. Ita ut nonnulli rationalium medicorum id aduertentes, craſſo uictu eos reſcicere qui peſtilentia detinentur iubeant; Vt Celfuſ qui uinum calidum ac meratius dare iubet, & omnia glutinoſa, inter quæ carnem generis eiſdem, Auicenna etiam ſumus inter Arabes medicuſ. Qui ex ijs (inquit) uiri liter agunt & uiolenter comedunt, euadunt. Neque id præter rationem eſt, nam quæ antea inualidæ uires erant, craſſi uictuſ ope, firmiores euadunt. Nulloſ autem tenui aut ſymmetro poſſe liberari docet rationalium medicorum ſollicitudo, in cognoſcendis ijs morbis qui corporis uires ſuperant, ut ab eis medici illaſo honore conſeſtim diſcedant. Ob quam cauſam Hippocr. rationalium medicorum princeps, Cognoscere (inquit,) oportet, bonum affectuum naturas, quantum ſupra uires ſunt corporum: Tenues ergo uictuſ, & qui tenuiſſimi dicuntur, ſolum ijs miniſtrandos morbis fo-

In primo
prædictio
num.

DE VICTV FEBRICIT.

re methodice fatebaris, in quibus natura ab initio morbo superior est. Quod Gal. confessus est, cum de uictus forma secundum Hippocratis mentem ageret, nempe ubi tenui, aut tenuissimo utendum esset, admonet eum uictum in ijs duntaxat morbis ministrandum, qui ad salutem terminantur, minime in ijs qui ad mortem. Cuius uerba ita habent secundum ueram uersionem; Non enim distrahere naturam oportet ad aliam nouam coctionem, cum eo tempore humorum morbum efficientium coctioni fortiter uacet, & sit paulò post ipsos euictura. Sic à nobis ostensum est in tractatione de crisibus, secundum illos scilicet morbos sermone omni procedente, in quibus omnino dieta et curatione utimur. Sunt autem illi, in quibus uigorem excipit declinatio. nam in quibus mors post uigorem sequitur, ea solum artis parte quæ prædicit utemur, prænunciantes quod futurum est, ut absque culpa simus futuri euentus. In solis ergo morbis qui ad salutem sunt terminandi tenui, aut tenuissimo utendum esse uictu, aperte supra dicta Galen. uerba declarant. Sed dicat methodicus oportet, unde medicus acuto morbo inchoante euasurum ægrum, certo sciet, ut illi tenuem instituat uictum, aut tenuissimum: aut horum neutrum, si moriturum? Cum in arte medica futuri euentus nulla certa habeatur scientia, necesse est, ut aliquando eos qui liberandi sunt, præter medicorum opinionem, crasso
alamus

alamus uictu, et non raro eos qui extremum in-
spicato clausuri sunt diem tenui. Crasso ergo ui-
ctu medicorum iudicio morituri, sanabuntur:
tenui eorundem opinione conualituri, interi-
bunt. Quod fateri cogaris si optimorum medi-
corum iudicio, quibus non raro præter opinio-
nem tales euentus accidunt, quicquam certitu-
dinis tribuas. Si necessitatem salutis aut mortis
supra dicta Galen. uerba supponere dicas, nihil
est profectò Hippocrat. apud eos qui conuale-
scent necessariò aut morientur, et nihil interest si
crasso aut tenui hos alas uictu comparande salutis
gratia. At si fortè methodicus concedat certa scien-
tia nihil haberi, esse tamen in arte medica artificia
lex coniecturam, quam Græci *τιμωριον* dicunt;
qua eorum quæ sunt aut erunt, cognitio habetur:
Hac instructus medicus coniiciens ab initio egritu-
dinis corporis laborantis uirtutem morbo supe-
riorem, ægrum conualiturum sperabit, tenuem-
que uictum prout morbo acumen contigerit insti-
tuet. Quod si inferiorem moriturum. Quare
nec tenuem, nec tenuissimum huic ministrabit,
solâ prædictione contentus discedet. Attamen
cum coniecturale signum non necessarium sit,
neque impossibile aliter habere non tollet,
quod supra obiectum est. Præcipuè cum Hyppocr.
ipse acutorum morborum pronuntiationes, non
omnino certas esse, nec salutis, nec mortis scri-
pserit.

DE VICTU FEBRICIT.

psperit. Præterea esto ab initio acuti morbi uirtutem superiorem certò conijcias, tenuem adhibebis uictum methodicè: sed cum talis ob tenuitatem uires minuat, ut supra ostensum est de mente Gal. fieri posse, ut tenui illo uictu moriatur ille, crasso uerò seruetur. (Nam si ponas uirtutis supra morbum excessum tantillum, ut soli uincendo morbo & eius obistere incursibus uirtus sufficiat, apudque uigorem sola habita morbi ratione minori excessu super sit morbo superior quàm sit id quod tenuis uictus uirium exoluit.) Hunc si tenui uictu, qui quantum ex se est uires exoluat, ab initio alas, putasne apud statum superiorem futurum, an potius inferiorem? Ego quidem non peruenturum ad statum si ultra dies septem prorogetur opinor. At si symmetro uictu qui quantum ex se est uires seruat, quo solum in chronicis morbis utendum fore rationalium medicorum secta imperat, hunc nutrias, nonne euadet? Nam ratione symmetri uictus nullum patiuntur uires detrimentum. Quod si cibum qui uires naturæ addat ministres multò fortiores hunc quo uis morbi tempore quàm symmetro uictu efficies. Sed forsàn ad hæc methodicus dixerit, uictum tenuem, uirtutem etsi imbecilliores quantumcunque reddat, morbum breuiorem efficere. Nam natura, cibi tenuis coctioni parum incumbens, diutius materia morbi uacabit, unde citius fieri coctiones, minusque morbi symptomata & labores

bores natura robur exoluentes durare continget . Unde etsi magis æger tenui uictu exoluatur quam symmetro aut crasso : quia tamen minori exoluitur tempore , minus damni natura feret acuto morbo laborantis , ex tenui uictu , quam symmetro aut crasso , si uirtutis tenorem in statu cum tenui uictu conferas , ad eandem cum symmetro aut crasso apud uigorem . Hæc methodicus respondens arbitratur iuxta tenuitatem aut crassitiem uictus citius aut tardius futuras coctiones , quare & distantiam status longiorem & breuiorem iuxta cibi crassioris , aut magis tenuis exhibitionem fieri posse putabit . Cum Gal. libr. de crisi- bus primo, & in lib. de quatuor morbi temporibus, & in secundo de ratione uictus , in expositione illius , Coniungere autem oportet & robur &c. statum esse cum maximè conficiuntur coctiones ostendat . Quod si ita , ut opinatur , res haberet , grauiter peccasset Galen . rationalis methodi author ab Hyppocrate secundus , cum uictus formam penes distantiam status sumendam nobis præcipiat , si pro uictus ratione longior & breuior fieri posset . Nam eo modo rectius esset status distantiam ex forma uictus coniungere , quàm contrarium . Sed pone rursus acutè febricitantis uires morbo superiores , morbumque ad septimum terminandum , tenui hunc nutries uictu qui uires minuit , nempe hydromelite , aut pitisanæ cremore , aut huiusmodi tenui sorbitiuncula ,
septima

DE VICTU FEBRICIT.

Septima die, utpote quo morbi vigor futurus sit, egrotantem in omnimoda seruabis inedia. Age nunc sanum hominem aequè robustum, ac egrotans erat, simili uictu ad septimum seruato, totaque ea die incibatum hominem conuenias uesperascente die septimo qualem illum fore putas? Quod si prima die miliaria sex pedestri itinere peragebat citra manifestum incommodum, quot die septima putas posse peragere? Quilibet sanè mentis compos, an tria possit conficere dubitabit.

Idem de saltu, cursu, ponderis eleuatione, in summa in omni conatu multum ab ea deficiet meta, quam prima die attingebat. Sed in naturalibus actionibus idem iudicium. Nam si die septima dimidium cibi, quem ante diem primam facile digerebat offeras, grauato uentriculo ledetur. Quanto autem uitalis facultas fiet imbecillior declarant languidi pulsus integra die ieiunantium. Cum ergo sano homini sola illius uictus ratione omnium trium uirtutum tam sensibilis accidat imbecillitas, quanto plus lésionis, & detrimenti uirium ex tali uictu egrotantes ferent arbitraris? Quod si hæsitas, roga huius scéle principis Hippocratem, secundo de ratione uictus, & Galenum. cum scribunt detrimenta minus sanos, quam egros afficere. Præterea languentes à repentina uictus mutatione ledi magis, quam sanos

sanos, sed adhuc eos magis, qui acutis infestantur morbis. Item in eodem, permutatio vietus si sanis molesta est, languentibus molestior erit. Cum ergo hominem sanum si tenui illo victu ad septimum nutrias, manifestè eius vires minui uideamus, multo magis id agrotanti accidet, ita ut manifesto excessu imbecilliores fiant ex illo victu. Ostensa est causa una insignis diminutionis uirium. Sed age morbum & eius symptomata, earum quantum absument septem dierum intervallo consideremus. Profecto si mens humana ab experientia edocta, ut trutina horum admittitur, iudicabit labores acuti morbi vires posse diebus septem insigniter imbecilliores reddere. Una enim die patiens homo ephemeram febrem, die sequenti sensibiliber imbecillior est, quam ante febris inuasionem. A virtutis igitur robore duo sunt, quæ insigniter detrahunt, & præter modum absument, nempe tenuis victus, & morbus. Quod si morbo vires accrescere ad statum usque iuxta Hyppocratis sententiam intelligas; Circa principia & fines, & cat. Colliges, non quencunque excessum Naturæ supra morbum, satis esse ad euasionem. Pone exempli causa morbum, & eius symptomata quartam uirium partem absumpsisse: tenuem victum sextam, morbi vires tertiam superadant, si prima die uirtus duplo erat, ad morbum excessu superior die septi-

DE VICTV FEBRICIT.

die septima eodem erit imbecillior una octaua . Quare illa uictus ratione morietur ille cuius uirtus prima die erat morbo bis fortior . Quod si hos respectus nempe quartam, sextam, & tertiam, ut incertos nihil certi ostendere dicas; concedam aliqua ex parte; nam exempli causa adducta sunt, ut manifestum fiat, plures eorum qui ab initio morbo erant uiribus superiores, posse ex ea uictus ratione interire, multoque excessu opus esse, ut illo uictu quis euadat. At si ijs quæ a fide dignis medicis & philosophis scripta sunt in reductione effectuum agentium naturalium ad numeros, aliqua fides sit adhibenda, quibus ostendere nituntur ab effectu insensibili ad eundem cum manifestè sentitur duplā esse geometricam rationem, minori quā par erat ratione supradictos respectus me definisse scies. Maximum ergo malum est eo uti uictu, quo plures qui alioquin seruari poterant intereant. Quod si sermonem ad eos qui à morbi initio pari certant robore, conuertamus, horum nullum intelliges tenui uictu posse euadere, ratione monstrante, cum morbi vires ad statum vsque validiores fiant, ut ab Hip. scriptum est, corporis autem uirtus imbecillior. Qui ergo ab initio pari cum morbo robore certabant paulopost eodem futuros imbecilliores constat. Nisi igitur id quod morbus & eius symptomata virium absument, crassi uictus opere rependas, mors certa sequetur. Quod si dicat methodicus præter uictum tenuem esse medicis re-
media,

media, quibus morbi causam abscindunt, ut missione sanguinis, et purgatione; ijs si quidem euacuationibus humorem morbum efficiente m educunt. Vnde & si pari robore ab initio natura cum morbo certet ob causæ morbi euacuationem bona acuminis morbi pars tollitur, & multo superior natura redditur, cuius causa euadet infirmus. Sic in Anglia olim Lusitano contigit. laborabat pleuritide, cumque morbo ingrauescente delirare cœpisset, omniaque in deterius abirent, tertio facta fuit sanguinis missio, multumque eductum est, confestim omnia mitiora fuere, melior pulsus & urina, cessauit delirium, screauit, sanatus est. Videbatur tamen ante sanguinis missionem uirtus morbo inualidior. Sint hæc ut uis methodicè, hac tua ratione, ut multoties huiusmodi possis salubres euacuationes moliri, citra magnum uirium incommodum; melius tamen egisses si crasso uictu qui uires egrotantis augeat usus esses, quàm tenui, à quo uires imbecilliores efflata, plures euacuationes citra magnum uitæ discrimen non ferunt. Insuper si euacuationes pro uotis succedant, non oberit ante euacuationem naturam cibo roborasse crassiusculo. Neque quicquam si id agas postmodum die una interposita lades. A felici nanque euacuatiore roborare naturam, ut potentiùs quod reliquum est coquat, & expellat, oportet. Quod si e contrà accadat, ut non rarò usu uenire quotidie cernimus,

DE VICTV FEBRICIT.

mus, intempestiuas à medicis euacuationes, easdemque infelices, & cum magno uirium egrotantis incommodo fieri: tenui hos indigere uictu indicas, qui uires adhuc imbecilliores reddat, an eo magis qui aliquod imbecilla nature solamen afferat, ut eas quas euacuatione deiecit uires medicus cibo roboret? Nec hoc ipsi rationales negabunt, nempe si in euacuatione erratum sit, melius esse crassiori, quam tenui, magis usum fuisse uictu, nam enunciationem à qua illa ostenditur, ut ueram admittent, utpote ab Hippocrat. concessam & Galeno. Nempe egrotantes ab ijs, aut quæ ipsi commiserint, aut sponte, aut modo quæcunque acciderint peccatis, minus lædi, crassiori uictu si usi fuerint, quam tenui. A sanorum experientia ad egrotantes id deducit Hippocrat.

Sano enim homini si aliquid præter consuetudinem accadat, ut exempli causa longam pedestri itinere peragat uiam, aut Venere nimia usus sit præter consuetudinem, aut Solis æstus diutius passus fuerit, aut alius quicunque error accadat, magis lædetur si tenui uictu ante usus fuerit quam crasso. Et hoc est quod Hippocra. dixit, Propterea sanis fallaces sunt ualde tennes & exquisiti uictus, quoniam peccata difficilius ferunt. In quo Aphorism. non agit ille de peccato, quod in exhibendo uictu committitur, utrum maius sit in tenuis exhibitione

tione an crassioris, ut perperam plurimi intelligūt, sed de quibuscunque agit peccatis modo quocunque euenientibus quæ magis eum ledere ægrotantem ait, qui tenui quàm qui crassiori usus fuerit victu. Et ut certo scias banc fuisse Hyp. mentem non ab re fuerit Græcum Gal. contextum adducere qui idem de Hy. sentit.

Κὺν ἰτα αἰτ ἀμύναν δι' ἡ προτέρα γραφή περὶ λαμβανῆ γὰρ καὶ ταύτην καὶ γενικώτερον ποιεῖται τὸν λόγον ἵνα περὶ ἀπάσης ἁμαρτίας ἐκείνη δάσκεισα τῆς ἀκρουσίας τὴν καὶ ἐκείνης συμπίπτουσης, τοῖς νοσοῦν, ὥς εἶναι τὸν λόγον τοιοῦτον ὅτι αὐτὸ ἁμάρτημα συμπίπτει τοῖς λεπτοῖς αὐτῷ διατηρούμεναι σφαιρωτέρον τοῦ το καδὲ ἵεται παρόσον ἦτε διὼν αὐτοῖς ἄρ' ὥς οὐ κατὰ τὴν τοιαύτης διαίτης, γέγονεν ἦτε ἐκ αὐτὴν μεταβάσις ἀνέυδης. μαρτυρεῖ δὲ τῇ προερρημένῃ γραφῇ καὶ τὰ περὶ τῶν ὑγιαίνοντων ἡρμήνα σφαιρῶς γὰρ ἐκ αὐτῶν φη τὴν λεπτοῦ διαίτης ἵναρχαν ὅτι τὰ ἁμαρτανόμια χαλεπώτερον φέρουσιν αὐτὸν ὅτι διὰ τὸ λεπτόν τῆς διαίτης ἁμαρτανῶν ἀναγκάζονται. Ὁρ.

Hoc est melior prior scriptura complectitur enim, & hanc, & generaliore facit sermonem, de omni peccato docens voluntarie, aut in uoluntarie contingente ægrotantibus, ut talis sit sermo. Quod si peccatum accadat sic tenuiter dietatis periculosius illud est, quantum virtus imbecillis à tali dieta fuerit, & quantum transitus ad ipsam insuetus fuerit. Confirmant dictam scripturam quæ de sanis dicta sunt, quibus periculosas tenues dietas existere dicit, quoniam peccata difficilius fuerunt. Non quod propter tenuitatem dieta peccare cogantur. Sentis ne ex ultimis Gal. verbis non agere Hypp. de ijs

DE VICTU FEBRICIT.

quæ à tenui victu accidunt peccatis, sed de quibus-
 cun que voluntarie aut inuoluntarie contingentibus,
 quæ magis ledere asserit eos qui tenui victu usi fue-
 rint, quam qui crassiori. Cunque non raro accidat
 ægotantes ex intempestiuis lædi euacuationibus, id
 esse agendum, & ad id accedendum, unde damna,
 & errores minus discriminis afferant. Id fiet si cras-
 siori utemur victu. Cum autem non solum in euacua-
 tionibus, sed in alijs non paucis quotidie ægotan-
 tes delinquant, aut sua sponte, aut assistentium cau-
 sa, & non raro ab ipsis medicis, accedet iam dictis
 non parui momenti ratio ostendens crassi victus non
 spernendam ægotantibus commoditatem, nempe mi-
 nus lædi ab erroribus. Quandoquidem peccata eua-
 cuationis si cum tenui victu coniungantur, methodo,
 quidem sed irrationali ægotantem in mortem dese-
 runt. Nam ut in proverbio apud Hispanos est, ca-
 put cito tondent plures manus. Fateri igitur cogeris
 methodice cum in euacuatione erratum sit, minus
 mali ægotantes patiet si crassiori, quam si tenui ma-
 gis victu usi fuerint. Quod si pro votis euacuatio
 succedat, non est, quod tenui utaris. Nam si
 à naturalibus ad eas, quæ ab arte sunt euacuatio-
 nibus validum est argumentum, ut tradidit Hyp-
 pocra. manifestum erit si quanto maior fuerit ex-
 purgatio, tanto magis ad iudicationem usque dare
 oportet, ut ille scripsit, idem obseruandum fore in ea
 quam medicus feliciter molitur euacuatione. Qua-
 re committendum non est, ut ea fiducia tenui uta-

x. Aphor.

x. de ratio
 ne uictus.

ris victu, vt id imbecillitatis quod ex eius vsu natura incurrit noxij humoris euacuatione rependas. Sed his omiſſis mentem ad eos qui inſuetum nauigant aquor conuerte cum eorum turbantur corpora, quorum qui cibo et potui non parcunt minus cōturbari certum eſt. nam facilius & minori cum moleſtia euomunt, vnde citius ab effectu liberantur. Qui vero magis abſtinent. contrarium eis euenire diligentiores nauæ affirmant, Age experiamur alias cauſas, pone duos omnia quibus ſint paria ad ſolis æſtum nimis incaleſcentem, alter tenui victu, alter craſſiori vsus ſit ab ante heſterna die, vter eorum magis afficietur putas, ego quidem periculū huius rei iam in me ipſo faciens ſenſi minus me ſolis calore cum craſſiori vsus fueram cibo, quā tenui affectū fuiſſe. Idem ijs accidit qui alta niue iter peragunt. Quare ſi quis hæc alta mente reuoluat, aperte colliget, verum id eſſe in cuiuſcunque cauſæ impreſſione minus fore obnoxiū qui craſſiori victu vsus fuerit, multo autem magis qui tenui. Quare cum ita res habeat magnum afferet ægrotantibus craſſus victus commodū. Nam cum in morborum conſideratione duplex ſit me dico ſcopus, alter ad id quod factum eſt, alter vero ad id quod futurū, id curat medicus quod iam eſt, id præcauet quod nondum eſt, hoc quæ eſt, quod alijs verbis medici dicunt, cum morbus & cauſa ſimul coincidunt, curationē mixtam eſſe, ex ea artis parte quæ curat, & ex ea quæ præcauet, prophylaticæ gracie dicitur. Cum ergo præcipua intentio medici deficiente eo quod vrget, ad id ſit quod futurum eſt, danda eſt opera vt eo

DE VICTU FEBRICIT.

disponamus modo ægrotantē ut minus eius quod futurum est recipiat. Ostendi autem supra crassum uictum corpus sic disponere ut minus quarum uis causarum impressionem percipiat. Quare ægrotātibus omnibus ministrandum esse, ut ab eo quod futurum est minus afficiantur. quod si febricitantem consideres qui tenui uictu usus fuerit, calorem acriorem ad intima corporis penetrantem morbiq̃ labores molestius ferentem, cōtra qui crassiori, minus à febrili calore molestari, facilius autem symptomata & labores ferre, magis uero morbi & eius causæ impressioni obistere, ualidius bonos chimos ne putredinem concipiant manutenerere. Cuius signum est causarū non naturalium actiones minus eos qui crasso usi fuerint uictu præmere. Quod si rusticos operarios nautas & id bonum genus in mentem reuoces, cum ab acutis corripuntur morbis, non ptisana, non aqua mulsa, non oximelite euadere, sed ualenti cibo & potu, sola ea differentia quod subtiliori modo parant, ob cōctionis facilitatē, id ita esse scies, cum ob id periclitari magis rusticos quàm ciues non uideamus, qui tenui uictu utuntur, quin immo rusticos facilius & citius à morbis liberari. Vt Venetijs rusticæ duplici laboranti tertiana contigit. Cunque accedens medicus aquam hordei & iusculum pulli frigidis herbis temperatum consuleret, illa annuente abiit. Sequenti die accedēs & cū nihil eorū quæ iusserat factum accepisset, ægre ferens discessit, nihil boni rusticæ futurū sperans, quam duobus post diebus in domo amici offendit gloriantem se suo consilio & non medici seruata. Sed
 heus

heus tu methodice cum uirtus agrotantis nimis imbecillis est, non ne eam cibo & potu roborare conaris uel ipso morbi uigore ut Gal. tradit. An non putas melius crassiori uictu corpus antea nutrisse, ut hora maxime cōmotionis absq; cibo permanere potuisset, ob id quia natura ad insignem deueniente imbecillitatē non facile cibo noxā corrigitur. Nisi enim ipsa natura circa cibum elaborauerit cibus per se non digeretur, nec uires naturæ ministrabit, nam oportet ut ab ipsa natura principium sui adiumenti habeatur, quæ cum ualde imbecillis est tātillum non ualet cibum coquere nec digerere. Quare consultius ageretur crassiori ante corpus uictu nutrire ut minus in huiusmodi imbecillitates incidat natura. Diste sunt nonnullæ rationes ob quas in morbis crasso uti debeamus uictu qui uires laborantis augeat, nullamque legitimam methodicns rationē ostendet quod tenui qui uires agrotantis minuat uti oporteat. Methodicus forsan pro ratione Galenum adducit ita dicentem, nam si crasso uteremur cibo, adderemus in morbum, cuius uerba sic habent, nam si eas tales quales acceperimus properemus in istis seruare uel etiam augere, semper adderemus in morbum. Vnde aperte ostendit non solum uictu crasse sed & symetro si utamur augere nos semper in morbum. Hæc quidem Verba methodicus pro se citans putat obtinuisse. Et si hoc tibi præstem, ut in hac re Galenum ut iudicem admittam, possem tamen methodice arte tuū in præsentī deuiare tellum. Nam male citasti Gal. in eo uerbo semper, illud ad sequentem dictionem adderemus referēs.

Aphorif-
simorū 1.

Aphorif-
simorū 1.

DE VICTU FEBRICIT.

Et talem facis sensum quod si in acutis vires seruare properemus, uel etiam augere, semper adderemus in morbum. Cum aliter habeant græca exemplaria nempe *α γάρ ητοι φυλάτταν αυτον εαν παρελαβωμεν εν τούτοις η προσ αυξαν αα σπινδοιμαν αυξησωμεν τον νοσον*, hoc est si enim seruare ipsam, scilicet uirtutē qualem acceperimus in ijs scilicet acutis uel augere semper properaremus, addemus in morbum. Vnde non damnat Gal. in acutis simpliciter uirium additionē, sed illud maxime ne semper properemus addere eas cibo, innuens in statu & apud ipsum si cibo vires addere coneris errorem esse. Sed age methodice hæc demittens uolo tecum in hoc duello ea uti animi liberalitate qua cū Aiace usum fuisse Hectora refert Homerus. Crasso uictu qui vires augeat ideo utendum non esse ais, ne addamus in morbum, unde quæso hæc fiet additio, aut quia cibus in morbi materiam conuertitur, aut quia eo temporis interuallo quo natura cibo præparando uacat à morbi cōtione cessans causa est ut diutius duret effectus, aut quia affectum maiorem reddimus, aut quia in priorē causam addimus, ab omnibus hisce modis morbū sumere posse incrementum certum est. Age nunc an in ratione cibi crassi qui vires augeat aliqua dictarum insit occasionē consideremus. Cibus porro in morbi materiam conuerti duplici de causa contingere aut quia similem in qualitate aut substantia aut quia à natura non commode apparatus, unde corruptioni disponitur, non apparatus aut ob multitudinem immodicam aut crassitiam. Proinde fieri potest ut ægrotantibus cibum offeramus

feramus qui vires augeat, qui nec qualitate nec substantia humori peccanti similetur, sed & eius medicum exhibere possumus quantitatem qui quàm minimè difficilis sit coctionis sed admodum levis. Verum ob dictam causam conuincitur petrona carnes assas acute egrotantibus ministrans, quæ cum difficilis sint coctionis & haud commode à natura præparentur causa est ut diutius immorantes in laborantium uentriculis corrumpantur, unde in morbi materiam tandem conuertuntur. Quod ad morbi durationem spectat, necessarium non esse ut quicumque cibus vires egrotantis augens multum exposcat ad eius coctionem tempus. Nam alica inter crassa ab ipso Gal. connumeratur cibaria, tamen breui admodum coquitur. Simile habent oua sorbilia, & uinum quod citissime quidem coquitur & multum vires iuuat, præcipuè naturales & vitales. Affectum intensiorem efficiamus ut si iocinere aut liene obstructione laborantibus dulcia cibaria ministremus, & quæ facile particulis hæreant. Et si liquefacientibus febribus aquam mulsam exhibeamus. Quod nec hoc crassum cibum qui vires augeat commitetur necessario, manifestum est. An postrema participat occasione tentemus. Priorem dico causam pororum obstructionem aqua putredo ortum habet, hanc à multitudine humorum intra uenas aut ab eorum crassitie aut lentore aut à duobus aut simul ab omnibus prouenire Gal. autor est. Cum autem obstructiones sunt aut suspitio est ne fiant, cauendum esse eum cibum qui pectoriam efficiat exhibere. Virtus autem

1. Aphorismorum.

In libris
de methodo
medendi.

B iij qui

DE VICTV FEBRICIT.

*qui vires auget omnino hoc nō caret crimine , nā vires
 augere non posset nisi maior eius pars in sanguinē con-
 uertatur. Ob solam igitur pororum obstruccionē cras-
 sus uictus suspectus esse uidetur . Sed cum in omnibus
 acutis morbis non adsint obstruccionēs nec dispositio
 à qua iusta earum detur suspitio . Non esse ob id quod
 singulare est, uniuersale efferas perceptū, nempe omni-
 bus in acutis tenui esse utendum uictu. Sed age metho-
 dice cum febris acuta cum obstruccionē adest, quo ute-
 ris remedio ut hominem in sanitatem uindices . profe-
 Etò si Gal. in libris de methodo medendi & in libro de
 plenitudine consentis , & toti rationalium medicorum
 scholæ, sanguinis missione , nisi quæ prohibeant adsint,
 dices. Nam febrem tolerare non posses nisi prius obstru-
 ctionibus liberandis intendas, quorum causa euacuatio-
 nem molimur & si plethoria non adsit , sola melioris
 transpirationis gratia, ut ab eodem discimus. Nā stan-
 te eadem pororum raritate post humorum imminutio-
 nem liberi ores fieri inspirationes & expirationes con-
 tingit. Tu igitur methodice sanguinem mittis hac sola
 de causa ut liberiores fiant transpirationes , ego hac
 ipsa quam tu, & ut post euacuationem crasso cibo qui
 vires augeat uti secure & citra lesionē possim . Sentis
 ne pluribus in morbis acutis crasso uictu illico citra ali-
 quam præparationem utendum esse, in ijs uero quibus
 obstruccionēs coniunguntur quæ morbi materiam fo-
 uent aut suspitio est ne fiant corpus fore præparan-
 dum ante crassi uictus exhibitionem. Nec hanc præpa-
 rationem solus huius gratia melior. Nam & tu & ra-
 tionales*

tionales quicumque illam tanquam remedium ad sanationem nō uulgare amplectimini. Solum unū est quod inter nos separat quod uos id agitis ut morbum oppugnetis ego uero ob id ipsum, & ut laborantem naturā citra lesionē roborare possim. An non tibi methodice subiit in mentē simile esse illud Hyppocratis cū de corporibus athletarum sermonē faceret, quem Oribasius de omni crasso & obeso intelligendum monet, horum igitur, inquit causa bonā habitudinem soluere cōfert, non tarde ut rursus principiū nutritionis accipiat corpus. Nullam igitur ualidam perpetuam assignabis rationem quod tenui uictu qui egrotātis vires minuat et imbecilliores reddat in acutis uti debeas. Nonne Hyp. præceptū est cum aliquod signum prorritatorium aut euacuatorium affuerit uel in hypochondrio, crassiori uictu utendum esse. Ubi Gal. cōmuni prorritationis nomine cōprehendisse omnia Hyp. quæ quo uis modo uirtutem ad imbecillitatem agūt scribit, ut morsus quem acris humor in intestinis aut uentriculo parit, præter ea uigilia, ira, mæror, lumbrici, elmynthes, qui ab intestinis ad uentrē usq; ascēdunt, & pruritus cutis et partis alicuius qui nocte oboriatur, & plurimā aliā quæ sub euacuatorio comprehenduntur signo, & sub hypochondrio. Cum ergo omnibus his ob id quod uirtutem infirmiore reddere nacta sunt, crassiori uictu obstare præceptum uobis est, id diligenter præcauentibus ne corporis laborantis natura multum imbecillis fiat, consulto tenui uictu uti, quo egrotantium corpora ad insignem ducuntur imbecillitatem præter rationē esse uidetur.

2. dē ratio
ne uictus.

DE VICTU FEBRICIT.

uidetur. Quinimmo nisi mihi certo ostendas cōmodum quod à tenui uictu acute egrotantibus euenit, maius esse uirium incommodo, insanam esse temeritatē iudico, eo uti cuius damnum manifestum est, adiumentum uero rationi haud peruiū est. Quod si methodicus ad hęc. Nihil igitur obstabit quo minus in acutis uinum concedamus quod uires insigniter roborat & breui coctionem recipit, nec in morbi materiam aptum esse ut conuertatur, nec affectum augebit si tenue fuerit & aquosum, sed nec hoc obstructionibus lesioni erit, nam omnes promouere euacuationes asserit Gal. in libris de methodo medendi. Vere quidem si egrotans assuetus sit, non esse quod interdicatur uinum tenue & aquosum. Nam quam æstimas esse dispositionem methodice cui maxime aduersum sit uiuum, forsan febri acutæ cum ingenti capitis dolore & mentis læsione, hac constitutione uinum omnino prohibendum esse credideris. In ea ipsa tamen dispositione ante dictum uinum si ustrum concessisse Hip. audias, an ne mutabis sententiā & rectius posthac egrotantibus consules, & saluber-
 rimum esse iudicabis, naturæ uires medo quo possis augere præcipue ubi citra effatu dignum incommodum id efficere possis. Hip. igitur ita scribit cum uero in huiusmodi morbis fortem capitis grauitatem uel mentis læsionem suspicatus fueris, à uino penitus est abstinendum, aquamque tunc dare oportet uel uinum aquosum flauūque & prorsus inodorum, atque ab ipsius portione aquæ exiguum super bibendum. Nam hoc modo uini potentia caput, mentemque minus tentabit. Vali-
 dum

3. de me-
thodo.

In 3. de ra-
tione ui-
ctus.

dum ex dictis Hyp. summi potest argumentum, in omni morbi constitutione assueto egrotanti aquosum uinum à rationali medico concedi posse, ut in pleuritide affectu quamuis maxime crudo existente, ut habetur ab eodem ubi ita scribit. Et si morbus siccior, quàm ut quispiam existimet fuerit, non multũ dare oportet, sed ante sorbitionem uel mulsam uel uinum utrum magis auxiliaturum putaueris propinare conuenit. An non percipis ante dictæ constitutioni uinum & si tenue & aquosum noxa non uacare, cuius causa Hyp. exiguum aque super bibendum præcipit. Cõmodum tamẽ quod ab eo in corroboranda natura sequitur, maius esse suspicandum ideo esse, quia alioquin non concessisset. Hyp. stantibus forti capitis grauitate & mentis læsione. Hucusque illius rationes qui crasso semper uictu hoc est qui uires laborantis augeat in quibuscunq; morbis utendum esse opinatur. Qui uere in acutis, tenuem qui uires minuat ministrandum fore contendunt sic breuiter ratiocinantur.

In i. de ratione uictus.

CAP. II.

At qui paroxismo seuiente inquieto febricitanti præ igneo calore æstuantĩ pedes & brachia huc & illuc iactanti sitim lingueque ariditatem ægre ferenti, cibum offeremus, an paroxismi inclinationem expectabimus. Nullus profectò qui mentis sit compos egrotanti paroxismo ita seuiente cibum ministrabit. Proinde cum plures sint morbi quos recentiores perperactos uocant, qui ab initio ad morbi manifestam inclinationẽ similes labores predictis & plures & uehementiores

DE VICTU FEBRICIT.

tiores afferunt, nec intermissione habent, cibum ne ijs qui vires augere valeat an qui minuat ministrabimus. Ego quidem tantum abest ut crasso victu qui vires au-geat sic laborantem nutria, ut omnimoda inedia hominem ad morbi inclinationem seruare opus esse crediderim. Qua in sententia Hip. & Gal. esse certum est. Nec prater rationem nam si illud uerum est quantum cunque quis seuiente paroxismo ediderit nocumento esse, unde monstrante experientia asseruit Hip. apponere lesionem esse, quod cum in periodica febre in qua errores minus periculi afferunt hoc facere ob timorem lesionis ueremur, causatius profecto in peracutis cibum non esse offerendum in quibus certum est citra magnam lesionem ministrari non posse. Nam si in uentre absorptus fuerit cibus quod redundat superfluitq; si alias multo magis in acutis tolerare est difficile ut scripsit Gal. Præterea cum inflammatio in aliqua parte excitatur ab humoris effluxu siue phlegmone aut erisipelas sit, non aduertisti nullum cibum quantumcunque leuissimum fluxione durante laborantes citra lesionem posse sumere, quando quidem à cibo dolores & fluxus insigniter crescunt. Cunque hæc ita se habeant nunquam inducar ut rationibus mihi persuadeas cum agrotans uel ab ipsa morbi uehementia uel ab aliquo dolore minis molestatur crassum cibum offerre ex usu esse. Quinimmo cum Hyp. sentio in primo de victu acutorum ubi ita scribit postea si dolor uel periculum aliquod comparuerit sorbitionem dare oportet neq; multam neq; crassam sed post septimum uel nonum si ualidus

2. lib. de ratione uictus in illo ciborum autē adiectioni.

lidus sit. Ubi igitur morbus statim ab initio maxima affert symptomata omnimoda inedia egrum seruare ad morbi inclinationem, si virtus sufficiat, rectius esse iudicat, quàm cibum offerre qui citra insignem lesionē tali morbi constitutione exhiberi nō potest. In qua sententia Hyp. esse cū ita scribit, ciborum autem adiectio ni intendendum multo minus subtrahere vero sæpe numero expedit cum eger sufficere possit donec morbus mature scat. In reliquis ab hac vehementia degenerantibus morbis tenuem aut tenuissimū concedendum esse victum, tutius quē esse in ijs ad magis tenuem a iusto aberrando accedere, quā ad crassiorem. Quod ualida ratione ostenditur. Pone morbo acuto laborare Socratem est ne aliquis cibus qui morbo & naturæ Socratis & ceteris exacte conueniat, dicatur ille mediis, omnia cibaria quæ illo tenuiora sunt haud quāquam conuenient propter virium diminutionem quæ cunque illo crassiora incommoda sunt propter morbi additionem. Sed cum acuti morbi ut plurimum iuuenibus aut cōsistentibus accidant quorum vires maxime tunc vigent, manifestū est quod in ijs magis urget morbus quā virtutis imbecillitas. Addere modo in id quod urget periculosius cum sit quā in id quod non urget aut minus urget, manifestum est in acutis deterius esse & magis periculosum crassiorem cibum ut pote qui in morbum urgentem addit, quā magis tenuē qui virtutē cuius imbecillitas non urget exoluat.

In 2. de ratione vi-
tus.

DE VICTV FEBRICIT.

CAP.

III.

QV I D de ijs sententiam in presenti breuiter ostendam, id quod maxime in artis operibus post longam considerationem magis probauerim. Eam enim esse artis utilitatem, inuenire ea quæ aegris conducibilia sunt. Nunc mihi præbete aures de ratione uictus uobis aliqua dicturo, quæ animos uestros componant. qua quidem in re unum insequor Hypp. cuius scripta ultra humanam eruditionem quid præstant; huic acceptum fero quæ de uictus ratione uobis dixerō. Sed prius dubitationem soluere expediet. Crassum uictum, tenuem tenuissimum, primus Hyp. dixit in Apho. Quid tamen per hæc nomina intelligat ex libris de ratione uictus illici potest, apertius tamē in libro de Prisca medicina, ubi ita scribit. Qui uero medicinam excogitauerunt inuenerunt ue, sententiam opinionem ue habuerunt quam illi de quibus prius dixeramus, primum quidem arbitror ex eorundem ciborum copia quid subtraxerunt & pro multis pauca fecerunt & dederunt. Cunque hoc illis satis non uideretur nō enim languentibus hæc aquo modo proderant, sed erant nonnulli qui sic haberent uti ne exiguos quidem cibos superare possent, hos itaque putarunt imbecillioris cuiusdam rei egere. Propterea sorbitiones inuenerunt paulum quid firmioris & robuste materie multa aqua commiscentes, quod inerat ualidum mixtione & coctura subtrahebant minuebantque, quicumque uero nec sorbitiones poterant superare eos ad pocula deducebant, hacque usu & copia obseruando quod modice

dice, ac æquo quodāmodo haberet, nec plusquam oporteret, nec minus, nec meratius, nec dilutius, nec serius, propinabant. Hoc autem probe scire oportet, quibus sorbitiones in morbis non conferunt, & considerare nā cum fecerint febres irritantur, & crescunt dolores, clarumque fit quod propinatur, & infertur, morbo quidem nutrimentum & incrementum esse, corpori vero tabem malum & exitium. Quibus autem sic habentibus siccus cibus panis placenta plus mazæ, & si pusillum datur, decuplo magis malum crescit quā si sorbitio, nullam aliam ob causam nisi cibi vebementia quæ ad malum quo quis afficitur non facit. Nam cui sorbere confert comedere vero minime, hic si plusculum assumat magis afficitur, cuius languoris causa huc referatur. Nā quæ ualide materiæ sunt maxime & apertissime sanum lædunt, nedum languentē. Hucusq; Hyp. aut thesalus eius filius. In quibus verbis triplicem designauit victum, nempe quæ comeduntur sorbentur, & bibuntur, nempe crassum tenuem & tenuissimum. In apbo. quartū addidit nempe ultimo tenuissimum quem recte Gal. omnimodam cibi & potus abstinentiam interpretatus est. Vt ipse aperte secundo de victu auctorem ostendit. Ita ut totus victus quadriariam diuidatur nempe in ea quæ comeduntur, sorbentur, & bibuntur, & in omnimodam cibi & potus abstinentiam. Verum si ea quæ sorbentur bisariam partiaris nempe in crassam & tenuē sorbitionem; habebis differentias in quas omnes. Hyp. victū partitus est. Verum quatuor ex ijs sunt quæ acute egrotantib. con-

DE VICTV FEBRICIT.

ueniunt nempe crassa sorbitio, tenuis, pocula, et omni-
moda abstinentia, quorum meminit Hip. in libris de ra-
tione uictus in acutis. Crassæ sorbitionis in primo,
cum de eo uictu agit quem hordei substantia præstat
duplicem ab eo sorbitionem parans, nempe crassam et
tenuem, illam absolute ptisanam aut totā uocat ptisa-
nam aut hordeaceam, & est quæ post integram hordei
coctionē non collatur, hanc cremorē siue succū ptisanæ
nuncupat, & est succus qui post collaturam remanet.
Vt scriptum est à Gal. primo de ratione uictus in expo-
sitione illius talia autē parte plurima prosunt ijs &c.
Ea ergo quæ comeduntur crassum, sorbitiones crassæ
ut tota ptisana tenuem, tenuis sorbitio ut ptisanæ cre-
mor exacte tenuem, potus ut melicratum tenuissimū,
omnimoda abstinentia ultimo tenuissimū uictum con-
stituunt. His omnibus cōsentire Gal. scito in eo apho.
tenuēs & certe diætæ ab eo loco nunc sufficit tantum
dicere ad finem. Quo in loco Nicolai uersio ita habet
nunc uero tantum dixisse sufficiat quod in omnibus
morbis quibus maximus vigor & iudicatio primis qua-
tuor diebus futura sit modo natura sit fortior, inte-
gram inedia seruare debemus. In quibus uero non ul-
tra primam septimanam protrahuntur forti exi-
stente natura solo utendum est melicrato, solus au-
tem & hic ipse uictus tenuissimus esset non tamen
in extremo & cætera. Græcus tamen cotextus,
duo uerba addit hoc modo *ἢ ὡς ἀρχὴ τῆς τροφῆς αὐ-
τῶν ὡς ἐφ' ὧν μὲν αὐτῶν νοσημάτων ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ κρίσις ἐν τῇ πρώτῃ μέ-
τῃ γίνεται, τετραδὶ τῆς δυνάμεως ισχυρᾶς ὑπαρχούσης ἐπὶ αὐ-*

σῆτας παντελούς τούτους φυλάξομεν ὁ περὶ τῶν ἐσχάτως λεπτοτάτης
 διαίτης &c. hoc est nunc uero tantum sufficiat dixisse,
 nempe in quibus morbis uigor & crisis in primis quat-
 tuor diebus futura sit, uirtute forti existente, in absti-
 nentia omnimoda hos seruabimus. Quod quidem est ul-
 timū tenuissimi uictus. In quibus uero nō ultra primā
 septimanam, forti existente uirtute sufficiat melicra-
 to solo uti. Tenuissimus sit hic solus uictus, non ta-
 men in ultimo. Ex quibus uerbis & ex ijs, quæ ad fi-
 nem Apho. scribit, aperte ostendit per crassum, te-
 nuem, exacte tenue m, tenuissimum, & ultimo tenuissi-
 mum uictum, intellexisse id, quod supra diximus. Ho-
 rum quinque uictuum generum meminit Hip. in libris
 de ratione uictus in acutis.

CAP. II II.

GAL. hypocratica diuisione non contentus, quæ
 ciborum diuersas formas respicit. Eorundem penes ui-
 rium dispositionem uariam, quam cibaria diuersa indu-
 cunt, aliam denuo diuisionem super addidit. Omnem ci-
 bum in crassum, symetrum, & tenuem diuidens. Vires
 augere ualens alimentum, crassum dicens. Seruare, sy-
 metrum. Tenuem, minuere. Quæ qualiter sunt intelli-
 genda uerba, dicere opus est. Nam si crassi, symetri, &
 tenuis notiones quas assignauit Gal. respectu uirium sa-
 nitatis tempore intelligas, nullus utique symeter uictus
 ægrotantibus daretur, nam satis manifestum est nulli
 contingere ægrotanti quantumcūque crassis utatur ci-
 barijs æque robustum in ægritudine seruari ac fuerat
 ante morbi inuasionem. Quod si ad tempus ægritudi-

A phorif-
 timorū r.

DE VICTV FEBRICIT.

vis referas tenuis non datur, non præter omnimodam abſtinentiã & aquam frigidam, quem nam assignabis uictum qui ex ſui ratione vires ægrotantis imminuat. Ego quidem nullum eſſe uictum quantumcũq; tenuem qui vires, acuto morbo ægrotantis, nõ augeat exiſtimo. Nam ſi ptisanam dicas, audias Gal. in primo de uictu acutorum in expoſitione illius at ſi os madefcat ubi ita de ptisana ſentit. Ergo qui probe expurgantur inquit, his ptisanam dare oportet, non ut uirtutem modo roboraret, uerũ quoq; et his, quæ per tuſſes ex pulmone fiunt, humidorum expulſionibus opem ferat. In quo quidem contextu ſic habet Ioannis Vaſſei uerſio. Sed apertius græcus contextus id quod propoſuimus oſtendit, nam propoſitionem affirmatiuam facit, in hunc modum. Dare igitur oportet probe expurgatis ptisanam, cauſa roborandi uirtutem &c. Audiſti ptisanam uirtutem roborare poſſe. Idem de mulſa ab eodem intelliges tertio de ratione uictus in expoſitione illius uini autẽ & melis &c. Ubi copioſiorẽ ex mulſa nutritionẽ aſſerit, quã ex uino. Idẽ apertius oſtendit in expoſitione illius damna ta aut propterea &c. Non ob id ergo tenuem dixiſſe uictum putandum eſt quod ægrotãtis vires minuat. Crassi igitur uictus, ſymetri, et tenuis rationes, ſanis referendas eſſe, ut crasſum eum uictũ dicas, qui ſani corporis vires augere poſſit. Symetrum qui euſdem vires ſeruare. Tenuẽ eum qui ſani corporis vires haud quaquam ſeruare ualeat. Hunc acute ægrotantibus conuenire ſcribit. In chronicis uero morbis vires eſſe ſeruandas ſymetro uictu, hoc eſt talem eſſe uictum offerendũ
qui

qui laborantis cum sanus erat vires seruare posset. Tenuem igitur qui sano Socrati vires seruare non poterat acuta febre egrotanti & iam imbecilliori effecto si ministras easdem augebit. Nam non aliter quam si in ingenti pira ut ignem eadem serues magnitudine, certa lignorum multitudine opus est. Quod si eundem augere, maiori. Finge nunc ignem aut ob aquæ effusionem, aut ob quodcunque sit imminutum, minori profectò lignorum congerie seruabis, & augebis. Consimiliter hominum corpora, cum prospera fruuntur ualitudine crasso cibo & multo indigent ut uirium robur seruetur, aut augeatur. Cum ob morbos uirtus corporis imbecillius est affecta subtiliori cibo & eius minori copia et seruari & augeri possunt. Quare mirum non est si à mellicrato, uino, oximelite, & similibus vires acute egrotantium augeantur. Cuius euidentis præstant argumentum uiatores & operarij. Cum integra die à cibo & potu abstinuere, hos uespere uix corporis onus sustinere posse. His tunc temporis mellis & aquæ parum si porrigas, alacriores eos ad opus reddes. Hoc ita esse, ostendit Ionatham Saulis habreorum regis filius, qui vires resumpsit, id mellis gustans quod extremæ uirgæ inhæsit. Non est igitur quod acuto morbo laborantis vires, mellicrato augeri non posse credamus. Cum ergo in artis operibus id uerum esse probemus, nempe cibum & si tenuissimum acute egrotantis vires augere posse; nullus utiq; tenuis dabitur cibus, sed omnis crassus erit si crassi & tenuis rationes ad ægritudinis tempus & non sanitatis referas. Sed non ab re fuerit uerba Gal. in

DE VICTV FEBRICIT.

presenti graece adducere quandoquidem de ijs contentio est ut sciatis quantum dictis conueniant. λιπήδαι δὲ ἐλύονε δυνάτων ἢ δὲ λιγοτρόφων ὄιον περ καὶ ὁ τῆς πεισάνης ἐτίχυνος ὅρος δὲ αὐτῆς ἢ τῆς δυνάμεως ἐστὶ καθαίρεισις ἥς περ ἕνεκα καὶ τρέφομεν ὅθι μὲν εὖ τῶν ὑγαινότων αἰὲν χρὴ τὴν ρώμην τῆς δυνάμεως φυλάττειν ἢ παράξαι ταῖς τροφαῖς ὃ καθαίρειν καὶ εἴη αὐτῇ ἢ μὲν παράξουσα τροφή ἀδρά ἢ δὲ φυλλαττούσα συμμετρος ἢ δὲ καταρούσα λιπή, *hoc est tenuis uictus per pauca edulia uel per ea quæ parum nutriunt, quale est ptisanæ succus, terminus ipsius, uirtutis est imminutio. Cuius causa nutrimus. In sanis igitur semper oportet robur uirtutis seruare, uel augere alimentis, non minuire, & statim clausula non finita ita ait ijs, quæ de sanis dixerat, sequentia annectens. Et sit quidem augens alimentum crassum, seruans uero symetrum, imminuens tenue, hoc inquit fugere oportet semper, subintellige in chronicis, aliorum ultro magis indigeant presentia ipso uti. In egrotantibus raro contingit uirtutem fortio- rem quam acceperimus operari. Dixit raro ethicos & marasino confectos excipiens, quorum uirtutem laboramus singulis diebus robustiorem efficere alimentorū successive incremento. Damus operam ut in pluribus seruare in chronicis, mensurate quidem imminutam conseruare in acutis, si enim seruare ipsam qualem acceperimus in iis, uel augere semper properaremus, addemus in morbum. Ex quibus uerbis colligitur in chronicis dandam esse operam ut cibo & potu id uirium, quod à morbo absimitur quo ad fieri possit reponamus. In acutis uero id non dari. Satisque esse si partem detrimenti uirium, tenuis uictus ope refarciamus. Ma- iorem*

iozem & modo minorem prout nobis uirtutem posse
sufficere uisum fuerit. Et hoc est quod dixit mensura-
te quidem imminutam conseruare in acutis. Ea ergo
quæ comeduntur crassum uictum constituunt, ob id
quod eo uictu sanorum corpora seruātur & augmentur;
sorbitiones uero tenuem, nam uires sanorum ab ijs ser-
uari nō posse si eis solummodo utantur. Pocula tenuis-
simum, maximum siquidem uirium detrimentum pa-
tientur sana corpora, aliquot diebus ab iis solummodo
alimoniam suscipientia.

CAP. V.

ALITER tenuis uictus ratio intelligatur, pro-
ut Gal. exposuit in eo loco damnata autem propter-
ea &c. Vbi imbecillitare & nullo pacto nutrire & pa-
rum nutrire non idem esse ait. Diminuunt inquit vi-
res, sanguinis eruptio, deiectio superflua, sudor in-
modicus, & per accidens sibi abstinentia, hæc uere
imbecillitare dicuntur. At quæ nullo pacto nutriunt
ut aqua eā imbecillitare nec roborare uires quispian
uere dixerit, nisi id per accidens contingat. Ter-
tio sunt loco quæ exigue nutriunt, et potuisset quidem
si quis solis ipsis usus fuerit, mori non equidem quia ui-
res diminuunt, sed quia non sufficienter roborant. Ex
his est mulsa, nā si quis diebus quattuor cibo priuatus
interire possit, is mulse usu, non quintam modo diem,
uerum quoque & sextam attinget. Ex his elicitur uer-
bis quod cum in apho. dixit de tenui loquens uictu,

3. de ratio-
ne uictus.

DE VICTV FEBRICIT.

λεπὴ καὶ ἀρροῦσα, hoc est imminuens tenuis, nō quia uere uires imminuat dixit, sed quia non sufficiēter roborat. Danda est ergo opera ut agrotātis uires cibo tantisper augeamus, quatenus id citra manifestam lesionem fieri possit. Longa didici consideratione quod postea à Dionysio medico patre meo, uiro apud Lusitanos clarissimo accepi, agrotantibus quibuscunq; saluberrimum esse, medicum id agere ut uirtutē citra morbi aut eius durationis additionem, roboret. Qua de causa inuente sunt ab antiquis sorbitiones et pocula acutis morbis uictus idonei, qui sanē agrotantis uires citra noxam augeant, & faciliē ab imbecilli superentur natura. Quorum uno aut altero prout morbi constitutio est utūtur.

C A P. VI.

HIS ita determinatis methodum de recto febricitantibus ministrando uictu, incipiam breuiori & facilius quam possim uia. Quinq; habet uictus debita administratio considerationes, nempe uictus formæ, quæ græci διαίτης σχήμα uocant, deinde quantitatis, qualitatis, numeri, & horæ, horum singula inuestiganda fore à medico qui uictum agrotantibus conuenientem ministraturus sit. Uictus forma à uirtutis robore & status distantia sumitur, ut scribitur libro Apho. Vt si longē fuerit morbi status symetro utemur uictu, quod si propē tenui, tenuissimo uero, si propriissime, quod si iam affuerit, ultimō tenuissimo. Ad hæc uirtus corporis consideranda est, an talem uictus speciē ferat, quam status distantia præscripserit. Verum in hoc negotio primum querere oportet, an recte à distantia status

status & à uirtutis robore, uictus formam inquirere oporteat. An potius cum uirtute, morbi dispositionem considerandam esse, ut recte uictum agrotantibus diffinire possimus. Rationales medici qui Hip. insequuntur à uirtutis robore & à distantia status uictus formam inuestigandam ideo esse opinantur, quod sola corporis uirtus sit, quæ cibum pro sui custodia indiget. Nam ut uitale robur seruemus, iò cibum agrotantibus exhibemus. Ut scripsit Gal. in expositione illius postea si dolor &c. Virtus igitur pro sui custodia eum cibum indicat quo maxime seruari possit. Morbus autem talem diffinit, ut eo ad uigorem, solum sufficere possit agrotans. Nam apud hunc, morborum iudicia ad salutem aut ad mortem fiunt. Eo usque igitur uirtutem seruare cibo oportet. Crassiores uero exhibere quo ultra durare queat, damno erit, nam morbum augebimus. Nam si morbosam affectionem nullo pacto offenderet alimonia, nos uirtuti soli attendentes, ægros ut sanos aleremus. Sed quia sæpius noxam uti ostendimus affert, ob id morbi affectionem non tanquam cibi indicatricem, sed tanquam prohibtricem contemplamur, ut Gal. prudenter citato loco scripsit. Virtus ergo pro sui custodia omnem cibum indicat, quem apparare possit, ab hoc morbus omnem abscindit, quo ultra uigorem durare queat agrotans. Id tunc conijcimus, cum eo subtiliori scimus ad statum durare posse. Quare si ad uigorem usque sufficere posse agrotantem existimemus solo uictu per pocula, sorbitiones non dabimus. Sed nec ea quæ comeduntur, idque ob morbi rationem ut

In r. dera
tione ni-
tus.

DE VLCTV FEBRICIT.

scite ab Hyp. scriptum est in hac verba. Postea si dolor quispiam vel periculum comparuerit, sorbitionem dare oportet, neque multam neque crassam sed post septimum aut nonum si validus sit. Audis Hyp. sorbitione supersedere ad septimum aut nonum vsque, cum in eis iudicationem futuram speramus, ubi ager citra sorbitionem eo usque possit sufficere. In cuius expositione Gal. ita scribit. Cum igitur virtus ad morbi vsq; iudicationem sine ptisanæ sorbitione suffecerit, oximeli & aqua mulsa satis sunt &c. Ex quibus manifestum est videtur eum eligendum fore, quo cum corporis virtus sufficiat & eo subtiliori non. An non ne id ab eodē loco citato colligimus, ubi ita ait. At si iudicationē septima die citius futuram speraueris ut verbi gratia vel quarta vel quinta agros sane multos sufficere citra ptisanæ sorbitionem posse comperies, quod si ad septimam vsq; protrahatur paucos omnino. Qui igitur citra ptisanam sufficere possunt, ijs oximeli & aquam mulsan exhibere docuit. Qui uero non ptisanam Quinimmo si absq; cibo & potu ad iudicationem vsque durare posse speremus, omnimodā ei inediam consulemus. Ut ipse Hyp. aperte monuit secundo eiusdem de ratione victus ubi ita ait. Ciborum autem adiectioni intendendum multo minus, subtrahere uero omnino sæpenumero expedit, cum ager sufficere possit donec maturescat morbus. Quod Gal. confirmat in hac uerba. Nempe si ager ad morbi usque uigorem sine cibo sufficere posse uideatur, in omni ciborum abstinentia eum & potu solo cum tibi uidebitur necessitas moderaberis. Vocetur autem ille

Idē eodē
2. in expō-
ne illius in
terdum au-
tem & cru-
da.

ille victus quo ad statum sufficit agrotans & eo subtiliori non, medius, hoc subtiliorem exhibentibus corporis uirtus exoluitur, morbus autem incrementum assumit, eo crassiores ministrantibus. Quare rationaliter à distantia status tanquam à termino ad quem usque ducendus sit ager, victus formam inuestigandam esse rationales opinantur. Nec hoc in arte medica solum didicimus, uerum in rebus humanis id licet obseruare. Prudentem uiatorem quingenta profecturum miliaria, haud nimis festine equitare. Sed moderato ducere equum incessu & labores diurnos nocturna temperat quiete. Nec solum labori modum imponit, uerum & cibo quo equum nutriri oportet, ut eo durare possit. Quod si unius diei acturus sit iter haud necessarium putat quicquam obseruare. Nonne idem nauigantes obseruare uidemus. Nullum quidem sibi parant uaticum, qui à Calesijs in Angliam se recipiunt. Non sic qui à Venetijs Epidaurum Ragusiorum oppidum proficiscuntur. Iis longe dissimile quod Lusitani Indos petaturi magnis parant expensis. Ii omnes non ab alio uaticum rationem sumunt, quam ab itineris mora. Cōsimiliter in arte medica agrotantibus victus formam sumendam à distantia status recte quis ratiocinetur. Nam proxime huic adsunt morborum iudicia alterutrum exitum minantia. Sed age, si à distantia status victus formam non queras, à quo nam altero ultra uirtutem indicationem sumes? A morbi dispositione forsan ais, sed cum singulis morborum quattuor ad sint dispositiones, quarum differētiā sensu licet percipere

DE VICTU FEBRICIT.

pere, nempe principium augmentum statum et inclinationem. A qua non harum victus formam sumendam putas. Proinde cum apud principia & fines omnia sint imbecilliora, apud statum uehementiora, crassiorē quā expediat ministrabis si ab illis, aut plus iusto tenuem si ab ijs, indicationem victus sumas. Præterea cum nulla sit morbi dispositio quæ cibum indicet sed omnis prohibeat, ut supra ostensum est, cunque alio sit alius acutior & uehementior morbus, non ex æquo omnes pariter prohibebant, sed unus magis alio. Cunque uirtus eum semper victum indicet quo maxime seruari possit, quem ab ijs duobus quorum alterum unum indicat & id alterum prohibet elicere possis victum. Finge uirtutem pro sui custodia victum indicare per ea quæ comeduntur, si morbus multū dissuadeat, quid ab eo victu detrahes, quid ue cum parum prohibuerit. Insuper unde similes in detractionibus scias aut possis proportionem obseruare, ac in morborum dispositionibus erant. Cæterum non obstiterit, plures esse morbos, qui inæqualiter ægrotantes affligant, ita ut hodie mitius habeant, in crastinum deterius degeant. Modo absque febre ulla, postmodum magno æstu excitentur. Aliquando dolores labores ue patiantur, quandoque nullo symptomate infestentur. Non ob id fieri non posse, ut una victus forma, morbis inæqualiter affligentibus conueniat. Nam & si non eadem ratio in die accessionis et in die quietiori habenda sit, quo maxime differre oporteat, non victum esse, sed tempus quo innoxie cibum offeras. Eandem nanque uictus

Etus formam quam à robore uirtutis et à distantia statutus sumpsisti, perpetuo ab initio morbi ad statum seruare oportet. Sed tempus obseruare expedit quo innoxie cibū offeras. Nam in paroxysmis subtrahere oportet, apponere. n. lēsis, ut in aphor. scriptum est. Vnde licet colligere ab uniuersali victu formā à particulari vero qui singulis accessionibus conueniat, cibationis idoneum tempus suppeditari. Quod manifestus alibi scripsit in hæc verba. Tempus autē dandæ sorbitionis tum per initia, tum per omnem morbi decursum, nam si pedes frigidi fuerint non à sorbitione modo, verum quoque & maxime à potu temperandum. At cum caliditas ad pedes descenderit, tunc dare expedit. Idem sub alijs verbis dixit. Cum purgaueris inquit sorbitionibus quibusdam utitor, obseruatis ita febriū accessionibus, ut nunquam cum adsint neque cum futura sint exhibeas, sed vel cum cessant uel quieuerint & maxime à principio recesserunt. Frigentibus ergo pedibus, neque potum, neque sorbitiones, neque aliud quippiā huiusmodi dabis. Sentis in ijs duobus locis Hyp. de particulari victu egisse, ut singulis conuenit accessionibus ubi nihil à totius uictus ratione diuersum docuit, quā tempus cibationis idoneum. Idem intelligendum est dedisse in apho. perceptum, cum dixit in paroxysmis subtrahere oportet, quod confirmat Gal. citās. in expositione locum Hyp. quem supra adduximus quarto de ratione uictus. Non igitur eo quod morbi inæqualiter affligant alio utemur uictus quā uirtus & distantia status. indicauerunt, ut aduersarij opinantur.

In 2. de
tione ui-
ctus

4. de ratio-
ne uictus

DE VICTU FEBRICIT.

CAP. VII.

VERVM eorum qui contra sentiunt, rationes au-
dire oportet. Haud facile esse in arte medica metho-
dum tradere, qua id quod est, tale esse dignoscamus,
nedum quale illud futurum sit. Difficillima quidem in
omni arte præcognitio est. Quapropter facilius à uir-
tute & morbi dispositione uictus formam eliciemus,
quam à distantia status qui nondum est. Sed quod cer-
tius hinc, manifestum erit. Cognoscere quæ nã sit ægri-
tudo, et quas habeat causas, et quibus nam committata
sit symptomatibus, quã quæ pernicioſa sint, certius sci-
ri possunt in arte medica, quàm præsciri. Minus præter
ea errori obnoxius est, qui à dispositione morbi cum
uirtute uictus formam inquirunt, quàm qui à distantia
status. Nam considerãtes quod est, ob mutationes deci-
pi non possunt. Prout accidit ijs qui quale quicquã erit
considerant. Conijciens medicus ab initio morbi, eius
acumen, talem fore ad septimum aut nonum æsti-
mat. Hac nixus æstimatione uictum inuestigat, quem
& nunc & in posterum ad illud usque tempus ægro-
tanti ministraturus sit. Sed quantum decipi possit ad-
uerte. Quot sunt quæſo morbi, qui ultra incrementa
periodica & decrementsa inæqualiter moueantur, Ita
ut tribus aut primis quattuor diebus ægrotantes graui-
ter affligant, totidem postea aut plus minúsue citrà iu-
ditiũ intermittant. Deinde iterũ increſcant et luceãt
& ad pristinam uehementiam redeant. Aut si contra
mutatio fiat. Possis ne in his methodice, uiso ab initio
morbi acumine, aut segnitie, qualis erit ad quintum
aut

aut septimum aut in sequentes dies certo coniungere. Ut ex hac coniectura distantiam status adipiscaris à qua demum uictus formam diffinias. Cuius in eo quod primum præcognoscendum sumpsisti non parum à ueritate aberres, haud leuiter in eo quod ultimū est, in ægotantem peccabis. Nam paruus error in principio maximus est in fine. Quod si in morbis haud cōtingere huiusmodi mutationes dicas, Hyp. libros de morbis uulgariibus reuolue. In quibus nō paucis hoc accidisse inuenias ægotantib. Ceterū de certitudine mittamus sermonē, et aliquantulū perspicatius rē tractemus. Virtutē eum semper uictū indicare ais, quo maxime seruari possit. Dende status distantiam talem diffinire, quo eo usque sufficiat ægotans, & eo subtiliori non. Vocasq; hunc uictum medium, crassiori non uteris, ne in morbum addas, sed nec magis tenui, ne plus iusto uirtutē exoluas, & ob id ante statum deficiat. Age methodice laboranti Socrati uictum, quem medium uocas, ministras quo ad morbi uigorem posse sufficere æstimasti. Quid per illud uerbum sufficere intelligis. An aliud ab eo quod Hyp. in Apho. intellexit, qui primus illo in hac re usus est uerbo. Cum ait οὐτε κρείσσει δὲ χρὴ καὶ τὸν νοσούντα ἢ βαρύνει τῇ διαίτῃ πρὸς τὸν ἀκμὴν τῆς νόσου, id est coniungere oportet laborantem si sufficiat cum uictu ad statum ægritudinis. Vbi an perdurare possit tali uictu toto inter medio tempore ad statum usque intellexisse, ipse statim ostendit, in eo uerbo quod sequitur καὶ ὥστερον ἐκείνος ἀπαυδῶσα πρότερον, hoc est utrum ille deficiat prius. Quæ etiam significatione uerbum illud intellexit Gal.

DE VICTU FEBRICIT.

ut ab expositione licet conicere, uictum ergo talem ministrare laboranti Socrati intendis, quo perdurare possit toto inter medio tempore ad statum usque. Quod si id simpliciter intelligas, uerbiq; significationem minime restringas, modo quocunque ad statum tali uictu perducatur Socrates sat esse. Quid si adeo imbecillis tui uictus ope eo perueniat ut nulli quantum uis mitissimo morbo sit aptus obistere, nedum morbo maxime apud uigorem saeuiente. An te obtinuisse putabis cum talem uictum laboranti Socrati longam post meditationem inueneris. An hoc est cur palles. Forasan illud uerbum ais, non fore simpliciter intelligendum, sed sufficere ad statum usque, tunc intelligis, cum apud uigorem aliquale egrotantis uires robur obtineant. Et si hoc detur, alia utaris nota oportebit, rem indiuiduam uobis significante. Nam illud tuum aliquale nimis ample patet, nam ea uia, omnis crassus uictus Socrati conueniret. Nullumq; damnare posses uictum ob crassitiē. Quod si uirium robur tantum ex poscas, ut morbificas possit debellare causas & morbi incurfibus obistere. Ridiculum caput, si hoc quod postulas methodice præstare uictus posset, nulla esset adeo pernitiōsa agritudo, quæ non uictis ope medicari posset. Quod si ita rem habere contendas scias saltem, hoc tuum latuisse Hyp: sed ijs omissis fateberis id saltem, apud morbi uigorem labores & symptomata multo uehementiora fieri, quā ante, ut à uestro scriptum est Gal. cum dixit de uigore loquens, μέγιστον τοῦ νοσήματος ὡς ἐν συμπτώμασι, hoc est uigor nihil aliud est, quam maximum morbi ut in symptomati-

3. Aphorismorum.

ptomatibus. Putas ergo sat esse qualicumque uirium robore eo perducatur æger, cum tunc maximus sit morbi conflictus. An salubrius fore ægrotanti, si demus operam ut citra morbi additionem, ægrotantē robustiorem quantum possumus ad statum perducamus. Quis hoc damnabit methodice, non tu, si uera & ægrotantibus salubria sequeris dogmata. Cunque hoc ita sit, finge Socratem citra sorbitionem ad statum sufficere posse, pocula ei ministrabis, ut pote quæ minus alimentum præstant. Scis ne eo uictu Socratem sufficienti uirium robore ad statum peruenturum, hoc quamuis iuranti tibi uix credam. Sorbitionibus quare non uteris. Nam ijs usus robustior esset apud uigorem. Forſan ais, quia in morbum addent. Unde hoc scis quæſo, an à distantia status id coniicias, uel potius à morbi dispositione uel acumine. Quod si dicas, cum statum præcognouero, fieri nequit quin morbi dispositionem cognoscam. Cedo, sed quod horum prius cognoueris dicas, nam id manifestius & certius scies. Ea enim quæ principiorum uicem obtinent, semper manifesta magis sunt, ijs quæ ab eis deducuntur. Cunque à morbi dispositione, status distantiam præcognoscas, morbi dispositionem euidentius cognosces, quam status distantiam. Quare certius & magis citra errorem à morbi dispositione & acumine coniicies, an sorbitiones laboranti Socrati noceant, quàm si idem à distantia status iudicare uelis, esset enim tuum non paucis erroribus iudicium obnoxium. Quare cum in inquisitione formæ uictus, morbus non tanquam indicans

DE VICTV FEBRICIT.

eans sed prohibens admittatur, ut rationales omnes fatētur. Prohibet autem inquantū uictus in morbum, aut in eius auget symptomata. Idq; cum à dispositione morbi euidentius dignoscatur, rectius esse à uirtute & morbi dispositione, uictus formam inuestigare, quàm à distantia status. Ad hæc uires corporum & si hora præsentī conijcias, nō ob id quales futuræ sint in postērum ab initio recte æstimari possunt. Nam multoties euenit, uirtutes corporū exolui plusquam æstimarat. medicus. Aut ob corporis habitum aut naturā aut ob morbi aliquod irritatorium symptomata. Quare si ut uitale robur seruetur, ideo cibus ægrotātibus exhibetur. Hoc non similiter sed morbo procedente nonnunquam præter medici opinionem disponatur, fieri non potest ut à distantia status & à uirium robore prout est in initio, conuenientem uictum tum natura laborātis per totum morbi decursum ad statum usque, tum morbo ob inæquales mutationes eliciamus. Sed sint omnia ut uis methodice. Scito non satis esse in arte medica, uera dogmata docuisse, nisi in artis operib. utilia fore ægrotantibus probentur. Vtilitas enim artis nō est uera disferere, sed remedia inuenire quib. æger sanetur, aut uuetur. Neque satis esse si uera & utilia tradideris dogmata, sed tradere oportet uia adeo perspicua, ut plebi si liceat res innotescat. Sic enim id quod humano generi salubre speramus communissimum faciemus. Quod si aliter sit, demittenda esse ea dogmata, ad quæ percipiēda, aut operibus probanda, difficilis datur uia. Qua propter cum præcognitionis status difficilis admodum sit

fit scientia, & ab ijs solummodo adepta medicis, qui uires omnium quæ in arte sunt probe didicerint, memoriæ mandauerint, omniq; diligentia in artis operibus se exercuerint. Pauciq; cū tales existant, patet demit tendam hanc uiam esse, ut quæ à uiris dūtaxat doctissimis percipi possit. Quare cum facilius & certiori modo res inuestigari possit à morbi dispositione, manifestum est hanc uiam eligendam esse in inuestigatione formæ uictus.

CAP. VIII.

QVAM non esse præter senis mentem paucis acci pe, ut qui primus à morbi dispositione & uirtutis robore, uictus fermam inuestigauerit in libro apho. Vbi ita scribit ubi morbus peracutus est & illico extremos labores habet extreme tenuissimo uictu necessarium est uti. Per labores accessiones & symptomata intellexit quæ morbi dispositiones sunt. Maxime acuto morbo in ediam adhibendam consuluit quæ extreme tenuissimus est uictus. Et infra ait ubi uero non, sed cōuenit crassius reficere, tantum sub condescendere oportet, quantum morbus extremis est mollior. Quibus in uerbis apertissime Hyp. uictum à morbi dispositione seu constitutione inuestigasse uidetur. In eo in super qui sequitur cū morbus, inquit in suo constiterit uigore, tenuissimo uictu necessarium est uti. In quo maximum morbi esse in symptomatibus scimus. Eadem in commentarijs de ratione uictus uia, uictus formam inuestigat. Vt in primo de pleuritide agens ita scribit, postea si dolor quispian uel periculum compaauerit, sorbitionem dare

DE VICTY FEBRICIT.

nec multam neque crassam, sed post septimum aut nonum si ualidus sit. Idem paulo ante apertius dixit, ubi autem dolor aliquis uexauerit, oximeli bibendum dabis. Sentis ex ijs duobus locis ex dispositione pleuritidis, uictum per pocula ministrandum consuluisse. Sed non solum à morbi dispositione competentem uictum inuestigare docet, sed noxium ab eadem deprehendi Hyp. docente eodem cōmentario. Ubi ita scribit. Præterea si lateris dolor assiduus est, calidisque fomentis non remittitur sputumque non procedit, sed summæ glutinosum sit, nisi quis dolorem uel alui subductione uel secta uena, pro utriusuis exigentia soluerit, ptisana autem ita affectis dederit, præcipitè aget in mortem. Nec illud tanquam peculiare ptisanæ fore concipias, nam omnem sorbitionem & multo magis ea quæ comeduntur damnavit, stante tali morbi cōstitutione seu dispositione. Quod ipse statim monet, præbendunt, inquit hæc non solum si ptisana intempestiue utantur, uerum & multo magis si quippiã aliud ederint aut biberint, quod ptisana inconuenientius sit. Sed ut non teratur tempus in singulis citandis locis, unū adducamus in quo Hyp. omnes ad rectam uictus institutionem scopos collegit. Ex quibus post uirtutis robur, morbi dispositionem innumerauit. Coniungere, inquit oportet & robur & morbi cuiusq; dispositionē, homini item naturam atque egrotantis in uictu consuetudinem, nō in ciuis solum, uerum & in potibus &c. Sed hoc idem à Gal. audias tertio cōmentario eiusdem libri in expositione illius. Tutius autē longe &c. Ptisanā, inquit totā porrigit

In 2. de ratione uictus.

porrigit his qui moderate habēt. (Nō qui mitius quie-
tiusq; habent, ut quidam perperam transtulit) solum
vero cremorem ijs qui deterius degunt. Verum ijs qui
periculosius acutiusq; laborāt, potius solos. Ostendimus
igitur in ijs quæ dicta sunt, uictus formā à morbi dispo-
sitione seu cōstitutione unā cum uirtutis robore secun-
dum senis mentem inuestigandum esse.

CAP. IX.

VERVM hæc non satis esse ad rectam uictus
institutionem nisi ijs distantie status præcognitionem
adiungas. Et si enim à morbi constitutione & à uirtu-
tis robore uictum per pocula conuenientem esse scias
in præsentī, non tamen ex his duobus scire posses, ci-
tra status præcognitionem an cibo illo in posterū agro-
tans sufficiat, citra magnum uirium incommodum.
Nam si alicuius pedestri itinere quingenta profecturi
miliaria robur præsens consideres & unius diei iter
sat esse si hominem pane & melle nutrias &c. Pote-
rit enim eo cibo triginta pertransire ea die miliaria.
Quod si reliquum uis consideres, crassiori sibi opus
esse nutrimento iudicabis. Ob id igitur diuinus Hyp-
poc. postquā morborum dispositionem recensisset, sub-
intulit conijcere autem oportet ægotantem si sufficiat
cum diæta ad statum ægritudinis. Non enim sat esse ut
robur uirtutis quale nunc est consideres, & an talem
uictum hodie citra uirium sensibilem lesionem ferat,
sed an toto intermedio tempore ad statum usq; ferre
possit. Ob id Hyp. in consideratione uirtutis, status me-
minit à morbi igitur dispositione uictus formā primū

D ij elicimus

DE VICTV FEBRICIT.

elicimus. Deinde virtutem laborantis inspicimus. Tercio distantiam status coniicimus. Demum aestimamus an eo victu quem morbi constitutio indicauit, virtus egrotantis ad statum citra magnum virium incommodum durare possit. Qua propter status distantiam præcognoscere oportet ultra morbi constitutionem, ut recte egrotantibus victum diffinire possimus. In qua sententia Gal. esse scito in libro aphorismorum in eo paroxysmos, & consistentias. vbi à duobus victus formam inuestigare docet nempe à uirtute & morbi constitutione, in qua morbi dispositionem, & status distantiam comprehendit. Cuius verba ita habent.

Τὸ μὲν τῆς ὅλης διαίτης σχῆμα πρὸς δύο σκοποὺς ἀπεβλέπων ἔπειτα τῶν τὴ δύναμιν τῆς κείμενης καὶ τῶν κατὰ τὴν νόσησιν τῆς νοσήματος τοῦ γὰρ ἢ τε κατὰ τὸ ἢ τε ὀξὺ ἢ τε χρόνιον ἔστω τοῦ νόσημα καὶ ὁπλῶς καὶ μάλιστα τῶν ἀκμὴν ἀποδίφεται, τῶν κατὰ τὴν νόσησιν ἢ τε νοσήματος σκοπεῖν, hoc est totius victus formam duos respiciens scopos instituit, egrotantis nempe uirtutem, & morbi constitutionem, illud enim siue peracutus siue acutus siue chronicus morbus erit, & quando maxime in statu consistet, constitutionem morbi est considerare. Vnde male quidam vertit hunc locum in hunc modum, nã si morbus sit peracutus uel acutus, uel longus & cæt. Litere sensum corrumpit & non translulit. Ex quibus uerbis duo sub constitutionis nomine comprehendisse Hippoc. nempe morbi acumen, & status distantiam, aperte ostendit Gal. Verum unde peracutum & acutum cognoscas & discernas & eos qui inter hos medium obtinent locum infra ostendemus.

Cap.

Ita determinatis. Morbo peracuto quique intra quartum diem terminandus sit ultimo tenuissimo uictu utemur. Quem supra omnimodam sumus interpretati abstinentiam. Sic dixit Hyp. ubi peracutus morbus fuerit, & statim ultimos labores habet, ultimo tenuissimo uictu necessarium est uti: Per morbum qui statim ultimos labores affert, eum intellige qui intra dies quatuor finire debeat. Et subdit ubi uero non, plenior uictum adhibebimus. Hoc est ubi morbus ab ultima symptomatum uehementia proxime degenerat, (qualem qui ad septimum terminantur, habent) eo utemur uictu, qui inedia proximus est, talis autem est uictus per pocula ut melicratum, & similia. Huic tali uictum per pocula ministrandum fore consentiente uirtute asserit Gal. in expositione illius. Postea si dolor quispiam &c. Vbi ita scribit, si enim ualidus ad septimum usque diem fuerit, oximeli & melicratum & aquam dare satis erit. Per quæ ut dixi tunc liberabitur & sanabitur. Idem dixit prima Apbo. in quibus uero, inquit non ultra primam septimanam protrahuntur, forti existente natura solo utendum est melicrato &c. Qui uero morbo simpliciter acuto laborant, cuius terminus ad duas finitur septimanas crassa sorbitione, exempli causa, tota prisana uti debent. Qui autem morbo acuto laborantes periculi magis participes sunt, ad undecimum terminum habituri, tenui sorbitione alendi sunt, ut cremore prisane. Hæc similiter secundum mentem sunt Gal. in libris

Primo de
ratione ui-
tus.

DE VICTU FEBRICIT.

de ratione uictus. . Iis ergo qui peracuto morbo intra primos quatuor dies terminando laborant, omnimodā conuenire in diem. Cum uero eo morbo laborat qui ad septimū terminari debeat, pocula. Ex ijs duabus uictus rationibus quæ ab Hyp. didicimus manifestum fit quibus utraque sorbitio competat. Nam cum has quatuor uictus rationes, acute agrotantibus cōuenire supra ostenderit, terminusq; acutorū morborum xiiij. sit, manifestum fit quod utraq; sorbitio ijs cōpetet morbis qui xi. & xiiij. terminū habituri sunt. Cūq; ij qui xi. finēdi sunt morbi, grauius affligant, quā qui xiiij. ijs tenuē exhibendā, qui uero xiiij. crassam fore sorbitio- nē manifestū est. Morborū igitur acutorū intra xiiij. diē terminandorū, huius est uictus ratio à morbi consti- tutione diffinita. Hæc autē nihil aliud est quam morbi dispositio, terminos morborū diffiniens. Non immerito igitur ab huius termini distantia, uictus agrotantibus diffiniendi sunt. Cūq; quatuor assignentur ab Hyp. in dies xiiij. quaternarij, qui primā sensibilem differentiā morborum in acumine præstant quibusq; ut plurimum terminari morbi acuti solent, singulis suā uictus spetiē diffiniuit, prout morbi ad inuicem acumine differunt. Ita ut quatuor qui intra dies xiiij. sunt terminis, qua- tuor similiter uictus formæ respondeant.

C A P. X I.

SUPEREST nunc, quibus nam signis febrium singulas quæ ad quartum, & quæ ad septimum, undeci- mum, & quartumdecimum terminū habituræ sint no- scamus. Maxime enim conducit in arte medica sen-

si ea discernere que cognita egrotantibus salutifera sunt. Deinde de uirtutis robore sermonē faciemus, ut pote quod nō minus indicatiuū est formæ uictus quàm morbi constitutio ut infra ostendemus. Prius tamen unum querere oportet, an cōmittendum sit aliquo in morbo egrotantem diebus quatuor omnimoda seruare inedia. Res ardua uidetur profectō præter assuetudinem hominem incibatum ad diem quartum ducere. Nam ut Hyp. in libro secundo de ratione uictus scribit, oportet disciplinam que conferat ex sanorū uictu facere. In cuius expositione Gal. ita ait si sanis læsionē afferent, repentine uictus ad cōtraria mutationes, multo maiore egrotantibus. Ponimus igitur hominem sanum uiribus ualentē, aut inualidum, si uelis, ab assuetō uictu ad quatuor dierum inediam repente mutari. Qualem hunc uesterascente die quarta fore æstimas. Profectō si mortuus non fuerit, semimortuus iacebit, collapsis uiribus, qui an cibo & potu refici possit, necne, n. parum dubito. Cum igitur hoc sano accadat, ex illa repentina mutatione, quid egrotanti maius illo accidere potest nisi ipsa mors ex totidem dierū inedia. Res plena discrimine uidetur, egrotantem sine cibo & potu, ducere usque peracuti morbi inclinationem. Qui ad quartum quandoq; ad quintum protrahi eius crisis potest. Ut Gal. uisum est. Præterea cum morbi quibus inediam consulimus, maxime acuti sint, & ob id perniciosi, haud quaquam medicus uulgi calumniam effugere posset, si post quatuor dierum ieiunium moreretur eger. Non quidem ob morbi uim, sed ob inediam

1. Aphorismorū.

DE VICTU FEBRICIT.

mortem subsecutam vulgus clamaret. Vbi insuper hoc ab Hyp. didicimus. Et si longiorem hæc disceptatio sermonem exposulat, solam tamen eam quæ ad rectâ institutionem & ad ægotantium commodum spectant attingant. Sequens summa rerum fastigia. Non omnem mutationem quæ ægotantibus repente accidit, molestior rem ijs esse quam sanis. Nam id nos sanorum experientia, docet, prandium præter assuetudinem demittentes moleste ferentes. At febre si corripiantur facile eis esse prandium assuetum dimittere. In sola igitur dissimili siue disproportionali mutatione peius habent ægotantes quam sani. Vt si ab inedia unius diei aut duorum ad crassa cibaria mutatio fiat, peius habebunt ægotantes quam sani. Quod si a crasso victu ad inediam mutatio fiat, grauius ferent sani quam ægotantes. Ob id quod mutatio dissimilis est, mutatio enim victus ab inedia ad crassa cibaria, ad maius est, quam ob rem maiori opus erat virium robore, ægotantes uero dissimiliter mutantur nempe à maiori virium robore ad minus, quare molestius ferent. Hoc arbitror sensisse Hyppoc. cum ait mutare quidem bene habet non modicum recte sanè transferatur & mutatio. Illo uerbo recte quod græce ἐπεὶ dicitur proportionalem intellexit mutationem quam pluribus ostendit exemplis, hoc idem sed obscure admodum ut solet, dixit in eo textu qui ita incipit τὸ μᾶλλον δὲ τοιοῦτ' ἐν μέσῳ, hoc est iuuandam partem hanc sermone contrario. In cuius expositione Gal. uerbum ἐπεὶ non interpretatus est. Sed dixit Hyp. non paucis ostendisse quid per illud aduerbium indicare

2. de victu
acutorum.

Eodem 2.
bib.

indicare uoluisset. Tu ergo breuem habes de mutationibus repētinis sententiā, quam arbitror scriptis Hyp. conuenire. Quod de uiriū maximo detrimento ex quatuor dierum inedia dicitur, citra est. Noui Hæbreum sex diebus abstinentem apud Lusitanos & plures sunt qui triam dierum abstinentiam patiuntur, citra in signe incōmodum negocia obeuntes. Qua in regens Hæbreorum firmum ualeat præstare testimonium, ut quorum plurimi annuatim huiusmodi trium dierum abstinentia corporū absumūtur libidines. Unde ijs magnitudine morbi suadente citra ullū discrimen quatuor dierum inediam consulet medicus. Alijs uero propter inassuetudinem non nisi urgente morbi uehementia, & uirium imbecillitate id non dissuadente, tum corporis habitu tali ut ob pororum angustiam & cutis spissitudinem haud facile corpus effluat, præcipue media hieme hæc si coniungantur omnia, quatuor diebus hominem omnimoda seruare abstinentia nō uereberis. Aliquo horum deficiente potum dato. Verum ad hæc forsā aliquis insurget, nā & si hæc duo cōcedantur. Nēpe cibum quantumcunq; tenuē ijs esse læsioni qui peracuto morbo laborant, ut in superioribus initio huius operis demonstrauius, & ab inedia quatuor dierū minus egrotantes ledi quā sanos, non constat ob hæc utrum eorum magis conferat, aut minus ledat, nempe inedia, aut uictus tenuissimus. Quod si ab Apho. locū argumētationis sumamus in paroxysmis subtrahere oportet &c. Dubitationis occasionē dederimus, nā in paroxysmis læsio q̄ ex inedia unius diei prouenit, par-

DE VICTU FEBRICIT.

na est, quæ uero à cibi oblatione, maior, nam cibus eo tempore sensibili nocumento esse solet. Inedia vero unius diei cum parum sano noceat, minus ægrotanti nocebit ut ostensum est. At in peracuto morbo & si cibus non parum ledat, magis fortasse quatuor dierum inedia nocebit. Nam scimus sani corporis robur à quatuor dierum abstinentia prosterni: quapropter cum alia ad id discernendum non detur via, de consuetudine rogare oportet. An unius aut duorum aut trium dierum inediam sustinuerit. Quod si parum fuisse letum ostendat, audacter eum incibatum ad dies quatuor seruabimus. Præsertim ubi corporis habitus talis fuerit ut non facile effluat. Quod si ægre ferre unius diei ieiunium dicat, huic non inediam sed uictum per pocula ministrabimus. Quod ad medicum spectat sciendum in arte medica, neque curatiuam indicationem neque victus rationem à vulgi opinione sumi. Vnde pius Medicus quod de se ipso Gal. scripsit, opinetur equum est. Nescio inquit quo numine inspiratus, aut furare percitus, & famam vulgi contempsi & solo veritatis studio scientieque flagraui, nullam honestiorem possessionem esse ratus. Neque hoc extra mentem Hip. est. Qui ita scribit non igitur intempestiue neque fortis vaforum inanitiones moliri, neque cum morbi uigent aut in flegmatia sunt, quicquam exhibere. &c. Cunque morbi vigor nihil aliud sit quàm morbi in symptomatib. summum. Ut à Gal. scriptum est, manifestum est peracutum morbum in quo ultima accidunt symptomata statim vigere, quapropter secundum senis mentem mini-

7. de metho
do me
dendi.

2. de ratio
ne uictus.

1. Aphor.

ministrandum non esse quicquam. Idem uoluit alibi cum dixit. Adiectioni autem ciborum intendendum multo minus, subtrahere vero sexpenumero expedit cū æger sufficere possit, donec morbus mature scat. In Apho. præterea dixit. Ubi morbus peracutus est &c. Ultimo tenuissimo uictu quem omnimodam sumus interpretati abstinentiam, utendum esse monet: statim extremos habere labores intelligit, cum intra primos dies quatuor summus morbi futurus sit uigor, ut est sententia Galeni.

2. de ratio
ue uictus.

Aphor. 1.

CAP. XII.

NEC in ijs solum qui intra quartum diem terminantur morbis, virtus est inspicienda, sed in alijs qui ad septimum; quos potibus nutriendos supra diximus. Quæ si imbecillis in presenti sit, aut in posterum ante diem status imbecillem fore speras, non solum poculis hunc, sed tenui sorbitione nutries. Primum ex pulsu cognosces. Secundum ex corporis habitu, an facile transpirabili & ex tenui succorum substantiam. Qua in re consentit Gal. in expositione illius. Postea si dolor quispiam &c. Idem dixit in commento illius. Tenuis & exquisiti victus &c. Quod si inquit natura robori non fidamus, ptisana utemur succo. Idem est in alijs iudiciū, semperque proxime crassiorē victū ministrabis cū vitalis facultas eum uictū nō ferat, quē morbi constitutio indicauit. Vitale aut robur cuius seruan di gratia nutrimus, ex pulsu cognoscendū diximus, quale in presenti hora est. Quale autem erit in posterum, ex corporis habitu, nempe an raro an denso, & ex di-

Lib. 1. de
uictu acu-
tarum.
1. Aphor.

DE VICTV FEBRICIT.

positione succorum, nempe an crassi an tenues, & ex consuetudine, id est an multum & multoties adere sit solitus aut modicum & raro. Hæc omnia imis reconde sensibus nā ægrotantibus salutem & tibi gloriā haud quaquam inanem parient.

CAP. XIII.

NUNC quos peracutos qui ad quartum terminentur & quos acutos qui ad xiiij. & quos inter medios dixeram, unde cognoscas audi. Morbum quē græci *κατὰ* dicunt nos uero peracutum interpretamur, & qui ad diem quartum finitur per ultima discernes symptomata. Talia autem sunt, cum alijs symptomatibus coniuncta est continua inquietatio. Quod nomen ut autor est Gal. in expositione illius si uero nudos habeat pedes &c. Indicat illos consiliari quouis iacentis habitu. Nec non alium ex alio mutari. Cuius causa prauī humoris copiam in principe parte, esse sciendum est. Ob cuius causam breui admodum terminantur ægritudines in quibus continua adest inquietatio, maligni humoris lēSIONem principe parte diutius non ferente. Ad hæc scire oportet ultima non posse dici symptomata si ægrotans unum decubitus habitum seruet. Significat enim principes partes haud grauiter lēdi. Gal. ob uentriculi oris malitiam, aut ob uirtutis imbecillitatem inquietationem fieri scribit. Verum alibi in expositione illius interdum autem & cruda tum à capite &c. Ob multitudnem prauorum humorum quos græci *ιχόρας* uocant in uentriculo accidere ait. Verum quamobrem in prædictionibus *ἡ ἀσθενὴς* inquietationem

1. prædictionum.

1. prædictionum.

1. de ratione uictus.

rationem appellet, in libro autem de victu acutorum
διὰ νοσημάτων & an aliqua inter utrumque differentia sit
 presentis negotij non est referre. Nunc inud scito in-
 quietationem unum esse ex signis crism indicantibus
 ut à Gal. scriptum est. Nisi ob agrotantis teneram na-
 turam accidat, ita, ut à minimis præ delitijs se vinci
 ostendat. Inquietatio igitur continua coniuncta febre
 morbum ad quartum terminat. Præcipue si tempera-
 tura, ætas, anni tempus, calida fuerint. Hunc peracu-
 tum esse morbum dices cum ultimis symptomatibus.
 Huic si vires constant nihil ministrabis. Quod sibi
 non fidas, pocula exhibeto.

1. de crisi.

CAP. XIII.

HIS sic habitis signa precurrere oportet, quibus
 morborum singulos qui ad septimum, undecimum, &
 quartumdecimum terminentur cognoscas. Sed prius
 dicere qui proprie sint morti acuti oportebit. Et
 quo maxime deprehendantur signo, quod si omnibus
 acutis commune sit, manifestum est tale per se acu-
 torum omnium leuissimum morbum efficere. At quod
 nam tale signum esse dicemus, nam id scire maxime
 conducit ad intellectum eorum quæ ab Hyppo. scripta
 sunt, in eam artis partem quæ victus rationem docet,
 tum in eam maxime quæ prædicit. Hoc profectò si-
 cut, & reliqua ab Hip. querendū. Qui in primo de mor-
 bis vulgaribus comentario tertio acutissimos & ma-
 ximos grauiissimosque morbos ac præ cæteris omnibus
 lethales incontinua febre esse scribit. Quo in loco Gal.
 scribit quoquomodo inquit febrem continuam acci-
 pias

DE VICTV FEBRICIT.

*pias uerus est sermo. Acutissimi enim morbi & maxi-
mi & grauiissimi in ijs fiunt, qui proprie synochi hoc est
continentes dicuntur febres. Et nihil minus in alijs quæ
particularibus progrediuntur paroxysmis, principia
augmenta status & inclinationes manifestas efficien-
tes, neque ad integritatem desinentes, de quibus est sa-
tius hoc loco interpretari. Quoniam synochis proprie
dictis in ijs contineri cõtingit, & nõ in synochis has. In
quibus uerbis aperte nos docet Gal. febris continuitatẽ
acutos morbos efficere & hoc ipsum omnibus quæ acu-
te & graues sunt febribus cõmune esse. Vt pote cum fe-
bris continuitas omnibus coniuncta sit. Cũq; cõtĩnua-
rum leuissima sit ea quæ periodice inuadit, principia
augmenta status inclinationes apertas efficiens, mani-
festum est febrem continuam periodicam, primam &
leuissimam acutorũ morborum esse. Cũq; acutorum
morborum terminũ intra dies quatuordecim posuerit
Hypp. manifestum est febrem continuam periodicam
intra dies quatuordecim fore terminandam. Morbus
igitur qui ad quartumdecimũ terminatur, à continui-
tate febris cognoscet, ut Gal. scripsit in expositione il-
lius. Secundum eandem rationem in mulieribus. Nec
obstiterit esse morbos cum febris continuitate qui ad
uigesimum terminentur, unde uerisimile non uidetur
esse limitem acutorum quartumdecimum esse sed uige-
simum. Vt Gal. tetigit loco proxime citato. Prætera
nec te perturbet, acutos morbos esse qui in quadragin-
ta diebus iudicentur ut Hyp. docuit in eo spirationis
facilitatem. Nam & si uerum sit febres acutas in ui-
ginti,*

3. prædi-
ctionum.

1. prædi-
ctionum.

ginti, & quadraginta diebus iudicare posse, non tollit quod dictum est ab Hy. acutos morbos in quatuordecim diebus iudicari. Nam cum indicationum modi quatuor sint, nempe ad salutem aut ad mortem ad melius aut ad peius ut à Gal. scriptum est in libris de crisi-
 sibus manifestum est fieri posse, ut acutus morbus intra quatuordecim ad melius aut ad peius iudicetur, apud vigesimum, aut quadragesimum integra terminatione ad salutem aut ad mortem terminetur. Quare id verum esse semper, morbos acutos intra quatuordecim dies aliqua quatuor terminationum iudicari. Ut Gal. asseruit in eo. Acuti morbi in quatuordecim diebus iudicatur. Vbi ita scribit nullus enim inuentus est unquam morbus qui ab initio uelociter moueretur hunc transgredi terminum, quin aliquā ex dictis non acciperet mutationē. De eo igitur nobis termino sermo est, in quo ad salutem aut ad mortem aut ad melius aut ad peius subito mutantur egrotantes, Firmiterque cū Hyp. asserimus, febris continuitatem intra quatuordecim dies aliquam harum quatuor mutationum ostendere. Febrēmq; continuam periodicam hunc non transgredi terminum, citra aliquam quatuor iam dictarum mutationum.

CAP. XV.

INTER mediū uero eadē sortiuntur nomina, nam qui ad septimum aut citius terminantur peracutos uocauit Gal. loco iam citato. Qui uero ad undecimū acutos, aut exquisite acutos, qui ad quartumdecimū, simpliciter acutos dixit uerū ut ille ait disceptatio de nomine

DE VICTV FEBRICIT.

3. prædi-
ctionum.

mine est, modo scias quæ nã sint symptomata qua mor-
bum ad septimum, & quæ ad undecimum terminari
faciant. Quod si febris continuitati à primo die do-
lor capitis adsit, & die quarta magis ingrauescat, ad
septimũ terminabitur. Sic Hyp. si quibus, inquit horũ
capit dolor die primo, die quarto premãtur, maxime,
& quinto, ad septimum soluantur. Idem asserit eo-
dem libro de acuto aurium dolore in febre cõtinaua ac
uehementi, quibus si natu minores afficiãtur, intra se-
ptimum aut morientur aut euadent. Natu tamen ma-
iores quia minus febre & delirio infestantur, & quia
minus acute dolent ob nerui duritiem, ultra septi-
mum iudicantur. Ex ijs uerbis Hyppocratis & ex ijs
quæ in libris de ratione uictus & inde morbis uulgari-
bus scripsit, colligimus tria esse symptomata, quæ cum
insignẽ adepta sunt uehementiam & cõtinitatẽ, mor-
bum ad septimum terminant. Nempe dolor capitis, ui-
gilia & delirium, si febre continuam continentur.
Ut melidiæ quæ decubuit iuxta adem lunonis contigit
de qua Hyp. In fine primi de morbis uulgaribus agit.
Cui caput collum & pectus magnopere doluisse cum
febre acuta scribit. Doloresque omnium horum per-
petuo fuisse. Quam ait die septimo sudasse, febrẽq;
intermisse. Vnde apparet iudicatã fuisse, ad melius.
Item adolescentulum qui in mendacium foro decumbe-
bat igne correptum fuisse scribit Hypp. in tertio de
morbis uulgaribus, uigilias cũ pateretur aliaque exi-
tialia signa haberet, ad septimum obiit. In cuius
expositione Galenus refert hunc adolescentulum om-
nibus

nibus diebus nihil planè dormiuisse. Idem præterea mulieri abortione infantis à febre ardente correpta & uigilias patienti accidit. Nec obstitit quod in eodem tertio prædictionum libro doloris capitis uehementis meminit, continui cum febre de quo iudicium facit cum uigefimum diem transijt. Nam si Galenum in expositione legas, incondite locutum fuisse Hyp. audies. Sed recto ordine Hyp. sermonem texit in hunc modum. Capitis dolor uehemens & continuus cum febre si quod ex inditijs extiterit exitiosis integre letalis est. Si uero ex ijs quæ didicisti de ægro conualituro spes à principio quidem ad septimum usque sanguinis enaribus fluorem expectato. Procedente uero tempore id etiam eueniet. Unde fieri non potest ut dolor capitis uehemens & continuus cum febre, ultra septimum iudicium differat, quin aut ad salutem, aut ad mortem, aut ad melius, aut ad peius mutationem faciat. Cum uero ultra septimum absque iudicio protrahitur, aut eius uehementiam, aut continuitatem deficere necesse est. Iis fidem præstat uersio in octoginta uolumina, quæ ita habet. Dum autem ualidus & recens dolor fuerit, sanguinis de naribus eruptionem apud septimum expectato &c. Ac si uelut post septimum iudicium si protrahatur, ob id esse, quod in ualidus dolor erat. Morbi autem qui ad undecimum iudicantur mediæ uehementiæ sunt, inter eos qui ad septimum terminantur & eos quos simpliciter acutos diximus, qui ad quartumdecimum finiuntur. Propria autem signa quibus discernere eos possis non dantur. Verum per ea quæ diximus

E sympto-

DE VICTV FEBRICIT.

3. Prædi-
ctionum.

In 1. de
morbis
uulgarib.
commen-
tario.

Symptomata septem dierum terminum ostendentia si die tertio inceperint apud quintum uero uehementius molestaauerint, morbum discernes ad nouum aut undecimum terminandum. Quod ab Hyp. didicimus loco iam citato hoc modo, si quinto inceperit & undecimo magis fluctuauerit, terminum ad quartumdecimum designabit. Sed simul cum ijs temporis constitutionem considerare oportet. Quod si morbo conueniat, fiduciā maiorem habebis, quod intra præscriptum finietur terminum. Quod si contrariæ sit qualitatis nempe frigidum & humidum, scito morbum ad ulteriorem protrahendum quaternarium. Huius autor est Gal. in expositione illius circa arcturum multis facta est iudicatio in statu tertio, simile est prima Apho. ubi æstatem dixit morbos breuiare hiemem producere. Considerationem etiam temperamenti egrotantis habitus & regionis non prætermittas ut singulorum morborum terminos artificiali possis coniectura coniungere. Quod de dolore capitis qui tertio inceperit & quinto magis fluctuauerit diximus, de uigilia & delirio intelligas oportet. Horum quodlibet si die tertio inceperint, & quinto uehementius affligant, apud undecimum morbus terminabitur. Verum quia symptomata quæ acutum aut peracutum morbum reddunt, cum febris continuæ coniunguntur à quibus terminum coniiciendum supra docuimus, solent diuersimode in morbis mutari, ita ut nocte unam in somnem agat egrotans. Sequenti dormiat. Nunc deliret, modo mentis compos uideatur. Diebus accessionis caput doleat, intermissionis cesset, aut mi-

nus

mus torqueatur, quonā pacto ex ijs terminus cōiici possit forsan quis dubitabit. Verum si ea quæ supra diximus, recte quis percipiat, huic dubitationi locū non esse intelliget. Nam cum uigilia continua acute feбри coniungitur, aut dolor capitis uehemens cōtinuus affligit, morbū ad septimū terminandum diximus. Quod si uigiliarum aut doloris delirij ue. continuitas cessent, intelliges horum symptomatū ratione, morbum ultra septimum terminandum. Alia obiter symptomata cōsules, & febris magnitudinem & eius motus uelocitatem, à quibus omnibus an ad undecimum, aut ad quartūdecimum terminari morbus debeat cōiicies. Sat tibi est ad uictus formam inueniēdam, quibus nam signis morbos qui ad quartum, & qui ad septimum, undecimum, & quartūdecimum terminantur cognoscas.

CAP. XVI.

VERVM ad uictus formam inueniendam parum referre an diebus intermedijs terminus accadat. Eadem enim uictus forma uteris, cum morbus ad diē nonum, aut ad undecimum, terminari debeat. Item eodem uictu cum ad tertiumdecimum, aut quartūdecimum finiendus sit. Nec hoc præter semis mentem est, qui eodem uictu utitur, nempe poculis, si septimo aut nono terminari morbus debeat. Cum dixit sed post septimum aut nonum si ualidus sit. Sentis ex ijs uerbis Hyp. eadem uictus forma usum fuisse cum morbus ad septimū, aut ad nonum terminū habiturus esset. Grauius autē errabis, si morbus ad quartum terminandus sit, egrotantem eo uictu nutrias qui morbis ad duas

In i. de uictu acuto rum.

E ij septimanas

DE VICTU FEBRICIT.

septimanas finiendis conuenit. Minus autē lēdes si eō utaris quo ad undecim dierum morbos utimur. Multo autem minus si eo qui septem dierum termino conuenit. Porro discernere morbum qui ad quartum terminabitur, ab eo qui ad quartumdecimum, aut undecimū facillimū est. Nō aliter quā si grauissima symptomata & febres ardentissimas ab ijs discernas, quæ mitiores multo sunt febres, & augmenta & decremēta manifesta habent. Et nullum seuū sortiuntur symptoma. Hæc autem ab ijs quæ morbum intra septimum terminari faciunt symptomatibus, separare, facile ijs est qui in artis operibus mentem exercitarunt.

CAP. XVII.

SED interim dum usum in ijs cōparas, febres tibi indicabo quibus prædi termini adaptentur. Ut initium huius meditationis habeas. Causus legitimus hoc est febris ardens, quæ à bile impermixta ortum habet, febris præterea quam synocham recentiores nuncupant, si cum inquietatione coniuncta sit, ad quartū terminabitur. Eadem uero si cum uigilijs, aut capitis dolore, aut delirio, continuis fiant, intra septimum. Febres continue quarum in die quietiori symptomata egrotantē utcunq; molestant, ad undecimum. Quarū uero apud inclinationem febris syptomata omnino euanescent, ad quartumdecimum. Hæc nō sunt præter senis mentē, ab ijs enim quæ dixit in libris de ratione uictus, & inde morbis uulgaribus colligere ea licet. Quibus igitur ardentes febres cum inquietatione sunt, si robusta sint uirtute, & habitu denso, difficulter spirabili præcipue

cipue si abstinentiam longam citra insignem incommodum pati assueti sint, hos in omni seruabis inedia. Si aliquod deficiat, nempe uirtus sit imbecillis, aut habitus rarus, facilis resolutionis, aut humores nimium tennes, potibus hunc nutries. Quod si febris ardens citra inquietationem sit, & uigilijs torqueat, uirtuteque ualenti & reliquis ut oportet habentibus, pocula ministrato. Quod si illorum uirtuti non fidas, aut in presenti aut in posterum, tenuem sorbitionē exhibeto. Febris autem cuius symptomata in die tranquilliori non quiescunt, si cum robore uirtutis accidant, tenui sorbitione. Quod si ob imbecillitatem presentem aut ob habitum rarum in posterum illum non posse sufficere speres, præcipue si multo sit cibo assuetus, & humores tennes fuerint, crassa sorbitione hunc nutries. Quod si febris continua sit, cuius symptomata in die quietiori omnino euanescent, crassa sorbitione ales. Quod si imbecillis fuerit uirtus, aut habitus rarus aut tennes humores affuerint, aut multo cibo assuetus sit, præcipue si hiems fuerit, huic comedendum dabis. Quod facilis sit coctionis, quorum omnium infra latius meminero cum de uictus singularum febrium sermonem fecero. Cæterum cum in libris Hyp. de morbis uulgaribus legamus, plures eorum quos describit ægrotantes ab initio morbo acuto laborare tali symptomatum uehementia, ut uideantur intra septimum terminum habituri. Rursusq; mitiores fiunt citra crisim, aut intermittunt omnino, & cessant aliquot diebus, & rursus redeunt, & uehementer affligunt. Horum aliquot ad uigesimū nō

DE VICTU FEBRICIT.

nullos ad quadragesimū, & sexagesimū, & ad octua-
 gesimum absolute fuisse terminatos scribit, quoniam ui-
 ctu hos nutrire oporteat forsā quis dubitabit. Dum
 morbus uehementiam peracuti seruat, uictū peracuti
 morbi ministrabis. Cūq; mitior est aut intermittit om-
 nino, ab intermissione numeratis duobus diebus, uictū
 ei mediū exhibebis. Hūc intelligo qui inter duos extre-
 mos medius est, quorū alter est uictus qui incobati mor-
 bo conueniebat, alter est quē secunda dispositio exigit.
 Ut exempli causa si morbus tali incepit uehemētia ut
 uictus per pocula ei conueniat, nunc uero citra crīsim
 mitior factus est, ita ut præsenti remissioni crassa con-
 ueniat sorbitio, duos à remissione dies spectabis absque
 uictus immutatione, ab ijs tenui sorbitiōe hūc nutrias.
 Quæ media est inter pocula & crassam sorbitionem.
 Quod si secundum accidat, ad duos similiter dies ui-
 ctum non immutabis. Post uero, crassa sorbitione ho-
 minem nutries ad dies septem. Quod si in ijs non redie-
 rit morbus, crassīorem cibum huic ministrabis, ceticos
 semper præcauens dies. Horum partem ab Hyp. didici-
 mus, nempe illud, duos esse expectandos dies absque ui-
 ctus immutatione, nempe parem & imparē, ut in pri-
 de ratione uictus in acutis scribitur. Vbi ait sed maxi-
 me duos ab iudicatione dies &c. In cuius expositione
 Gal. ita scribit, tutum igitur est etiam si morbus iudi-
 catus fuerit, ad duos usque dies diligentem uictus ra-
 tionem qua eger usus fuerit seruare. Præteritis autem
 ab iudicatione duobus diebus iam securum est plenius
 cibare &c. Cum ergo in ijs morbis in quibus iudicium
est

est factum duos obseruare iubeat dies parem & imparem ob timorem accessionum, multo causatius illud obseruandum fore in ijs qui citra iudicium intermiserunt. Reliquum discimus monstrante ratione.

C A P. XVIII.

SI C igitur uictus formam à duobus inuestigandam diffiniuimus. Nempe à uirtus robore & à morbi constitutione in qua duo comprehendimus, nempe morbi dispositionem an peracutus an acutus, aut qui medio loco est, & quando ad statum peruenturus sit. Facultatis autem vitalis seruandæ cuius gratia nutrimus, prout est in hora præsentis impulsu coniiciendum robur fore. Quale uero erit in posterum, ex habitu denso, aut raro & ex humorum tenuitate aut crassitie, & ex assuetudine, Ceterum per morbi constitutionem, seu dispositionem, an peracutus, an acutus, & quando maxime ad statum peruenturus sit intelleximus. Ad id cognoscendum præcepimus quæ nam symptomata, morborum singuli afferant considerare. Vt ex ijs an ad quartum, aut ad septimum, undecimum aut quartumdecimum morbus terminari debeat sciamus. Ab huius distantia uictus formam inuenire docuimus. Ad secundum Hyp. doctrinam in Aphor. secundum quod Status prope aut longe est uictus formam inuestigandam docet. Status autem distantiam non ex symptomatibus quæ morbus comitantur, sed ex signis cœlionis præcognoscere docet Gal. in libris de Crisibus, Præterea ipse Hyppoc. ab eisdem cœlionis signis morbum breuem aut longum fore dicit. Vt sputum subrubeum

1. Aphor

DE VICTU FEBRICIT.

1. de ratio
ne uictus.
in acutis.

In d mor
bis uulga-
ribus pri-
mo.

1. de ratio
ne uictus.

2. de crisi-
bus.

si statim appareat inchoatē abreuiat. Idem dixit ali-
bi, nempe quæ citius magisque madescunt, iudicatio-
nis denunciant celeritatem. Quæ vero tardius minus-
que, tardiozem significat iudicationem. Et alibi coctio-
nem dixit, velocitatem crisis & salutem certam signifi-
care. Loca præterea quæ citauimus Hyp. ad cognoscē-
dam termini distantiam, omnia crisin spectant, & nō
morbi statum. Quod autem hæc duo differant, manife-
stum est. Si ergo à crisis distantia victus formam sume-
res, necessum esset, ut quanto proprius egrotans crisis
horæ accesserit, tanto subtiliorem victum ei ministres.
Et quanto longius, crassiozem: ut doctrina est Hyp.
at huius contrarium inuenimus ab Hyp. scriptum in
hæc verba. Et quanto maior fuerit expurgatio, tanto
magis ad crisin usque dare oportet. Præterea in textu
immediate quarto loco præcedente, ita ait, nempe si
morbus sicciior quam ut quispiam existimet fuerit, non
multum dare oportet, sed ante sorbitionem vel mulsā
vel vinum propinare expedit. Manifestum est ex loco
immediate citato, quod quanto morbus est sicciior, hoc
est magis crudus, tanto longius à crise distat. Et quan-
to humidior hoc est coctionis magis recipit, tanto pro-
prius accedit. Vnde ex ijs apparet secundum mentem
Hyp. victus formā penes crisis distātiā inuestigandā
non esse. Symptomata vero quorū mentionē fecimus
nempe inquietatio, vigilia, dolor capitis, & delirium,
omnia sunt signa crisin indicantia; ut à Gal. scriptum
est. Porro institueram ijs supersedere quæ maiori otio
ad eorum exactam speculationem indigent.

CAP.

VERVM ne in hoc soluendo nodo agitandi mentē alicui detur occasio. Hac in re quod intellectus meus capit referam, ne quid speculationi desit, ut obiter studiosos in hac inuestigationem prouocemus. Multa quidem in disceptatione inuoluuntur quæ dissimilis sunt rationis & diuersa indigent oratione. Sed ut recta procedat disceptatio, Ciceronis insequar præceptum. Tria sunt quæ in contentionem vocauimus, nempe Statum, crism, & terminum morborum quem ex symptomatibus præcognoscendum diximus. Notiones singulorum præmitteremus, ut sciamus de quo disputare intendimus. Statum siue vigorem qui Grace *εὐμαρία* dicitur triplicem esse nempe statum quo ad symptomata, & statum quo ad dispositionem, & quo ad coctionē materiæ. Primum maximum esse morbi, ut in symptomatibus scripsit Gal. Quod autem addidit præpositionem ut uoluit significare superlatiuum non ad morbi dispositionē sed ad symptomatum magnitudinem referendum; ut ipse apertius scripsit in espositione illius circa principia & fin. & c. ubi ita scribit. Symptomata omnia circa principia & fines dicit esse imbecilliora, nempe paroxismos febrium, vigilas & dolores fastidium, & sitim sicuti ipsas dispositiones in quibus hæc fiunt apud statum necesse est meliores esse, in ijs qui seruari debent. Ex ijs manifestum est secundum Gal. mentem, illud maximum morbi, non esse ad dispositionem referendum, sed ad symptomatum magnitudinem. Habent præterea singula affe-

1. Aphorif
lumorum.

2. Apher.

ctio-

DE VICTV FEBRICIT.

tionum secundum varias dispositiones, sua tempora, nempe initium incrementum statum & declinationem. ut si febris sit, cum primum in uehementiam in anticipationem & durationem addit, augmentum manifestum est. Cunque omnia maxime aucta sunt, statum. Declinatio cum iam dicta imminuntur. Hoc colligimus à

In lib. de
4 morbi
temporibus

Gal. multis in locis tum precipue in expositione illius parosismos & consistentias &c. Quod si inflammatio sit, distinguuntur tempora penes tumoris magnitudinis incrementum. Diciturque hac temporum distinctio,

Lib. de to
tius mor-
bi tempo.

quo ad morti dispositionem; ut ex Gal. licet colligere, cum ait in hunc modum. Ponatur igitur primum principium inquire, quis negauerit generationem ipsius toto illo tempore esse quo pars sanguinolenta substantia repletur, siue enim propter coincidentiam huiusmodi contigit, siue propter obstructionem omnium vasorum siue ob circumstantiam quandam tumorum in poris, siue ut nos docuimus in libro de inequali temperie, & in cōmentarijs de tumoribus præter naturam, abundantia sanguinis in particula consistit oborta flegmone, hoc erit primū tempus in quo impletur particula, magnitudini affectus subiecta. Quando autem in fluxus cessauerit, & quod in flegminante particula continetur putrescere inceperit, calor quidam ob putredinem nascitur, & fusio implens propter calorem ob quem spiritus generatur, ob hac ambo magis quàm antea distenditur etiam si nihil influat, hoc secundum tempus est augenti flegmone. Porro cum in pus iam vertitur maximi sanè dolores tunc apprehēdunt. Circa eum ge

ne-

ñerationes saniei labores & febres magis accidunt q̃ fa-
 cta. Vocatur status affectiõis huiusmodi tempus. Si au-
 tem in sanie uersa uel resoluta fuerit, minorem tumo-
 rem & tensionem ostendit, principiu inclinationis hoc
 ipsum est. Distinguuntur etiam tempora penes mate-
 rie coctione, ut cum cruda est principiu sit. Cũ uero
 signũ incipientis aut debilis coctionis fuerit, principiu
 transisse scies, augmentumq; principiu sumere, cunq;
 maxime coctio completur, statum esse. Cũq; cõpleta,
 signũ iam appareat statũ præterisse significatur. Hæc
 omnia sunt de mēte eius in libris de crisibus & in libro
 de totius morbi temporibus. Vbi principium dicit esse
 cruditatē molestantium humorum quando coqui inci-
 piunt, principiu finiri, secundũ tempus quod incremen-
 tum uocatur accedere. Quando autem coctio ipsa ma-
 xime completur, status tempus esse. Deinceps declina-
 tio in qua cessare iam magnitudinem symptomatum et
 abundantiam coctorum scribit. Coincidunt hæc aliquã
 do, nempe status quo ad dispositionem & quo ad sym-
 ptomata, ut in morbo laterali, in quo antequam screa-
 re incipiant, maxima tunc uigent symptomata & in-
 flamationis tumor maximus. Cũq; screare inceperint,
 utraque imminuuntur, & tumor & symptomata. Vt
 à Gal. scriptum est in hæc uerba. Sæpius autem adinui-
 cem coaugētur & coniunguntur symptomatum ma-
 gnitudines & dispositiones, & sunt in ijs flegmonis,
 in quibus pus effluit quod iam confectum est, ut in
 uulneribus quibusdam fieri consuevit, & in peri-
 pneumonis & in pleuritidibusque. Quandoque di-
 uersis

In fine ter-
 tij de ra-
 tione ui-
 ctus.

DE VICTV FEBRICIT.

versis contingunt temporibus uterque status dispositio-
nis & symptomatum. Vt ab eodem sumitur loco cita-
to. Vbi ita scribit, sæpe quidem dispositio ipsa secundā
quā infirmantur faciliior est. Symptomata uero augen-
tur, quēadmodum in flegminantibus particulis ut ipse
dixit circa generationes saniei dolores & febres coin-
cidunt magis quam facta. Hæc ille, in quibus uerbis
uult, circa saniei generationem augmentum fieri quo
ad symptomata, quo tēpore dispositionē iam imminui
uidetur innuere. Dispositio autē secundum quā ille in-
firmatur, cum tumor sit præter naturam, hunc apud sa-
niei generationem iam imminui ostendit. cuius contra-
rium dixisse uidetur in libro de Totius morbi temporibus
loco iam nobis supra citato, quod tu considera. Ha-
bes ergo ex omnibus ijs, quod penes tria distinguuntur
tempora morborum, nempe penes morbum, eius cau-
sam, & symptomata. Cæterum quomodo huiusmodi tē-
pora in morbis misceantur, & quibus in morbis singu-
læ mixtiones accidant, infra tangemus, quantum ad ui-
ctus inuentionē opus fuerit. Gal. igitur in libris de Cri-
sibus, & in libro de Totius morbi temporibus penes co-
ctionem & cruditatem materiæ, tempora distinguere
uidetur. In libro uero Aphorismorum penes sympto-
matum magnitudinem. In tertio de ratione uictus se-
cundum dispositionem.

CAP. XX.

CRISIMO ὁ ἀνέξοντες ἐν τῷ μεταβολῶν πρὸς ὑγίαν ἢ
θάνατον ἔσται, hoc est crisim subito uergentem esse in
morbo mutationem ad salutem, aut ad mortem, dixit
Gal.

*Gal. i. libro secundo Aphorismorū. Verum per Crisim Hip. multoties subitam intellexit morbi solutionē. Vbi in libro de ratione uictus primo. Vbi Gal. in expositio-
ne per Crisim dixit, uel perfectā morbi solutionem, uel mutationē eā, quæ usque adeo insignis sit, ut ager peri-
culum omne euaserit. Accipitur crisis nomen nonnun-
quam, ut utrunq; complectatur, nempe subitam muta-
tionē & morbi solutionem. Et est quæ præcipue crisis
dicitur, quod Gal. scripsit in hæc uerba. Eas igitur quæ
cum magno & repentino certamine sunt morborum
solutiones, quas præcipue crises nominare dicebamus
&c. Cæterum hæc tertia crisis acceptio, in perfectam
& in imperfectam diuiditur. Primam morbi esse sub-
itam solutionem cum effatu digna excretionē, & non
modica huic antecedente in ægotantis corpore pertur-
batione. Secundam, cui à iam dictis unum deest, quod
non integre à morbo liberat. Ita ut crisis perfecta bona
subita sit morbi solutio, imperfecta bona, subita morbi
diminutio. Has duas crises, perturbationes in corpore
ægotantiū non modice, & effatu dignæ excretionēs co-
mitantur. Totidem diuisiones in bonas & crises malas
efficere licet, nempe perfectam malam ad mortē, ean-
dem rursus imperfectā ad peius. Hæc omnia scito esse
secundum mentem Gal. Crisim igitur prout est subita
mutatio ad salutem uel ad mortem fieri, uatura se-
parante à bonis mala, & ad excernendum preparan-
tē. Rationabiliter igitur in tali perturbatione graui-
ter se habent laborantes, & maximis tunc efficiuntur
symptomatibus. Quorum cum tres sint causæ, nempe
natura,*

3. de crisi-
bus cap. 7.

DE VICTV FEBRICIT.

natura, morbus, uel eius cause, & natura & morbus simul. Quæ morbum insequuntur symptomata *παθολογικά*, id est symptomata per quæ morbus cognoscitur. Hæc in crescente morbo augentur & inclināte imminuuntur. Quæ uero ab ipsa fiunt natura, dicuntur *απὸ φύσεως*, hoc est crisis symptomata. Quorum meminit Hyp.uarijs in locis, quod uero à natura fiant, Gal. docet in expositione illius hæc si ab initio non apparuerint, ubi ita scribit. Ergo quoties natura ad excretionē properat, effatu digna in corpore fit permutatio, ob quæ symptomata huiusmodi cū manifestissimis cōtētiōis signis apparent. Quæ tertio sunt loco symptomata, pugnam insequuntur naturæ morbificas debellantis causas. Prout pugna acerbior est, uehementiora fiunt symptomata. Cunque natura sua maxima ui ultimoq; conatu contra morbum pugnat, maxime & ultima fieri. Ad hoc tertium symptomatū genus reduncuntur dolores & febres quæ apud generationē fiunt saniei. Nā hæc à duabus contrarijs generatur causis, nempe à calore naturali coquente, & à præter naturā calore putrefaciente. Ut à Gal. scriptum est. Quod si ob sanguinis incensionem, dolores & febres fieri quispiam asserat, cunque perfectē incensum est residuum ipsius saniei fieri, quemadmodum incensis lignis cinerem, ob idq; dolores & febres sedari. Cedo sed si res exacte consideretur, huius incensionis causam non solam humoris putredinem esse, sed pugnam inter naturam coquentem & morbum putrefacientem inueniet. Cunque altero uincente cessat conflictus & pugna, remittuntur et
sympto-

2. de ratio
ne uictus.

In fine
pri. prædi
ctiopum
& 2. apho
rismorū.

Symptomata. Remanent autem ea quæ saniei acutam qualitatem & particula tensionem insequuntur. Ob hoc dixit circa generatione saniei dolores & febres accidunt magis quam facta. Non enim ob aliud addidit Hyp. illud verbum magis quàm facta, nisi ut ob naturæ pugnam contra morbi materiam provenire symptomata ostenderet. An non huius validum est argumentum id quod ijs contingit qui exitialiter laborant. Quidam natura vires habet ut contra morbum pugnet & eius incurfibus obstat, gravissima ferunt symptomata & labores. Cumque natura ex certamine vincitur, videtur ab eo tempore minus inquietari, & aut gravissimis conflictari. ut ijs contingit qui obscuris & blandis & contrastabilibus desipientis laborant. De quibus Hip. agit in primo prorrhethici. Ad hoc item genus reducuntur ea quæ in salubri morbo apud statum fiunt symptomata, & febrium uehementiores paroxysmi, cū manifestissimis coctionis signis. Talia ergo symptomata, & febres non ob maiorem materiæ putrefactionem, sed ob maiorem pugnam inter naturam & morbum in obtinendo materiæ aparatu. De ijs alibi latius.

C A P. X X I.

TERMINVM quem supra posuimus uictus forme indicem esse intelligo, illum dierum numerum quibus egrotantis robur morbi acumen & eius symptomata ferre possit, citra aliquam quattuor crisiū à nobis supra descriptarum. Ut exempli causa si quis aliqua continuentium febrium cum uigilijs continuis laboret æstate, iuuenis, calidi temperamenti. Conijciasq;
egrotan-

DE VICTU FEBRICIT.

agrotantem ultra septimum ferre non posse prædicti morbi uehementiâ, citrà aliquā quattuor crisiū, nempe ad salutem, aut mortem, aut ad melius, aut peius, tali ægrotanti dies septem terminū esse uictus formā indicantem dicimus. Sed de qua nam triū acceptionum status intellexisse Hyp. asseremus in Aphorismo, cum iubet agrotantem considerare si sufficiat ad statum usque cum uictu necne. Et primum inquiramus an de statu quo ad materiæ coctionem intelligat. Quod esse rationes negant, nam status quo ad materiæ coctionem in nullo morbo certum nec definitum tempus habet, ut præcognosci possit. Finge Socratem salubri ægrotare febris ut continua tertiana, triplici de causa non dabitur tibi ut præcognoscas quando potissimum, morbus hic in statu quo ad materiæ coctionem erit. Primo ob materiam morbi si diuersæ substantiæ sit, nam primo secundo & tertio die in subtiliorem laborante natura partem, iudicium facies de reliquo consimile. Et decipieris in status præcognitione & uictu inueniendo. Secundo ob vires laborantis, quæ initio ualide erant, procedente autē morbo ob aliquam causam ultra opinionem imbecilliores fiant. Vnde grauis committitur error. Nam inter initia æstimato ægrotantis robore morbi coctionem ad talem dierum numerum coniecisti, frustraberis quæ ob naturæ insperatam imbecillitatem. Tertio ob tempus quo natura uacat humorum coctioni. Nam si Socrati multum & crasse substantiæ cibū ut comedat ministres, diutius immorabitur coctio, quàm si sorbitionē crassam offeras. Citius autem

autē si tenui sorbitiuncula dummodo uirtus ab utroque seruetur Socratem alas. Nam cū minus natura in ciborum coctionē temporis expendit in morbi materiam operabitur quod reliquum est. Id maius est si tenuem cibum quā si crassum exhibeas. Alia præterea accedit ratio quod crasso uictu diutius immoretur coctiones eo, quod in morbi materiā fiat additio, cūq; singulis diebus eius augeatur copia, opus nature minus præualere necessum est. Tenui autem uictu hoc non datur. Cū ergo pro uictus forma tēpus coctionis immutari possit, qualiter à statu coctionis uictus formā recte cōiungere possumus. Tan si super rē instabile ædificia firma construere uelles. Profecto ridiculum uidetur esse querere, a, per, b, quod quidē immutatur secundum a dispositionem. Insuper si ita esset, ut de statu quo ad materiæ coctionē intelligeret, inepte profectō ab Hyp. dictum esset, contemplari oportet egrotantem si sufficiat cum uictu ad statū ægritudinis, hoc est ad id temporis cū maxime complentur coctiones. Ad talem enim statum potestatis uictus nō est, ægrū ducere. Quantocunq; enim crasso nutrias uictu egrotantem, continget multoties ut ad statū, eum non perducas. Nam natura fortasse morbo inferior est. Quot sunt præterea ægritudines quæ ante coctionem egrotantes occidunt. Qualiter igitur sollicitos nos reddit, admonens ut conijciamus si cū uictu sufficiat æger ad statum quo ad coctionē, cū eo usq; egrotantem durare, uirtutis robori, & morbi materiæ dispositioni, tribuendum sit, & non uictui. Alium igitur in illis teti-

DE VICTU FEBRICIT.

1. de ratio
ne uictus.

git statum uerbis, ad quem usq; ægrotantem ducere in facultate sit uictus. Iis fidem præstant quæ ipse alibi dixit, ubi crassiorē uictum & copiosiorē ministrat, quanto morbus ad coctionem festinat, magis uero tenuem quanto ab hac longius distat. Iis quidem contrariū in Apho. dixisset si de statu quo ad coctionē uerba eius intelligantur. Cæterū dispositionis statum non tetigisse ostendere opus non esse arbitror. Cū dispositio per se nullum præbeat iuditiū nisi quatenus actiones ledat. Quæ quidem lésiones symptomata dicuntur. Nō immerito igitur nec magnus nec paruus morbus dici potest, si lésionē actionum tollas. Neque enim uictum, neq; remediorum ullum afferas nisi recuperandarū actionum gratia. Nec dispositio ipsa per se nec noxam, aut periculum, nec mortem, ægrotati afferet, nisi interuentu lésarum actionum. Ad hæc non est medicorum antiquorum ullus qui penes dispositionis status distantia, uictus formam inuestigandam pronuntiet. De statu igitur symptomatum uerba Hyp. intelligenda fore manifestum est. Iis fidē præstant quæcunq; Gal. de morbi temporibus in Aphorismis secundum mentē Hyp. scripsit, nempe statum esse maximū morbi ut in symptomatib. Præterea in eo circa principia & fines omnia ibecilliora. Ubi declarat per illud uerbum omnia imbecilliora, symptomata esse intelligenda. De principio etiam quod ad symptomata locutus est in Aphorismis, cocta medicari & mouere non cruda neq; in principiis, ubi aperte ostendit, per principium morborū, aliud quam cruditatem humoris intellexisse

tellexisse. Videturq; solum tempora distinxisse Hyp.
penes symptomatum magnitudinis incrementum, ubi
cunq; de principio statuue morborum sermonē facit.
Cui opinioni adharebit quisquis diligenti lectione illi-
us euoluat scripta. Cunque de materia dispositione lo-
quitur, crudam, imperfecte coctam, & coctā dicit, ut
de urinis, sputis, egestionib. Cum vero principium, aut
statum scribit symptomatum meminit. Verum multo-
ties per principium tempus usque ad tertium aegritu-
dinis diem intelligit. Vt constat per Gal. in espositio-
ne illius, si uero in morbo uetere &c. Significat aliquā
do principium primum morbi insultū, quod latitudine ca-
ret. Cuius meminit Gal. loco citato & in espositione il-
lius, paroxysmos & consistentias. Verum prout est
unum ex quatuor morbi temporibus, symptomatum
certam magnitudinem significat, prout incrementū
potest suscipere. Verum uno loco videtur per morbi
principium illud intellexisse tempus, in quo nondum
existunt coctionis notæ, ut apparet in espositione il-
lius hæc si ab initio morbi appareant &c.

1. prædi-
ctionum.

1. Aphor.

1. de ratio-
ne uictus.

CAP. XII.

Lib. de ra-
tione vict

CUM igitur ostensum sit per morbi vigorem, sta-
tum quo ad symptomata intellexisse, superest conside-
rare de quo nam symptomatum genere maxime sit in-
telligendum. Quod nec de ijs quæ accepta feruntur
naturæ quæ ^{ἐπιούσα} dicuntur, nec de ijs, quæ a mor-
bo & natura citra materie apparatus pugnantibus
proueniunt, ab Hyppocra. licet elicere in expositi-
one illius, modi autem & constitutiones &c. Ubi mor-

1. de mor-
bis uulg.

F ij borum

DE VICTV FEBRICIT.

In de mor-
bis uulga-
ribus pri-
mo comē-
3.

borum modo refert, ab initio uehementissime incipiē-
tium. Quos Hip. ab initio florere ait, & uigere, pau-
latimque remitti ad iudicationem usque. Manifestū
autem sit, quod ea quæ in morbis ab initio fiunt sym-
ptomata, non ob pugnam naturæ cum morbo ob com-
plendam cōtionem proueuire, aut ob maximos eius
conatus cum materiam morbi extra corpus pellere ni-
titur, sed de ijs symptomatibus quæ morbum insequun-
tur, cum ad maximam perueniunt magnitudinem sta-
tum esse intelligere oportet in doctrina Hyppo. Qua
via haberi possit præcognitio maxime eorum magni-
tudinis consideremus oportet.

C A P. XXIII.

3. Prædi-
ctionum.

PROINDE duo sunt, quæ maxime finem magni-
tudini symptomatum imponant, ultimum resistentiæ
naturæ, & perfectæ morbi materiæ cōctiones. Causi
si quidem, vigilæ tanto durabunt tempore, quanto la-
borantis virtus ferre possit. Cum uero ultra non pos-
sit succumbit. Et sic fuit ea hora status quo ad sym-
ptomata, ob ultimam resistentiam naturæ. Quandoq;
increscunt, quousque naturæ, perfectæ morbi cōctione
crisim faciat. Vltima ergo naturæ resistentia, & mor-
bi cōctio, symptomatum incremento finem imponunt.
verum cum multæ sint ægritudines, quæ citra cōctio-
nē in abscessus terminentur. ut Hy. ait in expositione
illius, qui tenuē crudāq; vrinam diutius mingūt. &c.
Rationi consentaneum non est, ut per cōctionis notas,
statū quo ad symptomata prænoscamus. Præterea cū
in superiorib. ostensum sit, tēpus cōpletæ cōctionis in-
cer-

certum esse ob triplicē causam, æquum non est ab eo quod in se indefinitum est, uictus formam diffinire. A robore igitur ægrotantis, & à symptomatū magnitudine & uehemētia, statū cōiiciendū esse putamus. Exēpligratia. Socrate laborante, mediocri febre acuta cū uiriū robore, cuius symptomata nō cessant, sed cōtinēter capitis dolore, uigilia, et siti, torquetur, morbi statum ad septimū fore diffiniam. Nam ad id temporis, Socratis uirtus feret prædicti morbi symptomata. Et non ultra, citra aliquam quatuor crīsum, ob quarum singulas symptomatū magnitudo imminuetur. Sis modo mecū, & perpende quā sit utilissima huius termini præcognitio. Cum sciam Socratis morbum ad septimum usque statum habiturum, & non ultra, talem uirtus formā ordinabo ut Socratem ad septimum seruari possit. Præterea dabo operā, ut coctiones ad id temporis compleantur, minus naturam cibo impediendo. Hoc enim scire magni est momenti, & tempus simul quo cōpleri oportet. Sic enim artificis cuiuscunq; artis cū aliquod agrediuntur opus, quod cito compleri oporteat, statim querunt quid agendum sit, et quāto tēporis interuallo. Iuxta quod totum in partes diuidunt opus, in totidemque temporis spatium, ita ut In diarias partes operam diuidant. Cūq; aliquid in diuisione errauerint, aut ob quamcunq; aliam causam minus cōpleuerint, id expeditiori diligētia ante præfinitum terminum suppleant. Sic profectō in arte medica maxime necessariū est, præcognoscere terminum ad quem usq; ægrotantis uirtus morbi acumen ferre pos-

DE VICTU FEBRICIT.

fit. Ad quē terminum dirigendi sunt uictus. Talemq; præstabis, ut laborantē eo usq; seruare possit. Tum ut spatium sit naturæ consuecendi coctiones ad præfinitum terminum. Cūq; ex opera naturæ in primis quatuor diebus coieceris, naturā posse ad septimum coctiones complere hominem seruandum esse scies. Quod si contrarium eueniat, moriturū in acuta ægitudine. Non solum igitur ad uictus intentionem utilissima est huius termini præcognitio, uerum ad partem artis, quæ prædicat, ualidissimus est totius prædictionis scientiæ neruus. Absq; quo nihil certo posses prædicere.

C. A. P. XXIIII.

UNDE nā cōiicias inquires quot dies is qui ægrotat morbi acumen ferre poterit. Diuinus nos docuit Hypp. in scriptis suis post longas, & diligentissimas, apud ægrotantes obseruationes adinuestigans. Acutas ægritudines dixit Hyp. in quatuordecim diebus iudicari, nō quod omnium acutarum crīsim in quartadecima die fieri uelit, sed crīsim acutarum ad usq; quartadecimā diem protrahi posse. Hunc terminū in acutis signauit. Non quia eo temporis interuallo coctiones perficere necessum sit naturam. Sed quia obseruauit quantūcūq; robusti hominis naturam labores acuti morbi ultra dies quatuordecim citra aliquā quatuor crīsim ferre non posse. Ob quā causam crīsim hunc terminū uocauit, ac si diceret crīsis futura terminū. Nec ob præter mentē Gal. est qui ita in eodē scribit. Quod sit necessarium ob morborum magnitudinē, ac symptomatum uebementiam, uel cito uires prosterni adeo

adeo ut homo moriatur, uel si ad excretionē humorū impetum faciat, & quos inuasit exuperet bonā sequi crīsim, si uero exuperetur malā. Propterea igitur inquit est impossibile, ut in longum tempus indicatio differatur in morbis acutis. Terminum igitur in hisce omnibus Hyp. posuit duarū septimanarum, tanquam nullus eorū ulterius progrediatur. Verū ante quartā decimā diem multi indicari possunt. In quibus uerbis Hyp. dicto promotus Gal. terminū attingit, quē morbi acumen & uirtutis tolerantia diffiniunt. Quid aliud præterea multū cum in hunc modum scribit si quibus, inquit horū capit dolor die primo, die quarto præmittitur maxime, & quinto, ad septimū soluuntur. Quid nam aliud intelligit per dicta uerba, q̄ quod dictū est? nempe dolorem capitis uehementē & continuum, naturam ultra septimum citra aliquam quatuor crīsim ferre non posse. Vt melidix contigisse scribit. Ipse præterea deterrimas dixit febres ac signis affligentes difficilimis, quarta die aut citius interimere. Quantum autem ad prædictionem inuenit, iam dicti termini præcognitio. Hypp. ostendit in hæc uerba. Scretio flaua non multo permixta sanguini in pulmonis morbo, si iter initia excernitur, salutaris admodū est, si septimo die uel tardius minus secura est. In cuius expositione, Gal. ita scribit, si uero scretio talis persistat qualis ab initio erat ad diem septimum, periculum imminet exolutionis uirium antequam morbus coquatur. Ob eam rem minus securum uideri dixit pluribus diebus permanere talem screationem. Idem adhuc aper

3. prædictionum.

In libro de morbis uulgaribus.

2. prædictionum.

DE VICTV FEBRICIT.

tius de urina cruda, transactis aliquib. morbi diebus, persistente. De qua ita scripsit eodem libro. Si inquit multi tēporis sit morbus & urina talis persistat, subintellige cruda, periculū est, quod nō possit homo sufficere, quousq; coquatur urina. vides ne ex uerbis hyp. necessarium esse ad prædictionis scientiam, præcognoscere terminum ad quem usque, ferre possit natura laborantis, morbū & eius acumen. Et postea adhuc conferre coctiones, ut quod futurū sit præcognoscamus.

CAP. XXV.

MANIFESTUM igitur ex dictis est, statum de quo locutus est Hyp. in Apho. A quo uictus formam inuestigandam diximus, terminum esse ad quem usque, laborantis uirtus morbi acumen, citra aliquam quatuor crismum ferre possit. Quia uero terminus hic symptomatum incremento finem imponit, status ab Hyp. nuncupatur. Et quia tempus futurae crisis longissimū complectitur, terminus crisis dicitur. Fiunt apud iam dictum terminum, maxima symptomata ob dictā causam, tum ob ultimos naturæ conatus. Potentie enim naturales necessitatem assumentes, fortius operantur, ut ostensum est in libris de facultatibus naturalibus. Multoties accidit ut morbi coctiones ad præfinitū compleantur terminū, tunc triplici ratione symptomata augentur. Nempe hoc statum symptomatum, tum ob uigentis coctionis rationē, tum ob crismum. Simulq; tūc omnia tria symptomatum genera coincidere. Hoc in febribus continuis usu uenire cōperimus. Aliquando contingit ut fiant & compleantur ante dictum terminum

num coctiones, & solvatur morbus. Acciditq; hoc ob
 materie morigerationē, aut ob uictum iusto magis te-
 nuem. Ad primum spectat modum, quod dixit, simpli-
 cissimas febres, ac signis firmatas securissimis, quarta
 die aut citius desinere. Secūdu attigit in Apho. ubi di-
 xit contēplari igitur oportet egrotantē, si sufficiat cū
 uictu ad statū, et nunquid prius ille deficiat, nec possit
 cum uictu perdurare, uel morbus ante deficiat, atque
 obtundatur. De laborantis robore, & morbi acumine,
 factō iudicio, terminū coniecimus, ad quem usq; egro-
 tans morbi acumen citra aliquā quatuor crisiū fer-
 re poterat, eo usq; ducere, uictum posse egrotantem.
 Quod si huic tenuem magis quam oporteat uictum
 exhibeas, alterum duorum accidet. Aut egrotantis
 natura ob tenuitatē cibi alleuiata, diutius morbi cau-
 sa uacans, citius hoc est ante præsinitum terminum
 coctiones complebit, & sic morbus soluetur ante sta-
 tum, in quo maxima futura erant symptomata, mor-
 būsque obtundetur, quod idem est ac hebetescat, hoc est
 non perueniat ad ultimam incrementi magnitudinē.
 Aut eueniet, ut coctiones cōplere nō potens natura,
 imbecillis facta ob cibi tenuitatē, deficiat ante dictū
 terminū. Quapropter, cum anceps sit euentus, cauē-
 dum est ne magis tenuem exhibeamus uictum eo, qui
 egrotantem ualeat ap præsinitum terminum ducere.
 vocemus hunc uictum medium clarioris sermonis gra-
 tia. Duo igitur cōsiderare oportet, quisquis tenuiorē
 uictum medio exhibiturus sit, nempe utrum morbus,
 an æger prius deficiat. In bene morigeratis morbis,
 quorum

3. pradi-
 tionum.

DE VICTU FEBRICIT.

quorū materia parū à naturali symetria discesserit, credendū est tenui uictu morbum. & non uirtutem de-
fecturam, ut infra latius ostendemus cū de febre fle-
gmatica à dulci aut naturali pituita eueniente nobis
sermo fuerit. In ijs enim natura ob cibi tenuitatē ma-
gis morbo incumbente, futuras coctiones ante præfinitum terminū sperabimus, ob materia morigerantiā.
At in male morigeratis morbis quorū materia ualen-
ti sunt affecta putredine, tenuiorē uictum medio mini-
strare caueo. Nam uirtus potius quam morbus ante
terminum præfinitum quem deinceps statum uocabi-
mus deficiet, materia nō cedente. Verum hoc tanquā
uniuersale habeto dogma, uictū exhibere qui seruare
egrotantem ad statum possit. Hoc tenuiorē non dabis
nisi cum morbum defecturum, & non uirtutem agro-
tantis ante statum conieceris, hoc fiet si ante statū co-
quatur morbus. Hoc est quod Hyp. dixit cōtemplari
igitur oportet egrotantem si sufficiat cum uictu usq;
ad statum, et non quid prius ille deficiat nec possit cū
uictu perdurare, uel morbus ante deficiat & hebetes-
cat. Et dictis licet colligere, morbi statum, & termi-
num quem morbi acumen & uirtutis tolerantia defi-
niunt & crisis terminum idem indicare. Hunc præco-
gnoscendū ex ijs quæ morbus affert symptomata, &
non ex signis coctionis. Nec id cū dictis Hyp. pugnat,
cum dixit coctionē uelocitatem crisis & signum salu-
tis certum portendere, neq; cum scripsit alibi, quæ ci-
tius magisq; madescunt iudicationis denuntiant cele-
ritatē, neq; ijs quæ Gal. in tertio de Crisibus scripsit.

Aliud

In 1. de
morbis
uulgari-
bus.
1. de ratio-
ne uictus.

*Aliud. n. est. crisin ipsam inquirere. & crisis terminū
nam crisin utrū bona futura sit, & quando maxime,
ex coctionis signis coniiciendam esse opinamur. Quia
naturalī ordine coctio semper expulsionem praecedit.
Terminus uero crisis nō ex ijs, sed ex morbi ui & uir-
tutis resistētia praecognoscitur. Primū per morbi sym-
ptomata, secundū per uirtutis robur cōnciemus. Hūc
ergo terminū tanquam immobilem & firrum, praeco-
gnitione dignū esse, ut ab eo exhibendi uictus, & pra-
edictionis scientia sumatur. Quod utrunq; adipisci po-
test facilius cōiectura habita huius termini, ex dictis
manifestum est. Adbuc apertius illi fiet quisquis in-
lectione Hyp. exercitatus fuerit.*

CAP. XXVI.

NEQVE obliterit, si ab eo quō diximus termi-
no uictus formam summā conualituris pariter & mo-
rituris uictus rationem diffiniret Hyp. Cū tamen hu-
ius contrarium asserat Gal. cum ita scribit Apbo. pri-
mo, quorū, inquit summū uigorem excipit mors, in his
ea solum artis parte quae praedicat utemur &c. Neq;
igitur curationem, neq; uictus rationem ijs adhibere
consulit qui morituri sunt. Nōne hoc idem sequitur si
penes statum quo ad coctiones uictū diffinias, quot. n.
sunt, qui eo tempore quo maxime coctionis opus com-
plementum recepturum sit, e uita discedunt. Verum
si rem altius consideremus, haud quaquam profe-
ctō. sapientissimi uiri autoritate dignum uidetur es-
se putare, solum haec dogmata de ratione uictus scri-
psisse Hyp. ad eos quos seruandos esse certo sciamus.

Nam

DE VICTV FEBRICIT.

Nam cū ars medica nil certi præstare possit, cōtinget multoties ut felicia promittēte medico, moriatur infirmus, et aliquoties sanetur præter medici opinionē. Nōne hæc facile credibilia sunt, utpote cū nostra ætate plura horum exempla inter hominū conuentus adducātur. In quibus male audiunt medici. Quare crudelis hominis officio & nō medici fungeretur, si artis opem seruandis negaret. Prauā præterea concipiendi de arte medica opinionē hominibus ansam præberemus, cum ij quos sanandos artis remedijs sumpserimus moriantur, quibus uero de eorum salute desperātes nil remediij attulerimus, sponte sanentur. Quare Hypp. autoritate dignius est putare, hæc dogmata de uictus ratione, oībus tā qui euasuri sint, q̄ qui morituri tradidisse ægrotantibus. Atq; eo magis quod hæc artis medice pars, quæ uictū docet medicum ad quemcunq; euentū solet infontem reddere. Nou. si ea quæ de pharmacis agit, aut manualet docet operationē. Diximus in ijs quæ præcesserunt, à duobus uictus formā accipiendam, nempe à morbi cōstitutione, in qua status distantia cōprehenditur, et ab ægrotantis robore. Per statū terminū intelleximus, ad quē usq; ægrotantis uires morbi acumē citra aliquā quatuor crisiū ferre possint. Principiūq; huius termini inuentionis dedisse Hyp. nēpe, cū per symptomatū differentias, et eorundē uebementias, singulis morbis suū diffiniūt terminum, ad quem usque incrementibus symptomatibus statum morbi esse, nisi cōtiones præueniant. Ob quarū causam morbum solui ante statum intellexisse Hyp.

Hyp. diximus. A dicto termino præcognito, victus formam inueniendam esse. Vnde si morbus ad quartum terminari debeat, sola aſtinentia, ſi ad ſeptimum poculis, ſi ad undecimum tenui ſorbitione, ſi ad quartumdecimum craſſa nutriendos eſſe ægrotantes. Ab ijs robur laborantium conſulendum, an prædicta victus formali ad præſinitum terminum citra magnū uirium detrimentum durare poſſit. Quod ſi tenui ſorbitione eo ſeruari non poſſe exiſtimemus, craſſam miniſtrabimus; qua durare poſſit, eritq; hæc ægrotati medius victus. Tenui autem ſorbitione qua æger durare non valet non utemur, niſi cum ſenſerimus morbum deſecturum ante terminum, & non virtutem ægrotantis. Idque contingere in bene morigeratis morbis, quorum materia parum à naturali ſymetria diſceſerit. In male morigeratis morbis, quorum materia valenti ſunt affecta putredine, tenuiore victum miniſtrare eo, qui ægrotantem ad præſinitum terminum ducat, ſummæ cauendum eſt.

CAP. XXVII.

NEQVE ſilentio præter eundem, omniâque dicta ſunt, in ijs ſolummodo intelligenda eſſe morbis, qui poſterius ſtatum habituri ſint. Quique leuiter, & ſummiſſim incipiunt, ſub increſcunt vero, & exacerbantur ſecundum ſingulos dies, aut alternos, circa criſim uero abunde lucent. In ijs diximus a conſtitutione morbi, & robore ægrotantis, una cū ſtatu diſtancia, victus formam inueniendam eſſe. Verum ſcire oportet morborum

DE VICTV FEBRICIT.

horum esse duos alios modos, qui diuersam victus ratio-
 nem indicant, ac longe illi dissimilem quam hucusque
 tradidimus. Quam ob rem animum huc reuocato stu-
 diose lector, quæ enim tibi dicenda paro, ad intelle-
 ctum eorum quæ ab Hippoc. in libris de ratione vi-
 ctus, & in libro aphorismorum scripta sunt, maxime
 conducent. Ut aperte senis mentem percipias in ijs,
 quæ ad victus rationem attinent. Quæ quantam se-
 cum in artis opere utilitatem afferant, uel tu ipse iu-
 dicare poteris. Status quantum ad symptomata atti-
 net, tribus ægritudinis temporibus haberi posse sci-
 to, ut in morbi principio, nempe cum materia cruda
 est. Aliquando posterius, ut cum maxime complen-
 tur coctiones. Sunt & morbi qui inter medio tempo-
 re vigeant. Huius speculationis primus autor Hyp-
 fuit. Vir sanè intellectu maxime philosophico, dili-
 gentissimusque scrutator eorum quæ humano corpo-
 ri accidunt. Hic igitur in primo de morbis vulgari-
 bus tertio commentario ita scribit. Εἰσὶ δὲ τρόποι καὶ κα-
 τὰ φύσιν καὶ παροξυσμοὶ τῆς νόσου ἐκάστη τῶν πυρετῶν ὁμοίως συν-
 χεῖν διαλαπόντων. αὐτίκα γὰρ συνεχὴς ἐστὶν οἷσιν ἀρχόμενος ἀντὶ καὶ
 ἀκμάζει μάλιστα, καὶ ἀνάγ' ἐπὶ τὸ χαλεπώτερον, περὶ δὲ κρίσιν
 καὶ αἵμα κρῖται ἀμολιπύεσθαι ἐπὶ δὲ ὅσιν ἀρχεται μαλακῶς καὶ ὑπο-
 βρύχιος ἐπαναδιδόει δὲ καὶ παροξύνεται καθ' ἡμέραν ἐκάστῃ περὶ δὲ
 κρίσιν καὶ ὑμακρίσει ἄλλος ἐξελαμψεν ἐπὶ δὲ οἷσιν ἀρχόμενος πρὸς
 ἐπιδιδόει καὶ ἐπιδόει καὶ παροξύνεται καὶ μέχρι τινὸς ἀκμάσας πάλ-
 λιν ὁφίησι μέχρι κρίσεως καὶ περὶ κρίσιν συμπίπτει δὲ τὰυτὰ καὶ γί-
 νεται ἐπὶ παντὸς πυρετοῦ καὶ ἐπὶ παντὸς νοσήματος, hoc est se-
 cundum veram uersionem, sunt modi, & constitu-
 tiones, et paroxysmi cuiuslibet harum febrium, simi-
 liter

liter continuarum, intermittentiũ, statim enim continua est quibus incipit floret, & uiget maxime, & ad difficilius ducit, circa crĩsim uero & simul in crisi imminuitur. Sunt quę, incipiunt leuiter, & summissim, subincrescunt uero & exacerbantur secundum singulos dies, circa crĩsim uero, & simul in crisi abunde lucent. Sunt quę incipiunt leuiter, augentur uero, & exacerbantur ad certum augentes terminum, rursus remittunt ad crĩsim usque, & circa crĩsim. Accidunt hæc, & fiunt in omni febre, & in omni morbo. Hęc sunt Hyppoc.uerba, quę ob id maxime expositione digna esse dæxi. Propter, id quod statim subiungit, oportet, inquit ex horum consideratione offerre uictum. Triplicem in ijs uerbis designauit Hyppocra. modum aut differentiam quę contingere possunt singulis morbis, & febribus. Aliquando symptomata, quę morbum sequuntur, statim ab initio molestant, & grauiter torquent egrotantem, augentur & increscunt et difficilioræ fiunt, circa crĩsim uero & simul in crisi imminuuntur, hoc est cum morbi materia ferè cocta est, & perfectæ cocta, quo maxime in tempore crisis fieri solet. Hoc accidit in pleuritide, & peripneumonia, & in omni inflammatione, quę in ijs corporis partibus fit, quę ad motum à natura ordinata sunt. Hęc inquam à naturali motu magis perturbantur ob multitudinem materię & eius cruditatem. Quapropter huiusmodi partes cū inflammationibus corripitiũr, inter initia, materia cruda existente, grauiora patiẽtur laborantes,

DE VICTU FEBRICIT.

res, symptomata, & periculofiora, quàm cum morbus coctionem recipit. In omni præterea febre secundum accessiones aut exacerbationes inuadente, cū à multa ortum habet materia, aut nimis crassa, deteriora sūt morbi principia. Cuius signum est illud quod Gal. tercio libro de Crisibus cap. ix. scripsit. Nempe in principijs accessionū contingere mori ægrotantes ob multitudinem materiae, & ob eius crassitiē, aut inflātionis magnitudinem. Scis enim mortē semper in deteriori parte paroxysmi fieri. Cū igitur ob dictas causas grauiora fiant accessionū principia particularia, manifestum est, eadē ratione totius morbi uniuersale principium fore deterius. Cūq; in pleuritide, aut peripneumonia, morbus coqui incipit, minus grauat inflammatio mēbra spiritus, tū quia coctione leuior fit, tū quia materia per habitū & per sreatū imminuitur. Quæ causa sunt imminutionis symptomatum, et dolorū, ut scribit Hyp. dolores, inquit pleuriticorū cōfestim spōte designunt, ubi aliquid effatu dignū tum expui, tū expurgari caperit. In febribus similiter quæ ratione multitudinis, aut crassitiei, deteriora sūt pñcipia, cū coctionis uestigiū in materia cōspicitur, & multitudo imminui incipit, et crassities materie attenuari. Vt à Galeno in libro de Totius morbi tēporibus scriptum est. Aliquādo symptomata in initijs morborū debilia sunt & parua, augentur indies et exacerbātur, circa crīsim uero et in crisi abūde elucē, hoc est eo tpe quo maxime cōplentur coctiōes, in maxima sunt uehementia. Fiuntq; tūc temporis grauissima symptomata, ob duplicem

1. de ratio
ne uictus.

duplicem causam, ob materia putredinē, & ob maximum certamen naturæ cum morbo circa materiae dispositionē. Ad hunc modum reducitur quod dixit circa generationē saniei doloros & febres accidunt magis quàm facta, accidit hoc in omni inflammatione, quæ ad suppurationē peruētura sit, cuius materia multitudine, & qualitate, mediæ sit dispositiōis, ut in flegmone euenit cū ad suppurationem peruenit, grauiora tunc accidunt symptomata cū maxime complentur coctiones & sit sanies, quàm ante actis morbi tēporibus. In febribus similiter quarū materia ad unam creticam seruatur expulsionē ut incontinuis, tūc grauiora sūt symptomata cū maxime cōplentur coctiones. In summa ut iterū repetam, in omni morbo, in omni febre, ubi materia multitudine, aut crassitie, aut acri qualitate, egrotātis naturā grauius molestat, inter initia grauiora sūt symptomata. Et prout morbus coctionē recipit ita mitiora sūt. Hoc modo plures febrium flegmaticarū & tertianarum & quartanarū multo magis quintanarū inter initia grauius affligunt, & periculosiora sunt. Priuatim hoc accidit thoracis morbis ob partiū motum. Cum autem morbi à materia mitiori ortū habent, ut est sanguis, dulcis priuati naturalis melancholia, tū qui ex bile & pituita miscentur adinuiçē humores, circa morbi initia omnia mediocriter se habent. Procedēte morbo augētur symptomata, tū ob qualitātē putredmalem magis auctam, tū ob maiorem pugnam inter naturā & morbum. Ita ut circa crīsim & simul in crīsi maxima fiāt ob dictas causas.

DE VICTV FEBRICIT.

Tum ultimo ob ea quæ crisis subitam mutationē insequuntur symptomata. Unde fit, ut omnia tria genera symptomatū in unū tempus coincident. Nempe quæ a morbo, & quæ à natura, et quæ ab utroq; simul proveniunt. De hoc igitur statu in quo tria symptomatū genera coincidunt. Intelligendum esse Apho. nempe. Quādo morbus in suo uigore constiterit, tum uictu tenuissimo necessariū est uti. Ob id dixit Hip. circa crīsim & simul in crīsi abunde elucet. Qualem uictū in morbis qui huiusmodi statum sortiuntur ministrare debeamus, in superioribus diximus. Quādoq; contingit ut intermedio tēpore grauiora accidunt symptomata cōmotionis humorū causa, hæc sæpius in augmento morborū fieri contingit, quā in principio, in quo immoti præstant in proprijs locis humores. Et q̄ in statu, utpote iam ferè facta separatione. Quæ ergo à ui morbi cōmotio fit, in augmento magis accidit, in quo adhuc prauī cum bonis mixti sunt, at quæ à natura fit commotio nō similiter est, nam facta cōctione natura ut trīstātes expellat humōres cōmotionem in corpore excitat. Secundū igitur hanc triplicē considerationē, nempe an status quo ad symptomata, inter morbi initia, materia adhuc cruda existente eueniat, aut cū maxime cōplentur cōctiones, aut intermedio tēpore, inquirēdo uictus fore laborantibus salubres. Quare à triplici status consideratione, triplex uictus eliciendā est ratio. Alia enim habenda est, cum morbus inter initia statum habet. Alia cū eo tempore quo maxime complentur cōctiones. Et demum alia cū intermedio tempore

tempore viget. Longe enim differunt victus qui horū singulis conueniunt. Horum trium modorū considerationem ad victum maxime necessariam, primus Hyp. tradidit. Primi modi meminit in libris de ratione victus. Vbi sub exemplo pleuritidis & peripneumoniae de omnibus qui à principio florent, & statim vigent morbis, ad crifim vero mitiores sunt, agit.

CAP. XXVIII.

IN ijs igitur morbis, victus formā non à distantia status ut supra diximus, sed à coctione morbi summandam esse. Ita ut cum morbus crudus omnino est, tenui aut tenuissimo uti victu oporteat. Cum autem coquitur plus concedendū, & iusta maiorē coctionem, magis ministrandum. Primum ostendit Hyp. cum dixit nempe si morbus siccior quā ut quispiam existimet fuerit, non multum dare oportet, sed ante sorbitionem uel mulsam uel uinum, utrum magis auxiliaturum putaueris propinare conuenit. Manifestum autem tibi est ex ijs quae supradicta sunt, pocula, victum tenuissimum constituere. Secundum ostendit in ijs quae sequuntur verbis, ubi ita ait. At si os madescat, & quae à pulmone expuuntur, talia sint qualia esse oportet, sorbitionis quantitatem ut dicam summatim augere cōuenit. Nempe quae citius magisque madescent iudicationis denuntiant celeritatem. Tertium similiter ostendit cū statim scribit, & quanto fuerit expurgatio maior, tanto magis ad iudicationem usque dare oportet. Neque id prae rationem est, nā in huiusmodi morbis qui ab initio uigent, grauiora inter initia accidunt symptoma

i. de ratione victus.

DE VICTV FEBRICIT.

ta. Ob materiae cruditatē, aut multitudinē, aut a crem
 qualitātē, utrunq; autem coctione cum euanescat, ut
 supra ostendimus de mente Gal. in libro de totius mor
 bi tēporibus, fit, ut à coctione materiae, uictus formā,
 & quantitātē mutandas fore nemo nō arbitretur. Id
 quod ipse Hip. ostendit statim, ac si formae uictus mu
 tationis rationē reddat. Dolores siquidem, inquit pleu
 riticorum confestim sponte desinunt, ubi aliquid effa
 tu dignū, tum expui, tum expurgari cœperit, nempe
 & purgationes longe perfectiores existunt, minusq;
 purulenti ita fiunt, quā si quis aliter cibaret. In omni
 ergo morbo in quo procedens coctio symptomata mi
 tiora reddit, ab ea uictus ratio summenda est. Item ui
 ctus forma & quantitas ad maius mutandae sunt. Ita
 ut toto eo tempore quo materia cruda est, una uictus
 forma nempe tenui aut tenuissima alendus sit aeger.
 Cūq; in materia coctionis manifestū signū appareat
 crassior uictus exhibendus est. Secundi autē modi me
 minit in Apho. ubi docet uictū inuestigandum secun
 dum status distantia, & morbi constitutionē, de quo
 diffuse in superioribus dictū est. Hac igitur de causa
 Hip. in libris de ratione uictus, coctionis meminit ad
 uictus formā inueniendam. Meminit & quandoq; sta
 tus, ut in Apho. libro obscure nimis praedictos modos
 attingens, ut scopos ad uictus inuentionem. Quod ma
 nifeste apparet ex ijs quae Gal. scripsit, omnia quae ab
 Hip. dicta erant de ratione uictus repetens sub com
 pēdio, ubi ita scribit, meminit quoq; & coctionis mor
 bi sepe, non parū scopum uniuersi uictus & quae in
 ipso

In fine
 tertij de
 ratione ui
 ctus,

ipso fiunt mutationum hunc faciens. Pari modo & de morbi uigore quippiam dixit, ad quem respiciēs neq; tanquam ad abiectissimum in uictus ratione scopum, alimoniā ministrat. Hæc quidē scripsit Gal. de coctionis scopo, non ostendens in quibus morbus ad uictū in ueniendum respicere eam debeamus, & quibus morbi statū. Hæc igitur omnia & singula diligenter in morbis aduertere oportet. Et has tres morborum differē-tias, aut modos, in singulis morbis à natura & habitu nostro fieri posse. Vt prudentissimæ tetigit Hip. in eo neq; n. horum uideo, ita expertos medicos &c. Quapropter considerandā esse egrotātis naturā, & habitum, nā picro cholorum natura talis est ut febrīū initia deteriora efficiat. Qui etiam natura frigidi sunt, exilium uenarū, crasso habitu, pingui ab domine, præ terea corporis nostri partes ut septū, pulmo, & guttur similiter habent. Biliosi mediocri habitu quicūq; sunt & sanguinei & hepar, hæc magis propè crīsim exaciūnt. Hoc est profectō qđ Hip. loco citato dixit, quæcūq; nostra natura et habitus singulis in morbis fabrefaciat affectus & species omnigenas quæ cognita salutē & mortē, ignorata ferant. Sed forsā quis dubitabit causam ob quā in Aphorismorum libro in quo uniuersalia uictus dogmata collegit, secundæ morborū dispositionis qui inter initia uigent nō meminit. Vt in ijs suā uictus rationē doceret. Quinimmo quicūque scripta Hip. peruigili & nō tumultuaria lectione euoluat, sex de uictus ratione Aphorismos consequēter scriptos inueniet. Ab ijs septimus sic habet qui-

In 2. de ra-
tione ui-
ctus.

DE VICTV FEBRICIT.

buscunq; quidem igitur statim status est tenuiter distare conuenit. Quibuscunq; status postea ad illud & ante illud parū, auferendum, prius uero uberius reficiendum ut sufficiat agrotans. Cū attente legeris eos qui hūc præcedunt Apho. de uictus ratione inuenies, breuitatē sermonis Hip. & eiusdem sententiātū grauitatē septimum Aphorismum tanquam superfluum nō admittere. Si de ijs quæ dixerat intelligatur. Præterea si de ijs morbis ageret qui ob ultimos labores statim uigēt & crīsim habent, tenuissimo eos uictu ut antea dixerat & non tenui scripsisset indigere. Aliū igitur tetigit statū, qui ita uehemens nō sit, quē plurimi morborū inter initia obtinēt, quiq; durat donec materia morbi cruda est. Nam cum symptomata quæ inter morbi fiunt, ob solam materiæ multitudinē, aut crassitiem, aut humoris acrem qualitātē eueniat, & non ob cōmotionem naturæ ad expulsionem parantis trīstantes humores, neq; ob maximam pugnam naturæ coquentis cum morbo putrefaciēte, ut eo sit maxime tempore quo cōplentur coctiones, fieri nequit ut sint uehementissima & ultima. Prout ijs contingit morbis qui tūc maxime uigent, cū duo aut tria symptomatū genera coincidunt. Verū quia in morbis ijs qui inter initia uigent, quibusdā uehemētiora contingunt symptomata & periculosiora, ita ut eorū ratione tenuissimus uictus adhibendus esset, quibusdam uero minus uehementia & periculosa, ita ut tenuis uictus ijs cōueniens esset, prudentissime Hip. ijs morbis tenuē uictū ministrandum docuit in Apho. cum ait
qui-

quibuscunq; igitur statim vigor est tenuiter diutare
 cōuenit. Quibus uero posterius debet cōsistere, in ipso
 consistendi tempore & parum ante illud cibis subtra-
 hendus. Prius uero uberius reficiendum, ut aeger suffi-
 ciat. Quibus uerbis de eo morborum statu agit, qui in
 eo maxime fit tempore quo conficiuntur cōctiones.
 Duos ergo prae dictos modos terigit morborū Hipp. in
 dicto Apho. à quibus uictus rationem inuestigare do-
 cuit, breuissime quidē ut solet. Cum ergo symptomata
 periculosa & uehementia inter initia fiunt, ut in an-
 gina, & pleuritide morosa, tenuissimo uictu dum ma-
 teria cruda est utemur. Prout ipse monuit in libro de
 ratione uictus. Quod si aliter eueniāt tenui uictu uti
 sat erit. Nam cum talia symptomata eo usque durēt
 quo ad cōctionem materia recipiat, idq; non una die
 sed multis fortassis fiat, cōsulte non ageretur, si tenuis-
 simo uictu toto eo uteremur tēpore, quo materia cru-
 da permanet. Repentinas praeterea mutationes dete-
 statur Hip. sub ijs uerbis, nec repente quicquam huc,
 uel illuc, mutare in toto negotio licet. Quapropter
 homine hesternā die, solido cibo uso, omnimodam ine-
 diam hodie iniungere, conueniens non est, ubi corpo-
 ris dispositio maximo interuallo, à naturali non disces-
 serit symmetria. Quod in solis peracutis & ultimis ac-
 cidit morbis. In ijs rationabile est ut uictus similiter
 maxime distet ab eo, quo bona usus est ualitudine. Ob
 id prudenter dixit senex mutare quidem bene habet,
 si recte transferatur.

2. de ratio-
 ne uictus.

DE VICTU FEBRICIT.

C A P. XXIX.

Ceterum quia non facile est cuilibet ea quæ dicta sunt percipere, neque percepta ad opus deducere, omnes de statu, quas hucusque percurrimus speculationes. Ad indicationem unam in maximum studiosorum commodum reduximus. Scimus enim hominum mentem paucis satiari. Quæ propter omnia quæ hucusque de victus forma diximus, secundum mentem Hyp. faciliori, magisque compendiosa via trademus. Paruo siquidem pondere gaudet bylas. Totum ergo huc studiose lector animum reuocato. Scire aut oportet, virtutem & morbum aliquando non, & quandoque parum, nonnunquam multum, aut quam maxime urgere. Horum singula cognoscere medicum oportet, hoc modo. Virtus tunc maxime urget, cum prope syncopin est. Quod ex pulsu, & facie certissime deprehendere poteris. Multum urget, cum ægotans ijs perturbatur symptomatibus, quæ syncopin solent inducere. Talia sunt ventris crebra deiectio corpus absumentes, sanguinis fluxus immodicus, incessantes sudores. Multum præterea tunc dicimus urgere virtutem, cum in ijs quæ a voluntate fiunt actionibus multum deficere ægotans videtur. Sed diligenter considerare oportet, cum ab ijs iudicium imbecillitatis naturæ sumus facturi, ne ob morbi acumen in huiusmodi imbecillitates deueniant laborantes, & non ob venarum inanitionem. Quod à rationalium medicorum principe Hyp. scriptum est, in hæc verba. Ingens si quidem malum est, si ob laborem, morbi que acumen, imbecillitato, porrexerit quis potum vel sorbitionem copio-

li. 2. de ratione vict.

piofioſorem, uel eſculentum, imbecillitatem eam ex vaſorum inanitione contigiſſe arbitratus. Neque ſanè cæcurniam effugere poteſt, qui agre ualentem ex uaforum inanitione, non cognoſcit, torquetque diata. Diligenter ergo obſeruare oportet; naturæ imbecillitates, an ob inanitionē uenarū ſenſibile, aut ſenſui occultā, aut ob morbi acumen, eueniant. Cum ob uenarū inanitionem ſenſu perceptā, aut occultā, imbecillitates fiunt, multum tunc uirtutem urgere putādum eſt, nō ita uero ob morbi acumen. Vtrunque autem diſcernere à nullo alio quàm à pulſu certius poſſis. Non ex eius magnitudine, utraque enim diſpoſitio paruum efficit pulſum, uerum ex diſtentione & contractione, id percipi licet. Pulſus ſiquidem eorum qui ob morbi acumen imbecillantur, parum diſtenduntur, quaſi puncto digitorū feriant, feſtineq; contrahuntur, ac ſi intro ſurripiantur. Eorum uero qui ob inanitionem uenarū inualidi ſunt, longe aliter habent, ita ut qui uis illud dignoſcere poſſit, ſi incognitione pulſuum mediocriter ſit exercitatus. Aut. n. æquales faciunt contractionibus diſtentiones, aut has quidem maiores. Hoc quidē magni facere oportet. Nam non ſolum ad uictus inuentionem, uerum ad eam artis partem, quæ morbos curat maxime ualet. Parum uirtus urget, aut ratione ætatis, ut cum puerulus, aut ſenex inſirmanſur. Aut cum corpora rara, & tenuium ſuccorum, febribus corripuntur. Vbi præterea irritantia adſunt ſymptomata, ut pruritus ingens, tenaſmon, morſus quē acris humor in vētriculo, aut inteſtinis parit. Vigilia, ira intus

com-

DE VICTU FEBRICIT.

In 2. de ra-
tione ui-
ctus.

compressa, mæror, & similia quæ cõmuni proritatio-
nis nomine comprehenduntur, Ut in. expositione illius
de mutatione, quæ in hac uel illa &c.

CAP. XXX.

MAXIME urgere morbum dicimus cū ultimos
affert labores. Hos esse intelliges cū symptomatibus
cõiuncta est inquietatio, & angustia. Tunc multū ur-
get, cum aliquod affert. seuū symptoma, ut continuas
uigilias, aut perpetuū soporem, aut cõma, aut fortem
capitis dolorē continuū, aut difficilem anhelitum, de-
liriū, aut cū urina supprimitur, aut alius nimis ciet.
Parū urget, ut cū sitim patiatur, aut cibos ualde fasti-
diat, aut si præter modum astricta sit alius. Aut cū
ea successiuis temporibus patiatur symptomata, quæ
morbum multū urgentem reddere diximus. Quando
igitur maxime urget uirtus, id exhibendum fore præ-
cipimus, quo maxime laborantis natura seruari pos-
sit, quāuis illud morbus probibeat. Nam uirtutis ma-
xime urgentis indicatio, eā quæ à morbo suppedita-
tur, obscurat indicationē, quanquā morbus maxime
tunc urgeat. Nonne hoc à Gal. rationaliū medicorū
summo concessum est? in Aphorismis. Vbi ita scribit,
quo circa aliquando in ipso morbi uigore, ubi sympto-
ma aliquod interuenerit robur naturæ dissoluens nu-
trire cogimur. Sciendū præterea has uictus formas sibi
proximas esse. Nempe quæ comeduntur, sorbentur, et
bibuntur, & mediam. Ita ut inter has aliā intermediā
uictus formā inuenire nequeas. Præterea, uirtus pro
sui custodia illum maxime cibum indicat, quæ coque-
re, &

ve, & digerere & (ut oportet) apparare possit. Quo
 fit ut cū uirtus multum imbecillis est, uictū per ea quę
 comeduntur non indicet, quandoquidē difficilioris co-
 ctionis est. Sed sorbitiones aut potus. Morbus præter-
 ea maxime urgens ex sui ratione omnē cibum prohi-
 bet. Manifesta hæc omnia sunt & à rationalibus con-
 cessa medicis præcipue Hip. & Gal. Ponamus igitur
 primū, maxime morbo urgente, non urgere egrotātis
 uirtutem, quenam uictus forma huic conueniet, sola
 inquā inedia. Nā uirtus nō dissuadet id quod morbus
 maxime urgēs indicauit. Tandiuq; hæc uictus forma
 seruanda est, quādiu uirtus & morbus ita habuerint.
 Secundum, quòd si idem uirtutis robur cū morbo mul-
 tum urgente coniungatur, uictū per pocula exhibebi-
 mus. Nam si uehementissimo morbo aut maxime ur-
 gente ad proximā differentiā, quę sensu percipi pos-
 sit, descendas, quem alium quā ualde acutum mor-
 bum, aut multum urgentē intelliges. Quod si consimi-
 liter ab inedia ad uictum, qui eidem tenuitate sit pro-
 ximus, ascendas, quem alium quā per pocula uictū,
 magis tenuem inuenias? cum ergo morbo maxime ur-
 gente inediā solam ministremus, uirtute non dissua-
 dente, manifestum est, quod cum morbus proxime à
 uehementissimo degenerat, uictum inedię proximū,
 ministrandū fore. Nec ad id recte inueniendum opus
 est similes seruare proportionēs, inter uictus, ac inter
 morbos. Ars enim medica, res nō prout à natura sunt
 considerat, sed ut sensum immutant, Cū ergo à morbo
 maxime urgente morbus multum urgēs, & inedia ui-
 ctus

DE VICTU FEBRICIT.

Etus per pocula proxime abesse sensu percipiantur, re-
 ste colligitur uictū per pocula morbo multum urgen-
 ti, uirtute nō dissuadente conuenire. Simili ratioe col-
 liges, uirtute similiter habente & morbo parū urgen-
 te, sorbitione exhibendas esse, uerū cum inter sympto-
 mata, quæ morbum multū urgentem reddunt, & ea
 quæ parū, medio sint loco symptomata sensu perce-
 ptibilia, quæ manifesta ab alijs discerni possint, nō im-
 merito inter morbos parū & multum urgentes, me-
 dia uehementia morbus collocabitur. Diximus autem
 supra fortē capitis dolorem continuum, delirium, dif-
 ficilem anhelitum, uigilias perpetuas, aut soporem, cō-
 mata, urine suppressionē, & similia, cum una perma-
 nent uehementia symptomata esse quæ morbū multū
 urgentē efficiant. Hæc eadem si successiuis fiant tem-
 poribus, ita ut modo sint, in crastinum omnino euane-
 scant, morbum parum urgentem constituent. Quod si
 hæc eadem cum à sua desistunt uehementia nō omni-
 no euanescere intelligas sed solum remitti, medijs acu-
 minis morbum constituent, & mediocriter urgentē.
 Cum ergo morbo multum urgenti, nihil quæ urgente
 uirtute pocula exhibenda fore ostenderimus, sit ut si
 ab huius uehementia proxime morbus degeneret, diffe-
 rentia sensu perceptibili, morbus quē nūc diximus, me-
 dijs acuminis succedat. A poculis similiter si abscedas
 ad proxime crassiorē, tennes esse sorbitiones, indicāte
 sensu, comperies. Ostensum igitur tertio est, quod cū
 uirtus similiter habet, et mediocriter morbus urgeat.
 sorbitiones fore ministrandas tennes. Tum quarto,
 quod

quod cū parum urgeat, crassas. Simili rōe quinto, cū morbus omnino nō urgeat, uirtute similiter habente, uictū exhibendum fore per ea quæ comeduntur. Ponas rursus sexto, quod uirtus parū & morbus maxime urgeant, quem nā alium huic ministrabis uictū, q̄ pocula, si recte ea quæ dicta sunt percepisti. Nā ab eo quod primo ostendimus, simili uia deduci potest. Septimo, stante eadē morbi uehementia, uirtus si multū urgeat, tenues sorbitiones fore ministrandas. Sciendū plures horum qui ita habent interire. Octauo, morbo multū urgente, uirtus si parū urgeat, tenues dandas esse sorbitiones. Simili modo ab eo quod secūdo ostendimus loco, manifestū est. Nono, uirtute multū urgēte, stante eadem morbi uehementia, crassas. Decimo, morbo mediocriter urgēte, uirtus parū si urgeat, crassas quoq; ministrādas fore sorbitiones. Undecimo, qđ si multū urgeat uirtus, stante eadē morbi uehementia, quæ comeduntur, si ea coquere laborantis natura possit. Cum. n. uirtus multū urget, nō solum tunc morbus tenuē uictū indicat, sed uirtutis imbecillitas tanquam secūda causa tenuitatis accedit. Duodecimo, cū morbo & uirtus parū urgeant, uictus per quæ comeduntur exhibendus est. Quod ex ijs quæ quarto ostendimus loco perspicuū est. Tertiodecimo, morbo parum urgente, uirtus si multum urgeat ea quæ comeduntur.

CAP. XXXI.

ET ut in promptu horum singula lectori fiant, in tabellam ea hic reduximus, ut facilius memoria teneri possunt.

uirtus

DE VICTV FEBRICIT.

f

g

b

i

		virtus non urgens	virtus pa- rum ur- gens.	virtus mul- tum.	virtus ma- xime ur- gens.
a	morbis maxime	obstinencia. ⋈	pocula	tenuis sor- bitiones.	victus quo maxime seruare possit.
b	morbis multum	pocula	tenuis sor- bitiones	Crassas sorbitiones	quo maxi- me seruari possit
c	morbis mediocri- ter	tenuis sor- bitiones	crassas sor- bitiones △	que come- duntur	quo maxi- me seruari possit.
d	morbis parum	crassas sor- bitiones	que come- duntur ☼	que come- duntur	quo maxi- me seruari possit.
e	morbis non urgēs	que come- duntur	que come- duntur	que come- duntur	quo maxi- me seruam- ri possit.

Caterum

Ceterum nosse oportet, eorū quæ comeduntur multiplicem esse differentiā, ita ut hæc difficilis sint coctionis, facilis illa, uirtute igitur multū imbecilli existente, si uictū per ea quæ comeduntur exhibeamus, danda est opera ut ea quæ leuioris sint coctionis, ministremus. Finge igitur hominem continua febre laborare, quæ singulis alternis diebus fortior euadit. Ita ut & capitis dolorē et uigilias accessionis die patiatur. Die uero intermissionis omnino cessent. Laborās ipse adulescens, gracili habitu, calida & sicca tēperatura sit, tenuiū succorū, qui citra lesionē una die abstinere nō possit. Morbum ex notarū concursu parū urgere scito. Similiter & uirtutē ob rarū habitū. Nam huiusmodi hominum cōpagines facile à morbificis causis soluntur. Morbum igitur sub signo, d, uirtutē uero in, g, inuenias. Quare cōmunem angulum utriusq; lineæ coincidentis querito, sub hoc signo ☉, ubi scriptum inuenias, uictū per ea quæ comeduntur huic fore cōuenientem. Talemque tandiu exhibebis, donec & uirtus & morbus ita habuerint. Sed finge post dies tres, prædicto inueni symptomata et febres auctata fuisse, ita ut die intermissionis non euanescant, sed utcunq; remittantur, uirtus uero ut ante sit morbum sub, c, querito, locumq; cōmunem sub signo ▲, ubi crassas reperiessorbtiones, quas inueni ministrabis. Sed non solum hoc modo uictus ratio prout toti morbo conuenit habetur. Verum prout particulari accessioni. Nam ut plurimū ab initio paroxysmorum ad inclinationem inchoantem, anguntur laborantes et inquietantur. Nō seruantes

DE VICTV FEBRICIT.

Servantes unā decubitus formam. Cū uero declinatio incipit, & uno permanēt loco, malum tolerabilius ferunt. Cū igitur hac ita habeant, maxime urgent morbi ab accessionum initijs ad statum usq; Virtutes uero laboratiū ut plurimū nō urgēt per id tēporis. Paruo siquidem tēporis intervallo exolui uirtus non potest. Quapropter cū toto tēpore ab initio ad statum morbus sit sub, a, laborantis uirtus sub, f, locus cōmunis sub signo U, ubi scriptā omnimodam abstinentiā inuenies. Quā, rationabiliter in initijs paroxysmorum ad declinationē usq; rationalium medicorū summus Hip. utendū fore in accessionibus monuit. Verū quod ad particulares accessiones spectat. Sciendū uirtutem nisi cū maxime urgeat, nihil urgere. Nam & si multum urgeat, pro eo tamen tempore quod ad paroxysmi inclinationis initium finitur, uirtus non urget, nisi cum maxime urgeat. Vnde fit, ut cum prope sincopin fuerit, aut iam animi deliquio capiatur egrotans, cibum ei ministrandū fore. Quo uirtus seruetur, & si hora seuientis sit paroxysmi. Sed singulas nostræ tabellæ partes secundum senis sententiam esse ostendamus. Morbum maxime urgentem omnimodam exproscere inedia, uirtute non dissuadente, quod ostendit in eo Apho. quem supra citauimus, ubi igitur peracuitas morbus est, & statim ultimos labores habet, extremo tenuissimo uictu, necessarium est uti. Quem aliū rationabilius maxime urgere morbum dixeris, quam eum qui ultimos affert labores, cui extremo tenuissimum uictum conuenire ait, quem supra cum Gal. omnimodam

omnimodam sumus in eadem interpretati. Idem apertius scripsit commentario secundo de ratione uictus, ubi ait, nec cum morbi uigent feruoremque habent cibum dare. Secundum: morbo multum urgente, pocula fore ministranda. Quod in primo de uictu acutorum scripsit in eo, postea si dolor, uel periculum aliquo comparuerit, sorbitionem dare oportet, nec multam, nec crassam, sed post septimum, aut nonum si ualidius sit. Vbi per id uerbum si ualidus sit, uirtus nihil urgentis indicationem addidit. Idem paulo ante apertius dixit, ubi dolor aliquis uexauerit, oximeli bibendum dabis. Manifestum est per hos dolores, non esse eos intelligendos, qui secundum accessiones agrotantes torquent, sed de ijs qui assidui sunt, & ab inflammationibus ortum habent, qui morbum multum urgentem reddunt. Ut manifestum ijs est, qui in libris de ratione uictus exercitati sunt. Sed ne tempus teratur in singulis locis citandis commodius fuerit ita rem ostendisse, ut facile cui uis sit, reliqua ab ijs quæ dicta sunt colligere. Ostensum est secundum Hip. mentem, morbo maxime urgente, inedia, multum uero urgenti, pocula competere. Cum ergo ab eodem tantum fore condescendendum uersus crassiores uictum, quantum morbus mollior fuerit ultimis. Morbo igitur mediocriter urgente, crassiores competere uictum, quam multum urgenti, cunque uterq; morbus, & qui multum, & qui mediocriter urget sibi proximi sint uicinitate, manifestum est tenues huic sorbitiones exhibendas fore secundum Hip. mentem. Nam post pocula, crassior proxime uictus tenuis sorbitio est. Pa-

DE VICTU FEBRICIT.

rum uero urgenti crassas, non urgenti uero ea quæ comeduntur. Quapropter eos qui morbo non urgente laborant, si sorbitionibus aut poculis nutrire uelis, non leuiter peccabis. Quod à sene aperte scriptum est, in eo Apho. qui incipit, uictus tenuis atq; exquisitus, in morbis quidem chronicis semper, & in acutis quibus non conuenit, falax. Manifestum est, morbos quos chronicos uocat symptomata non adducere quorum ratione morbus urgeat. Sed nec febris continuitatem chronicum morbum admittere. Nam hæc eadem continuitas febris morbum acutum constituit, ut autor est Hip. & Gal. in libro prædictionum. Tenuem ergo uictum quæ supra secundum Hip. sententiam in libro de prisca medicina sorbitiones crassas interpretati sumus, & per exquisite tenuem tenues, morbo chronico tanquã nõ urgenti non competere manifestum est. Hucusque ostendimus, secundum senis sententiam qui conueniant uictus, ijs qui maxime, multum, mediocriter, parumque, & nihil, urgent morbis. Verum in ijs uirtutis tanquã non urgentis scopũ non adduximus. Diximusque cum uirtus parum urgere incipiat, proxime crassiore uictum, eo quem morbi dispositio indicauit exhibendum. Quod si multum, uictum qui secundo loco est, fore ministrandum. Ita ut cum uirtus multum, & morbus maxime urgent, tenues sorbitiones competant. Quod asseruit Hip. in tertio comentario libro de ratione uictus, cum de colliquatibus febribus sermonem facit, in hunc modum. Deiectiones (inquit) huiusmodi habent quidem, & alias, quæ graues sunt, offensas, neque enim

In de
morbis
uulgari
bus pri
mo. cõ-
ment. 3

Hippocundriorū extinguunt ardorem, sed excitant inquietationemque, et membrorum iactationem faciunt. Intestina etiam sedemque exulcerant. Quibus uerbis Hip. morbum maxime urgentem depinxerit, uirtutem quæ ob maleficas deiectiones multum urgere. Sed audi quæ statim scribit. Qui ergo in morbis huiusmodi, relictis sorbitionibus, mulsæ potius alterius uice utetur, ijs ut multa feliciter consequetur, sic ei nequaquam præter animi sententiam succedent multa. Sed quas nam an tenues aut crassas intellexerit, Gal. in expositione recte in hunc modum expressit, nempe in solis inquit qui colliquefaciunt morbis, uel in quibus hominum uirtus ad morbi usque iudicationem sufficere non possit, ad ptisanæ cremorem perueniemus. Cremorem ptisanæ, tenuem esse sorbitionem supradiximus. Rursus ponamus morbum, & uirtutem multum urgere, crassam sorbitionem ijs cōuenientem uictum esse diximus. Quod similiter secundum senis sententiam esse ostendimus, qui ita scribit, quibus inquit per febres aluus liquida est, et mens turbatur, horumque multi floccos uelunt, naresque fodiunt, & parum quidem interrogatis respondent, sed ex se nihil quod compositum sit dicunt &c. Et statim ita scribit his igitur ita habentibus, si uenter liquidus fuerit, absumentque, & contabefaciens, sorbitiones crassiores frigidiores, exhibendas esse. Percepisti ne, ex signis morbum, & uirtutem multum urgentes descripsisse, crassasque sorbitiones tali concursu ministrasse. Sed abunde de uictus forma dictum est.

Lib. 4.
de rōe
uictus.

BRVDI LVSITANI
DIONYSII MEDICI FILII
DE VICTV FEBRICITANTIVM

AD ANGL OS.



LIBER SECVNDVS

CAP. I.



VNC DE QVANTITA-
te uictus, tempestiuum est agere.
Nisi enim potus, aut sorbitionis
quantitatem nouerimus, aut
naturam minus iusto exhiben-
tes ledimus, aut morbum si plus
ministrauerimus, augebimus.

Primo
de rōe
uictus.

Victus quantitatis, à consuetudine, & morbi constitu-
tione, indicatio summitur. Consuetudo eā uictus quan-
titem designat, quam agrotans solidioris cibi bona in-
gerebat ualitudine. Sunt enim qui multum uoraces
sunt cum sanitate fruuntur, ijs multum sorbitionis,
aut potus concedendum est, parum ijs qui parce uiuūt.
Hoc nos docuit Hip. in hæc uerba uerum inter initia,
neque multam, neque crassam admodum dare oportet,
sed quantum ob consuetudinem, & ne multa uasorum
inanitio fiat. Morbi proinde constitutio ab ea quam

consuetudo indicauit quantitate detrahit. Vt si uictus quantitatem laborantis naturam ferre non posse conieceris, aut ob temporis breuitatem, ad sequentem accessionem, aut ob morbi molestationem, aut quia sorbitionibus aeger usus non est, ab ea, quā nobis quātitate consuetudo indicauit, detrahemus. Subtractionis autē modus erit, ut non multa fiat uasorum inanitio, cōsuetudo igitur maximam designat quātitatem, quam inter initia morbi offeremus. Vt si Socrati laboranti, uictus formā tenues sorbitiones esse diffinieris, tamē earū offeres inter initia quātū solidiori cibo bona utebatur ualitudine. Proinde prout morbus, & eius symptomata aucta fuerint, ita ab ea quā consuetudo indicauit quantitate detrahendum est. Vt si manifesto incremento morbi symptomata aucta fuerint penes uehementiā, & durationē, sensibilibiter ab ea uictus quātitate, quam primis obtulimus diebus minuemus. Nec hoc prater senis mentem est, loco citato, ubi ita scribit. Postea si dolor quispian, uel periculum comparuerit, sorbitionē dare oportet, nec multam, nec crassam &c. Rationi praterea cōsentaneum uidetur, ut eo minus exhibeatur tēpore, cū laborans magis morbo molestatur, quam cum mediocriter habet. In initio cū egrotantes utcunq; moderatius habeant, tantum exhibendū, quantum consuetudo indicauerit. Apud flatum uero quia morbi symptomata in maxima sunt uehementia, nihil esse exhibendum, ab eodem didicimus. Inter medio uero tempore mediocrē ministrabimus quantitatem, sed cum non ex aequo singulis diebus, aut alternis, nec morbus, nec eius sympto-

DE VICTU FEBRICIT.

In.2.de
rōe ui-
ctus in
acutis.

nata augeantur, non iusta dierum numerum à principio, quantitatem minuendam, sed prout morbus, et symptomata increscunt. Ex ijs tamen ad exactam uictus quantitatem te posse peruenire haudquaquam speres. Nam quantum a quantitate quam consuetudo indicauit, demere oporteat ob morbi, & symptomatum incrementum, exacte non scimus. Ob id igitur prudentissimus Hip. ciborum adiectioni intendendum multo minus ait, &c. In cuius expositione Gal. ita scribit, ad scriptum in quantitate ipsa ad id quod minus est, procedendum esse magis, quam ad id quod exuperat, ubi quis à iusto modo abscedit, nempe quod plus est exuperatque, noxas interdum inemendabiles facit. Verum quod minus est, facile emendatur, nempe si uirtus elabi uideatur cibi exiguum ministrare possumus. Verum si in uentrem absorptus fuerit cibus, quod redundat superfluitque, si alias multo magis in acutis tollere est difficile. In quibus uerbis aperte ostendit cum ab exacta errandum sit quantitate, melius esse, ad id quod minus est accedere. Nam error hic minus lésionis afferet.

C A P. II.

2. derōe
uictus
in acutis.

AT alicui forsitan contrarium uidebitur. Nam id certum est grauioribus egrotantes offensis affici, cum propè statum erratum sit, quam si in morborum principijs quippiam delinquatur. Vt ab Hip. & Gal. scriptum est, illo loco nempe, hoc autem uerius efficaciusque, &c. Cunque inter initia minus quam iustum est offerimus, sic agentes uirtutem imbecilliolem reddemus, ita ut apud morbi statum, omnimodam sustinere ine-

diam non possit. Quare cibum tunc temporis offerre cogemur, quod multo grauius est, quàm si inter initia uberius ægrum reficeremus. Nec putandum est fieri posse, ut minus inter initia quàm iustum est exhibentibus, uirtus ad statum peruenire possit tanto uirium robore, ut totum uigoris tempus omnimoda transire queat inedia. Nam si id possit, non minus quàm quod iustum est exhibuisti, sed quod mediocre, & conueniens erat. Præterea Hip. ipse parè confessus est errorem esse postquam enim de forma uictus sermonem fecisset, de quantitate agens ita scribit. Præterea inquit nō minor est error, nec minus hominem lædit, si quis det, propinè ue, minus tardius ue, quàm satis est, & expediat. Pars enim famis, & inedia, plurimum in hominis natura, & ualentem facere, & infirmum, ac primere, potest. Multa etiam alia mala illis non similia ex plenitudine profiscuntur, quæ non minus etiam grauiæ, & periculosa sunt. Vera ita res habet, grauiorem esse errorem, qui in id quod magis urget addit. Cumque morbus ob eius uehementiam magis urget, pätiorè præbet indicationem, unde minus lædemus minus exhibentes, magis uero plus ministrantes. Nam sic in id quod magis urget addimus. Quod si uirtutis, ob eius imbecillitatem magis simus felicitati, cauendum esse errorem eū, quo uirtus imbecillior reddatur, quare tunc temporis ad id quod magis est accedimus. Dummodo quantitas pro uirtute sit. Morbis autem acutis cum ut plurimum capiuntur iuuenes, aut consistentes, quorum uires ualidæ sunt, minimeque in longum morbus protrahatur ma-

In lib.
de pri-
sea me.

DE VICTV FEBRICIT.

Lib. 2.
de ui-
ctu acu-
torum.

gis urgere morbum, quàm uirtutis imbecillitatem, rationabile est. Quare ad id quod minus est accedemus. magis uerētes, ne plus exhibentes, in id quod magis urget addamus. Recte igitur Hip. dixit ciborum adiectioni intendendum multo minus, magis nos sollicitos esse oportere morbi acuminis, quàm uirtutis docens, præcipue in morbis ijs qui breui terminantur. In quibus saepe numero omnino subtrahere expedit, cum æger sufficere possit donec morbus maturescat. At in libro de prisca medicina, uniuersalē faciens sermonem, utrunq; errorem grauem esse dixit. Ac si æque urgentes uirtutem, & morbum finxisset. Neque ratio quicquam eorum quæ diximus tollit, nam errorem quem prima exhibitione committimus, minus exhibentes, non apud statum corrigimus, sed secunda, aut tertia oblatione emendamus. Quod quia ad opus apprime utile erit, explicabimus. Si Socrati febre continua laboranti, sorbitionem dare decreueris, in primis modum, secundum quem bona ualitudine, cibo, & potu utebatur, inquires iusta quem, sorbitionis quantitatem diffinies. A qua postea iusta morbi incrementum detrahes. Talemque offeres primum quantitatem, ut commode apparare possit, citra additionem uehementiæ, aut durationis accessus febrilis. Quod si ab eo cibo quem primo exhibuisti nullum horum sequatur, ægotansque plus ferre posset, aut uoluisset, parum addes sequenti oblatione, quia quod minus est exhibuisti. Et ita id quod minus est, facile emendatur. Quod si plus exhiberemus quàm ægotantis natura citra lesionem ferre pos-

set, noxam emendari ita facile non est. Errorem quidē hunc, hæc sequūtur, incommoda, nempe grauitas hippocundriorum, frequētia anbelitus, febriles incensiones, sitis, capitis dolores, &c. Hæc omnia in morbis acutis eueniunt ex immodica cibi quantitate, et ex intēpestiua eius oblatione, ut ab Hip. scriptum est in libris de ratione uictus. Nulla ergo alia melior mēsurā dari potest, qua uictus quantitatem diffiniamus, quā sensus ægotantis, qui magis & minus indicat citra errorem. Prima autem oblatione, ut ab ea iudiciū capiamus in posterū, minus quā consuetudo indicat offerri melius esse diximus. Nec hoc est præter senis mentem, qui in eodem de prisca medicina libro, ita ait. Præterea, uaria multo magis est, ac maioris diligentia eget hæc res, mēsurā enim cuiusdam animo considerare oportet. Mensuram dico non quæ pondere, numero uel ullo constet, quā si quis respiciat, quod expediat, exactum uel sit, possit cognoscere. Nihil. n. aliud inuenires quā corporis sensum. Quā ob rē tā exacte rē nouisse uti parū utrinq; erret quis difficillimū est. Tam et si hunc ego medicum ualde laudo, qui paululū in ijs rebus aberret peccet uel. Quod autem exactum & uero proximum est, raro admodum scire & uidere est. Siquidem plurimi medici in ijs mihi similes esse uidentur, prauis nauium rectoribus. Nam cum illi in tranquillitate regendo peccant, errant uel, eorum error non patet, cum autem eos magnus uentus, atq; aduersa tempesta, deprehēdit, liquido iam & aperte cūctis hominibus qui in ea sunt patet, per eorum ignorantiam & errorem peccatum uel

DE VICTU FEBRICIT.

nauem nisi succurratur perditum iri. Sic mali, & pluri
mi medici, cū homines qui nihil graue & periculosum
habēt curātur, si quis in ijs maxime peccet, erret ue, ni
hil admodū graue & periculosum admittat. Nam mul
to plura & sepius leuiuscula hominibus mala fiunt,
quā graua & periculosa. In quibus si peccent, er
rent ue, rudibus et ignaris non patet, cū autē magnum
& uehementem fallacemq; morbū nanciscuntur, tunc
eorum error, & peccatum, arsq; cunctis patet.

C A P. I I I.

SED forsan quis obijciat, ex ijs quæ dicta sunt ap
paret, una uictus forma, nutriendos esse egrotantes, à
morbi initio ad statum usque incedendo. Quantitatem
autem secundum morbi incrementum mutandam. In
ter initia, iusta consuetudinem, uictus quantitatem men
surandam, increfcente uero sensibilibiter morbo, minuen
dam. At uidetur magis ex usu fore egrotantibus, si
semper quantitatem seruemus quam consuetudo indi
cat, formam uero mutemus. Vt si inter initia morbi,
crassa sorbitione egrotantem alere nobis uisum fuerit,
increfcente morbo tenuem offeramus, ea qua usus est
quantitate. Naturam siquidem semper gaudere con
suetis, asseruit Galenus ex auctoritate Hipp. Præter
ea hoc idem in Aphorismis sentire uidetur, cum ait
ἐμπροσθεν δὲ ἡπιωτέρας διαίτης ὥς, ἀπὸ ἐξαρτίας ἢ νοσήσας hoc est,
ante uero uberius reficiendum, ut sufficiat egrotans,
per illud uerbunt *ἡπιωτέρας διαίτης* non quantitatem, sed
uictus formam intellexit. Præterea in loco quem cita
sti, non magis quātitatem mutandam esse docet, quā

8. de me
thodo
meden
di.

In 1. de
uictu a
ctorū.

formam, cum ait. Neque multam, neque crassam dare oportet. Sicut enim multitudo ad quantitatem attinet, sic crassities, & tenuitas, formam uictus respiciunt. Verum ubi ut quicquam asseras, deest recta ratio, dicta insequere antiquissimi iuri Hipp. qui multorum sapientum unus instar est. A quo didicimus uictus formam, à morbi initio ad statum non permutandam esse. Sed quo in loco forsan quæres. Ex libro de uictu acutorum secundo. Cum de permutationibus agit colliges. Aper- tius tamen à Gal. duobus in locis nempe in expositione illius conijcere autem oportet robur & morbi &c. Vbi ita scribit, nempe summa quam adstruit est, non permutandam esse uictus speciem, priusquam signa coctionis manifesta sint. Id autem fiet, si quot diebus ad uigorem morbus uenturus sit, præcognoueris. In quibus uerbis manifestè ostendit à morbi initio ad statum introitum una uictus forma nutriendos esse egrotantes. Alia uero, toto eo tempore quo durat status ad perfectam morbi solutionem. Demum alia per totum conualescentiæ tempus ad sanitatis habitum. In singulis harum quattuor conditionum, non faciendas esse insignes uictuum permutationes de una uictus forma in aliam priusquam, ad aliam conditionem peruertum sit. Idem præterea in eodem secundo, ita scribit in expositione illius interdum autem & cruda &c. Vniuersa hæc contingere ijs ait, qui perperam cibati sunt à medicis, quicumque primis diebus exoluentes laborantes, sanè circa tertium, uel quartum, uel quintum, uel sextum, repente ad edulia permutauerunt, nondum morbi

DE VICTU FEBRICIT.

uigore peractō, quasi peractō, conuenienter eos permu-
tasse uictum dicat. Quod igitur dicebat quod permu-
tare quidem oportet uictum sanorum in morbis, non
quidem ut sorte euenit illud agendum, iam puto mani-
festum ex dictis esse. Existente enim constitutione cor-
poris una cum sanitas adest altera à morbi principio
usque ad statum, alia ad perfectam solutionem, & post
hanc alia quæ conualescentiæ tempus ad usque sani-
tatis habitum occupat. In nulla harum quattuor con-
stitutionum facere oportet magnas uictus mutationes,
antequam in aliam constitutionis speciem peruentum
fit. Qui igitur ægros morborum exordijs in omni cibo-
rum abstinentia seruant, si ad uigorem usque talem
uictus speciem seruare possent, nemo eos culpauerit.
Quod si facere non possunt &c. Idem dixit in eodem
in expositione illius de mutatione quæ in hæc uel illa
fit, plurima sum locutus &c. Rursus sermonem totum
in summam unam coegit Hipp. In ijs qui similiter ha-
bent uictum haudquaquam permutare percipiens, ue-
rum in ijs qui ex sanitate ad morbum transeunt, permu-
tare quidem, non tamen ut ceteri permutant, deinde
compendio quodam uictus scopum in acutis morbis de-
clarauit. Siquidem morbus maturuerit transeundum
ad cremorem ptisane præcipit. Si adhuc crudus fuerit
nō transeundū, nisi ob aliquod symptoma. Hæc sunt loca
ex quibus colligo in constitutione una, prout est à mor-
bi initio, ad statum usque, non permutandum esse ui-
ctus speciem. Quod si iam dictis illud Hip. adiungas,
non igitur intempestiue neque fortes uasorum inanitio

In 2. de
uictu æ-
curorū.

nes moliri, neque cum morbi uigent, cibum dare, neque repente huc, uel illuc, in toto negotio quicquam mutare licet, manifestum erit quod si eadem uictus forma, et eadem quantitate, per morbi initium & incrementum uteremur, apud statum uero cibum omnino prohiberemus, aegrotantes ex repentina uictus mutatione laderemus. Item rationi consonum est, ut cum paroxysmorum incrementa, & longiores durationes minus temporis quiescere laborantes permittunt, magis tenui uictu nutriendos fore. Cumque uictus species secundum antiquorum mentem mutanda non sit, durante eadem morbi constitutione, reliquum est ut quantitates imminuamus, prout morbus incrementum accepit. Id etiam ab Hip. licet colligere in primo de uictu acutorum, nam stante eadem morbi constitutione, cum alimoniam addere intendit, & uirtutem roborare, uictus formam seruat immutatam, quantitatem augendam precipit. Ut in eo, at si os madescat, & quae à pulmone expuuntur talia sint qualia esse oportet, sorbitionis quantitatem ut summam dicam augere conuenit. Et infra statim, & quanto maior fuerit expurgatio, tanto magis ad iudicationem usque dare oportet. Eccontrario igitur à morbi initio per totum incrementum ad statum, cum minus nutrire egrotantem intendamus, uictus specie manente, quantitate imminuamus, prout morbus manifesta habuerit incrementa. Minusque naturam huiusmodi ladi posse mutatione, quam si formam uictus immutaremus. Consuetudo enim magis formam uictus et eius qualitatem respicit, quam quantitatem. Et ob id difficilius fert natura, si assuetam

DE VICTV FEBRICIT.

uictus formā, & qualitatem immutes, si uero ab assue-
ta detrahas quantitate, non adeo. Ob id stante eadem
morbi constitutione, ut minor fiat mutatio, quantitas
mutanda est, forma autē uictus seruanda. Nec præte-
reundum esse, etatem, regionē, coindicatrices quātitati-
tis esse, præterea numeri multiplicationis prohibitio.
Hæc enim maiorem indicant quantitatem, ut si puero
multoties adere assueto, si propter morbum toties minu-
strare cibum non possimus, quod à numero deest, id quā-
titate ipsa supplebimus. Vt scite à Gal. scriptum est.
In expositione illius quibus semel, aut bis &c. Vbi ita
scribit, si uero accessiones non permiserint, neq; alimen-
ti offerendi occasiones fuerint multæ. Raro plura dabi-
mus. Vnde quidam male hunc uertit locū, in hunc mo-
dum neque multi alimenti offerēdi occasiones fuerint.
Hiems multum exhibendum esse indicat. Consimiliter
& regio frigida. Sed hæc ad imminuendā uictus quā-
tatem, quā consuetudo indicat, uires habent. Minime
ad augendā. Ab ijs ergo uictus quātitas diffiniēda est.

C A P. I I I I.

SED easdem numerus habet considerationes, nā
à consuetudine in primis, & à morbi dispositione obla-
tionis numerum scito sumendum esse. Vt scriptum est
ab Hipp. in hæc uerba, qui enim bis cibari sunt soliti,
bis ptisanam dare oportet, quibus semel, semel quidem
primo die detur &c. Ab hoc numero quem consuetudo
indicat, quæ à morbo sumitur indicatio detrahit. Nam
principia, & incrementa, & status, accessionum, ali-
quando numerum oblationis consuetum seruare præ-

r. de ra-
tione ui-
ctus.

hibent. Virtus autem corporis plerunque super addit, cum imbecilles sunt, aut cum eum ministrans cibum, qui parum nutriat, & uolumus ut roboretur natura, numerum tunc cibationis addimus, si per morbum liceat. Ut si febre continua laboret is qui multo cibo bona utebatur ualitudine, uisumq; nobis sit huic ptisanā exhibere ob aliquas causas, cum ultra eam quantitatem quam consuetudo præstitit exhibere nō liceat uice una numerum oblationis addere studebimus, ob id quod hic multo indiget nutrimento, parumq; alimenti ptisana suppeditat. Hoc uidetur intellexisse Hipp. eodem primo libro, in hæc uerba. Quibus semel, semel quidem primo die detur, deinde sensim, paulatim, si fieri potest, ijs quoque detur, si quid putas adiiciendum. Infirmum igitur toties nutriemus quoties consuetudo indicauerit, nisi aut facultas crebrius, aut morbus rarius indicauerint. Consuetudo igitur primam quantitatem siue maximam, et primum numerum, penesquē aliquando rarius, quandoque crebrius, ægrotantibus cibum ministrare dicimus, proponit. Huic aut uirtus addit, aut morbus minuit, scite ergo Hipp, in Aphorismis dixit, quibus semel, aut bis, aut plura, dandum est aliquid tempori, etati, et consuetudini, neque igitur quantitas uictus, nec oblationis numerus, inueniri posset si à consuetudine indicationem tollas.

CAP. V.

QUALITATEM cibi multa indicant, nempe morbus, naturæ ægrotantis, etas, consuetudo regio, anni tempus, & cæli status, in morbi appellatio-

DE VICTV FEBRICIT.

ne, morbum & eius causam intellige. Natura egrotantis, ætas, & consuetudo similia semper indicant. Cæli Status, regio, & anni tēpus, si tēperata sint, similia, sin intēperata, contraria indicant, qualitate uictū. Ut si calida immoderate sint, uictū frigidū exposcunt. Quod si temperata fuerint, uictum medium indicant. Non sic profecto laborantis temperatura, ætas, et consuetudo, semper enim hæc similia siue commoderata sint, aut non indicant. Cunque ea iam dicta in unum consentiunt cum morbo, eum esse exhibendum uictum, qui qualitate insigni morbo aduersetur. Vtpote omnibus indicationibus id dictantibus. Cunque contraria indicent, à potioribus sumendam esse indicationē qualitatis uictus. Ut si morbus frigidum & humidum indicet, cætera uero omnia calidum & siccum, ambiguitas, utique pugnaq; indicationum inter se oritur. Quo casu magnopere opus est, tum numerum indicationum tum earum magnitudinē simul conferas. Quippe quæ a febre sumitur, ea reliquis quando omnes contrarium faciendum perscribunt, numero quidem inferior est magnitudine tamen quæ ex dignitate potestate uel spectatur, utique superior est. Potissimum, si longe a natura recessit. Prout quidem febris est, plus cæteris omnibus sollicitos nos habet. Et quia præterquam quod febris est, etiam magnitudo illi notabilis accessit, ideo contrarias indicationes inducit atq; obumbrat. Sin febris parua fuerit, fas est reliquas omnes una coniunctas cum ea conferri atque expendi. Ac siquidem paræ uidentur, neque febris indicatio præferetur, sic ut humectandum

humectandum, et refrigerandum sit, neque etiam reliquorum, sic ut califaciendum, & siccandum sit. Immo media uictus ratio ubi ita se corpus habet eligenda erit. Sin altera indicatio exuperet, tantum recessisse à temperato, & medio uictu par est, quantum ea, quæ pollent sua contraria superant. Ergo exercitatum & natura prudentem esse medicum cōueniet, quo cuiusq; indicationis potestate diligēter cōsiderata, omnibusq; inter se collatis unam idonei uictus summam, quæ laboranti sit commoda comparet. Hactenus Gal. cū de qualitate uictus inuestiganda sermonem facit. Sed non deerit qui in hunc modum dictis Galeni opponat, haudquaquam sperans hac methodo qualitatis uictus scientiā se inuenire posse. Ponamusq; ut ipse proposuit omnia indicantia, uictum suadere calidum, & siccum. Febris uero leuiuscula tertiana sit, uictū qualitate frigidum, & humidū indicans. Coniungantur ut ille ait omnes indicationes, & cum febre eas cōferamus, et expendamus, an pares sint morbo, aut impares. Vnde nā hoc mihi notum erit rogabit quis. Nam nec id se scire ait, nec unde sciat. Multo adhuc minus, si alterū exuperet, quantum utique alterum excedat. Prætera cū indicationes regionis, tēporis anni, cœli status ad inuicem dissentiant, utrū eorum superare debeat. Propriū insuper ægrotantis temperamentum, si forte consuetudinis obuiauerit, quomodo ijs similes qualitate uictus ministrare possit. Oportuisset methodum tradere qua uires horum singulorum nosci possent. Nos igitur pro uirili tentabimus in commodum studiosorum, uia

8. de metho.
medēdi.

DE VICTV FEBRICIT.

In 2. de
ratione
uictus.

ostendere, qua facile qualitatem uictus inuenire possi-
mus. Ab ijs, quæ ab Hip. et Gal. didicimus initium hinc
sumentes, consuetudinis indicationem potestate dignio-
rè esse proprij temperamentij, et ætatis. Nā si quispiam
sit siccus temperamento, ætate consistens, humido assue-
tus uictu. Siccū ne ei dabis, ratione proprij tēperamen-
ti, & ætatis, An consuetudinē magis seruabis. Quod si
hæsitas Hip. roga, qui ita scribit, cibos quibus uti cōsue-
uerunt, facile ferunt, tam & si natura haut quaquam
boni fuerint, similiter & potus. Cibos uero quibus uti
non consueuerunt, et si mali nō fuerint moleste ferūt,
consimili modo, et potus. In quorum expositione Gal.
ita ait, cōsuetudo maxime potest, repentinaque ab ea
digressio, corporū nō parò offendit. Ipse idē loco supra
citato ita scribit, à consuetudine inquit semper est indi-
catio similium, quo ad scilicet ægrotant homines, ab æta-
te, natura, regione, anni tempore, statu cæli, ubi tempe-
rata sunt, similitum semper præsidiorum est indicatio,
siue ualeant homines, siue ægrotant. Contra ab intem-
perati, anni tempore, statu cæli, & regione, cōtrario-
rum est indicatio. Caterū ab ætate, natura, subintelli-
ge intemperatis non absolute, sed cū consuetudine. Au-
disti Gal. dicentem, naturam ægrotantis, & ætatem cū
intemperata sunt nihil absolute indicare, sed cū consue-
tudine. Duo igitur hæc, ægrotantis natura, & ætas, cū
intemperata sunt ad unius consuetudinis indicationē
reducimus. Præterea regio, & anni tēpus, ad cæli sta-
tum si res exacta consideretur, reducibilia sunt. Nam
nec regio, nec anni tempus, quicquā agent nisi per im-

mutationem aeris nos cōtinētis dispositionis, aut si maioris temperiei, quā cēli statum medici uocat. Quod si ad huius assertionem Hip. aut Gal. testimonium optas prout sunt plures studiosorum nostra tempestate, apud quos paruum habent rationes locum, plurimū auctoritates, tātum iuuat alieno Marte ditescere. Gal. igitur in libro nono de methodo medendi ita scribit, uoco inquit cēli statim ipsam ambientis nos aeris temperiem, sub qua, & anni tempus, & regio comprehenduntur, quando horum quoque utrunque ex ambientis temperie indicationem mutuatur. Ex dictis manifestum est omnes indicationes qualitatis uictus, ad tres reduci posse. Nēpe morbum, consuetudinē, & aeris temperiem.

CAP. VI.

CAETERVM cum morbus in affectum, & in eius causam, diuiserimus, inquirendum est, an uictus qualitas utrunque nempe affectum, & causam respicere debeat, an solum eorum alterum, & sunt in libris Hip. non nulla loca utrunque asserentia. Nam affectū, Aphorismus ille humida diēta &c. ostendit. Quodq; & causam respicere debeat, ipse idē in libro primo de ratione uictus, de ptisana sermonem faciens ostendit. Ita scribens si quid abluī eget probe abluit, non astringit, hæc omnia causam respicere manifestū est. Ratio tamē aliud dicit, nā cū duo sint quæ in medici cōsiderationē subeāt, nēpe corpus febricitās, et humores putridi. Ita duo sunt instrumenta, illorū gratia, quorū altero corpus seruamus, et altero putridos humores extra pellimus. Uictus quidem corpus respicit, et id quod ab eo

DE VICTU FEBRICIT.

effluxum est, tum si ratione morbi corpus intemperatum est, id contrarijs emendat qualitatibus, paulatim id agēs. Respicere humores medicaminū est, ut crassos extenuet, lentos detergeāt, putridos expellāt. Victus igitur munus est id quod à patiente particula effluxum est instaurare, & id quod alteratum est reducere. Hec solum euenire corporis partibus simplicibus possunt. Verum ad illud quod dixit Hip. si quid ablui eget, probe abluit, ipse statim illo uerbo si quid ablui eget, respondet, id tanquam non necessarium euenire inueniens quid Gal. afferit cum ait, si quid ablui egeat, quasi nō omnibus acutis morbis probe abluente edulio utamur. Nēpe cætera omnia, quæ de ptisana dicuntur bonā morbis omnino profunt acutis. Sed abluēdi bonitas quibus uentrē subduci nolumus, ubi cibus in uia moratur est idonea. Probe igitur abluere febrili affectioni, neque tanquam contrarium, neque tanquam familiare auxilium unum utile existit, sed bene tanquam symptomaticis alicuius emendatorium correctoriumque. Mentem adhibe ad illud uerbum febrili affectioni, ac si uelit, uictum, febrilem affectionem, & non causam, respicere oportere. Quod si accidat ut uictus utriusque aduersetur, & affectui, & causæ, ob id reiiciendus non est. Cū ergo uictus id solum quod à corpore exolutum est reponere, aut id quod alteratum à morbo est, reducere debeat, manifestum est, cibus astringentibus utendum non esse, nisi, cū morbus ad eam corpus alterarit dispositionē, à qua aut uētris fluxus, aut uteri, aut alterius momentanea partis, aut symptomatici sudores robur,

uirtutis exoluentes, aut animi deliquium, proueniant. Alioquin non est quod corpus moderate habens in raritate, & densitate cibo astringente obstruas. Proinde cum aeris nos continētis tēperies nihil indicet nisi pro ut nostrū afficit corpus, tantumque indicationis sortiat, quātum corpus ab illo mutatur, manifestū etiā est, indicationem continentis nos aeris ab ea sumendā esse immutatione qua nostra afficit corpora. Consimiliter de morbosa sentiendū est affectione, nam tantū indicabit quantū corpus à naturali mutauerit symmetria, licet febris in sua causa magna esse uideatur. Parrūq; si corpus à proprio ammouerit tēperamēto, parū indicabit iuxta recessus magnitudinē. Duo igitur indicatīa, nempe aeris nos cōtinētis tēperies, & aegritudinalis affectio, ad corpus reducuntur affectum. Neque ulli mirum id uideri debet, quod ambiētis indicationē ad præsentem corporis affectum reducamus. Nam iure id mirum uideri non debet, quod rationi peruium est. Pone affectum, & ambientem utrunque calidū, & sic cum. Corpus utiq; affectum tale est, non solū propter morbosam affectionem, sed ab ambientis calidi, et sicci operationem. Vtriusque igitur operatio affectum corporis præsentem produxere. At pone ambientem frigidum, & humidum affectioni contrarium, corpus profecto affectum, non tale est ob solam morbosam affectionem, ob quam magis tale esset, sed ob ambientis etiam qualitatem affectioni contrariam, eius uim refragentē. Neque, quæ dicta sunt præter mentē Gal. esse putes. Ille enim in libris de methodo medendi am-

DE VICTV FEBRICIT.

bientis indicatio ad præsentem affectum, quem morbi nominat, reducit. Cum ex tribus indicantibus, quorum tertium ambiens erat, duo collegit indicantia. Ad duas igitur indicationes in uniuersum omnes quæ uictus qualitatem indicant reduximus. Nempe corpus affectu & consuetudo. Ab ijs igitur qualitas uictus querenda est. Verum cum hæc consideratio medicæ artis parti, quæ morbos curat subiaceat, necessum est recessus corporis à naturali temperamento scire, ut cōtrarium applicantes qualitate uictum, ad symmetriā particulam reuocamus. Recessum uero nisi naturale nouerimus temperamentum, alia sciri uia nō potest. Quapropter alia præter duas indicatione naturali nempe temperie opus est. Quibus autem notis id inueniri possit medico considerandum est. Proinde cum omnibus in unum collatis temperamentorum signis coniectura et non scientia assequamur, ab una consuetudine id certius sciri posse cum Gal. asserimus. Qui ita scribit, nos certe quibus cura fuit, inquirendi illud inuenimus quod per plures cognitu difficiles notas. Cuiusque membri, temperamentum coniectura potius, quam scientia inuenitur. Si igitur notis multis & paruis aliqua certior apparuerit, nonne abiectis illis, hanc pro omnibus arripiemus, nemo id arbitror qui mentis compos est, negabit. Atqui si omnes temperamentorum notas in unū colligas, hæc longissime absunt, ut parè ei quæ consuetudo præstat fidè faciant.

CAP. VII.

VERVM quia in cognoscendo ægrotantis à proprio temperamento recessum. Duplex datur considera-

tio. Nempe generatim scire uersus quam qualitatem
 corpus alteratum sit, secundo quantitatem illius decli-
 nationis, hanc nō ualde speculationi huic de ratione ui-
 ctus necessariam. Nam particula intemperiem semel
 à suo contrario euertere in ratione ciborum nō est, sed
 medicaminum. Sat enim est si cibus paulatim bono tem-
 poris interuallo id agat, id autem cōtrario remisso effi-
 ci potest. Quam ob rem, & si corpus à naturali absces-
 serit symmetria, per duos gradus uersus calorē, neces-
 sariam non est, nec ut opinor commodum frigidū, huic
 totidem gradibus uictum offerre. Id enim cibi naturā
 egrederetur, hæc est ut à naturali calido patiatur, pa-
 rum autem in id agat. Vt cibo medicinali usu uenit.
 Quapropter satis sit si frigidum in primo uictum offe-
 ramus. Hic enim cibi munus ad implebit, facultatē ue-
 ro medicaminis, tēporis interuallo crebriori usu præsta-
 bit. Vnde fit, ut cū cibus ea miscere quæ ualentibus sint
 prædicta qualitatibus cauendum sit. Id solum ergo sci-
 re cōuenit ad quod extremum alteratū sit corpus. An
 uersus calidum & siccum, an frigidū & humidum, &
 an parum, aut multū à naturali symmetria recesserit,
 quod haud difficulter inuenies, si considerationem de
 consuetudine habeas. In ijs quibus usus est bona ualitu-
 dine, citra noxam, & ex ijs quibus usus uidebatur. Ex
 ijs enim temperamētum corporis, certius alia quacūq;
 nota cognosces. Vt prudētissime Gal. citato libr. dixit.
 Videtur, inquit, non sicut alia quædā exigua, leuēq;
 sed planē maximā, maximeq; principalem potestatem
 habere consuetudinem, ut quæ singulorum corporum

DE VICTV FEBRICIT.

naturam ostēdat. Et statim inquit, sanè ipsi uia rationeque ab ea procedentes, fatemur ncs partiū affectum inuenire. Deinde ex illo rursus ad faciendorum indicationem uenire. In hocque pars hæc, quæ de uictus qualitate agit, ab ea medicæ artis parte, quæ singularum, aut simplicium partiū morbos curat differt, quod hæc quantitatem recessus à naturali temperie nosse desiderat, ut equali contraria gradu applicet remedia. Illa uero solum querit uersus quam qualitatem intemperatum sit corpus, & an multum, an parum recesserit.

C A P. VIII.

ATRIBVS igitur qualitas uictus summitur, à naturali temperamento, & ab affectione, & à consuetudine, cunque hæc in unum consentiant, quod simul indicauerint statim exhibendum. At contraria indicare solum affectum, & consuetudinem posse. Nam naturale temperamentum semper cum affectu in indicatione qualitatis uictus consentit. Nam affectus indicat sui ablationem per quam ad temperamentū pristinum ægotans reducitur. Huic indicationi naturalis ægotantis temperies semper consentit. Duo sunt igitur, quæ contraria indicare possunt, nempe affectus & consuetudo. Vt si affectus calidus, & siccus humidum exposcat uictum, consuetudo uero prohibeat (nam calidis, & siccis assuetus erat cibus) in hac indicationis contrarietate inquirendū est, an calidis, & siccis assuetus esset, ob id quod male ex frigidorum usu, aut quia melius calidis, & siccis quàm à frigidis, et humidis haberet, aut à frigidis, & humidis nihil incōmodi perci-

piens. Si primum contingat, eo esse utendum uictu, qui temperatus sit, aut id mixtis adinuicem contrariarum qualitatum alimentis conficiendum. Siquidem dum sanus erat calidis & siccis opus sibi erat cibarijs, ut incul pate uiueret, febre correptum, calidum & siccum iam effectum, frigidis, & humidis laedes. Aut nunc aut cum febris abierit. Nam id praestitit affectus quod calidis & siccis cibarijs querebat. Quapropter si tunc iustè ea, quae calfaciebant, & exiccabant amplectebatur, nō est cur nunc caliditatem & siccitatem affectus, frigidis & humidis euertas. Nisi multum exuperent. quod si contingat uictu medio utendum est quo excessus securissime refranguntur. Quod si secundum eueniat, dandum esse aliquid consuetudini, minus tamen quàm in praedicto. Eo utentes uictu qui refrigerare & humectare moderate ualeat. Liberalius id agere licet si tertium contingat, parum consuetudinem illam facientes. Ad tria igitur omnes reduximus indicationes, nempe regionē & tēpus anni non agere nisi status cœli interuentu. Hic autem nihil indicat ex se, sed inquantum corpus afficit. In uno igitur affectu corporis, regionis, anni temporis, status cœli, & morbi, temperamenti egrotantis, ætatisq; uires siue actiones, potestate sunt, & id quod tandem ab eorum actionibus, & re actionibus, & alterius, supra alterum exuperantia superest, in uno affecto corpore conspicitur. Non est igitur quod medicus in æstimandis horum cum contraria indicant uiribus, mentem inaniter agitet. Id enim quod ab exactissima consideratione elici posset, corpus affe-

Etum indicat. Diximusq; etatem ad proprium reduci temperamentum, cuius ope scimus an parum, aut multum, à naturali recesserit corpus symmetria. Ad opus præstat id commodi, ut sciamus quando maxime finem alteranti uictui imponemus. Ceterum in indicatione qualitatis uictus cum affectu consentit. Nam si quispiã sit calidus natura, calidiorq; ob ægritudinem euaserit, affectus indicat, ut id caliditatis quod super excreuit abscindatur. Idem proprium indicat temperamentum. Et non calidum potestate uictum, ob id quod ante natura calidus erat. Sola igitur illius gratia, corporis temperatura à medico inuestiganda est, ut an parum an multum, à naturali recesserit corpus symmetria, & quando maxime alteranti uictui finem imponemus sciamus. Sola igitur consuetudo est, quæ aliquando dissentit affectui. Tuncq; diuisionem illam quam supra triplicem fecimus inquirere ab ægrotante, & ab ijs qui hominem multo ante nouerunt oportet. At cum omnes tres in unum consentiunt, cum humidus natura, et humido uictus assuetus, febre corripiatur, audacter frigido & humido uictu utetur. Nonne hæc sunt senis uerba humidi uictus omnibus febricitantibus conueniunt, maxime pueris, & alijs sic assuetis refici. Sunt tamẽ febres quæ non humidum, sed siccum indicant uictum, de quibus infra nobis sermo erit ubi mentem Hip. in dicto Aphor. ostendemus. Nunc ad reliqua properemus.

C A P. IX.

A duobus sumitur quãdo exhibere cibum debeamus à facultate & à morbo non prohibente. Prohibet ab

initijs paroxysmorum, aut exacerbationum ad manifestam inclinationem. Iis enim temporibus natiuo calore ad thoracē collecto, ut morbi causam unicat, cibis dandus non est, quanquam corpus iam iam indigere uideatur, cū Gal. asserimus de ratione uictus in acutis. Opportunum igitur exhibendi uictus tempus fuerit, cum caliditas ad pedes descenderit, uiscera iam deferens, ut ab Hip. scriptum est, uerum si facultas nimis langueat, ita ut imbecillitas eius maxime urgeat indiscrete quolibet tempore nutriemus ægrum. Et in statu totius morbi, ut scripsit Gal. in Aphor. Cunque in declinatione accessionis dare expedit, non ea statim uictum forma, quā ægrotanti definieris exhibebis, sed magis tenuem, ut si sorbitionibus ægrotantem alere decreueris, satis sit si potiunculam, inchoante inclinatione, ministraueris. Postmodum aut febre cessante, aut omnino remittente, sorbitionem exhibeto. Quem modum uidi à peritis medicis obseruari in Italia. Quibus enim ægrotantibus sorbitionem ex pane & iure pulli quam panatellā uocāt, ministrare decernunt, hos primo in inclinatione febris tenui pulli iure nutriūt. Ac postmodum cessante febre, aut manifestē remittēte, sorbitionē exhibēt. Hoc ut arbitror sensit Hip. cum in fine primi de ratione uictus immediate dixisset, cū calor ad pedes descenderit, tunc dare expedit, subiungit statim. Vtere primum & maxime cremore, postea ptisana, secundum perscriptas coniecturas exacte speculatus. Quæ quidē uerba, & si Gal. ad uictum uniuersalem referat, de particulari cibatione eadem possē recte intelligi asserimus. Vt talem

In fine
primi
deratio
ne ui-
ctus idē
dixit in
4. eius-
dem.

faciant sensum, quod si sorbitionibus ægrotantem nutrire debeamus, melius esse inclinante febre à tenui sorbitione, ut cremore ptisanæ incipere. Ne ab unius diei inedia ad crassiusculum cibum mutatione subita, lædatur ægrotantis natura. Quod autem scribit secundum per scriptas coniecturas, hunc sensum habet. Quibuscumq; coniectura habita de morbi constitutione & ægrotantis robore, dandam fore sorbitionem decreueris, hanc non in initijs, neque incrementis accessionum exhibeto, sed in declinatione. In qua commodius ages si primum cremore usus fueris, deinde ptisana. Cæterum in continentibus febribus, quæ unicam à principio ad finem accessionem habent, nutriendi idoneum tēpus, à consuetudine, & à facili toleratione accipitur. Ut si in auroa facilius æger malum tolerat, eodemq; tempore cibari solitus est, commodissime ea hora cibum ægrotanti ministrabimus. Hoc discimus a Gal. undecimo de methodo in hæc uerba. Tempus uero nutriendi quod quidem ad reliquas spectat febres, quæ ex putredine oriuntur, in progressu sermonis dicemus. Quæ uero unicam à principio suo ad finem habent accessionem (de his namque præsens sermo est) in his facilis toleratio, & consuetudo spectari debebunt. Quando cibus illis eo tempore est offerendus quo facilius quàm in cæteris morbum tolerant. Eoq; potissimum diei tempore quo prius cibari sunt sueti. Etenim facillime cibum ferent si ex his, considerationibus assument. Hucusque Gal. Cæterum scire oportet quod aliquando consuetudo & facilis toleratio, in indicatione temporis dissentiunt, ut si

is qui ægrotat eorum sit, qui semel cibum solent capere occumbente sole. Morbum uero facile toleret æger initio diei. Pugna inter indicantia oritur, quo casu indicatio à facili toleratione præualet ei, quæ a consuetudine. Nec præter rationem, nam si bis, aut ter cibum bonæ ualitudine capere assueto ægrotanti, propter febriles accessiones, semel ministramus, ob timorem ne cibus intempestiue exhibitus, aut in uehementiam febrilem, aut in eius addat durationem, ut in superioribus ostendimus, multo cautius in synochis, quæ acutiores multo sunt febribus prohibendus est, ea hora cibus quæ plus ledere potest, eaq; maxime ministrandus, cū ab eo corporis natura capiat cōmodius usum, minusq; prompte in morbi causam transeat. Quod si facilior toleratio manifesta non detur, à sola consuetudine incontinentibus febribus tempus nutriendi idoneum sumendum est. Porro aptissimum in febribus, quæ intermittunt & repetunt, tempus est, cū uti dictum est, exhalare iam cæperit febrilis calor, huius quoq; opportuno tempore ex duplici coniectato respectu, nempe summo præcedentis accessionis uigore, et futura principio. Ad hæc nam spectantes, operā dabimus, ut quàm longissime ab utroque nutriamus. Ergo si spatium quod inter summū prioris accessionis uigorem, & sequentis principium interuenit, satis sit amplum, facile est idoneum tempus inuenire, sin exiguum id fuerit, alterum facias necesse est, ut aut ægrum admodum adhuc calentem nutrias, aut sequentis accessionis inuasiōe iam iam affutura. At summi uigoris & accessionis principij morem sic consideres

DE VICTV FEBRICIT.

censeo. In summo uigore notabis an circa magnitudinē febrilis caloris siccus sit & squallens, an citra siccitatē urens. Priorem nanque humectante uictu madefacere quā primum oportet. In secundo dum plurimum caloris se remittat, manere. In principij uero accessionis more aestimabis, an corporis extrema perfrigeret, et magnam sanguinis reuocationem ad interiora corporis faciat, an omnino corpus non premat. Quippe secundum hoc, ceu facile cōtemnet. In priore distinguas oportet. Nam si absque uisceris phlegmone, aut succorū redundantia, motus ad interiora accessionibus pollet, nihil offensus paulo ante cibans. Sin uel phlegmone, uel redundantia subsit, cauenda est ante accessionem cibatio, seu res maxime noxia. Hæc quidem Gal. scripsit de tēpore quando opportune in febribus æger cibetur cum exiguum fuerit tempus quod inter summū prioris accessionis uigorem, & sequentis principium interuenit. Vt si ponamus a summo uigore ad sequentem accessionem trium horarum spatium esse, an prima cibare febricitantem hora, commodius sit quā secunda, hinc maxime disces. Cibus ideo febricitantibus exhibemus ut eo uirtutē seruemus, cauentes quo ad fieri possit ne in uebementiam morbi, aut eius durationem addamus. Virtus ab eo cibo usum capit quem coquit & apparat. Melius autem apparabit cum à febrili labore quietior fuerit laborantis natura. Verū facultas naturalis que cibum coquit, quietior est in paroxysmi inclinatione, quā in initio accessionis, ut ab ipso Gal. secūdo Aph. scriptū est in hac uerba, In uigore eo quod iam coquit

superfluum euacuare . Tum propter alia, & quia animalis facultas omnino in statu laborat, licet maxime secundum illud tempus uitalis & naturalis fortes persistant . Ab initio igitur paroxysmi naturalis facultas quæ concoquit maxime ad statum usque fatigatur, ab statu uero inclinationē uersus, fortis ut ille ait permanet. Quare hac ratione cōmodius est inchoante inclinatione cibū exhibere quàm propè accessionē. His adde cibū si quando eum in uentriculo sequens accessio offendat corrūpi ut in pluribus certum esse, Paucis uero omnino quibus inchoante inclinatione exhibetur illud accidere. Quare siue in iocineris phlegmoni, aut uentriculi, aut pulmonis, siue ephimera, aut putrida febre quauis natura, & habitu, salubrius esse parum post uigore cibare, quàm modicū ante sequentē accessionem. Hoc in singulis morbis naturis & habitibus ostendere haud magnū negocium est. Verum id studioso lectori demittere cōmodius erit. Sat nobis est, qui Hip. dogmata insequimur, eius sententiæ stare in primo de ratione mētus ubi scripsit . Nam si pedes frigidi fuerint non a sorbitione modo uerum quoque & maxime à potu temperandum. Item quarto eiusdem cum dixit frigentibus ergo pedibus neque potum, neque sorbitionem, neque aliud quippiam huiusmodi dabis, sed maximum existimato si id tantisper obseruaueris, donec ualde incaluerint, deinde ita quod confert exhibe. Frigiditas siquidem pedum parte plurima febris accessura signum existit, quo tempore siquid porrigas maxime prorsus peccabis, nempe morbum non parum augebis. At uero

cum febris desierit, contrario modo pedes reliquo corpore calidiores sunt. Idem infra, nempe cum pedes frigidi fuerint, uenter de necessitate calet fastiditq; cibum, intenditur hyppocundrium, iactatur propter internam turbationem corpus, mens fixa non est, dolet aeger, lancinatur, uellicaturq; , uomere affectat, & si mala uomuerit dolet. Ergo cū calor ad pedes descēderit, curritq; urina, & si non sudet, omnia cessant, quo tempore sorbitionem dare expedit, nam alias pernitiosa existit. Hæc quidē Hip. scripsit incōmoda euenire ijs qui in initijs accessionū cibantur. Sitq; à nobis in præsentī definitum, quod cū ob breuitatem temporis à uigore præcedente ad sequentem accessionem, alterum duorum sequi sit necesse, aut ægrum ut adhuc calentē nutriamus, aut sequentis accessionis inuasiōe iam iam affutura, consultius esse primum, ut sanum magis eligere, in omni morbo, in omni natura, & in omni habitu. In qua sententia Hip. esse certum est libro de ratione uictus in eo loco qui ita incipit, cum autem purgaueris sorbitionibus quibusdam utitor. Caterum cum spatium inter summum prioris accessionis uigorem & sequentis principium interuenit, adeo amplum, ut satis sit ad binas cibi oblationes, offeremus semel quidem, resoluta omnino priori accessione, iterumque sequenti nondum incipienti. Temporis autem inter secundam oblationem & sequentem accessionem quidam quattuor horas sat esse putarunt. Idq; forsā ex Gal. octauo de methodo fiunt, ubi asserit. Abunde esse si tres æquinoctiales horas quattuor uel inter balneum, accessio-

sionisque tempus inter ponantur (à balneo enim semper ægrotantibus cibum ministrabat .) Verum in præsentī citra disputationem, non satis esse, si tres quattuorve horæ inter cibum, et sequentē accessionem inter sint arbitror . Nam intra limites dispositionis ad futuram accessionem, naturam alio intentam ciborum coctioni segniter atque imbecilliter uacare putandum est. Quæ causa est, ut diutius eo tempore cibus in uentriculis laborantium immoretur, Quapropter ijs qui ab humore putrido à febre detinentur, si quando ante accessionem cibum sint capturi, septem horarum intervallum ad sequētis accessionis initium, necessarium esse, ut cibus in uentriculis eorum decenter coquatur, & ad inferiores partes, descendat, iuxta sententiam baly medici arbitramur . Nec Gal. huic contrarius est opinioni, Nam si ea quæ parum ultra eum quem citarunt locum scripsit, legant, ita dicentem audient . Tempestiuum inquit est iam, ut ad ea quæ post balneum adhibentur accedamus. Sunt autem ea minime multa . Nam præter aquam, quæ parum apij incoctum in se habuerit, nihil his est offerendum . Licet quod inter balneum, & suspectas horas spatium erit, trium fore horarum coniiciamus . hæc quidem Gal. Et ut apertum fiat ob angustiam temporis ad sequentem accessionem, febricitantem non cibasse, audias quid ijs statim subiungat . Si uero inquit circa uesperam, aut duabus horis citius accessio inuadat, tum lauasse mane liceat, tum cibasse, &c. Audisti Gal. eum cuius accessio ad uesperam futura est, mane cibasse, quod nostrorum medicorum imperitiam, aut in

DE VICTV FEBRICIT.

sanam temeritatē arguit, qui sat esse si tres quattuor
ue horas à cibo ad accessiōē interponant arbitrantur.
Sed reliqua propositi prosequamur. Proinde corpora
quæ calida, & sicca sunt natura gracili habitu, & si pa-
rum ante accessiōem cibentur, minime lædentur. Quin
immo Gal. refert plures eorū à febre liberaſſe quibus
in ipſo horrore cibum exhibuit. Illud tamen intelligere
oportet, cum ob retentionem mordentis halitus febrici-
tant. Tunc enim cibo conuenienti, corpore humectiori
reddito acrim excrementorum minor commouetur co-
pia. Sed, & cutis mollior redditur. Vnde fit ut ij qui in
choante horrore per cutem corporis ab acri excremento
mordentes feruntur fumi, cibi, & potus dulci halitu mi-
tiores reddantur, unde ob dictas cauſas febrilem non
concipiunt calorem. Ob id igitur Gal. cibum ijs duran-
te horrore concedit, minime autem cum iā calorem fe-
brile patiuntur. His tamē si quando febre à putrido hu-
more laborent, cibū in accessiōibus exhibeamus ea fidu-
cia, ut eos à febre liberemus, non leuiter in eorū damnum
errabimus. Minus tamen ij, quàm qui alio sunt habitu
lædentur. Sed hæc de tempore nutriendi febricitantes
opportuno, satis sint dicta. Resumentes igitur ea quæ
hucusque diximus quod reliquum est prosequemur. For-
mam uictus quam Græci τροφή uocant, à morbi consti-
tutione, & ægratantis robore sumendam esse diximus.
Scopumq; totius huius considerationis esse, an ijs quæ
comeduntur aut ijs quæ sorbentur, aut bibuntur ægro-
tanti nutrire, an omni modis cibi, & potu abstinentia
uti debeamus, formam esse uictus querere. Qua inuen-

ta, quantitatem determinabimus, à consuetudine primo, deinde à morbi constitutione. In initio tantum esse exhibendum, quantum indicat consuetudo diximus. Deinde, ut symptomata increscunt, ita minuere, ita ut in uigore, et parum ante ipsum, nihil sit exhibendum. Deinde ostendimus secundū Hip. & Gal. unica uictus forma, à principio statum usque, & parum ante ipsum nutriendos esse ægrotantes. Non ut aliqui senserunt crassiori uictu in principio, quam in augmento, & in hoc quàm propè statum. Hancque crassitiem maiorem aut minorem non ad quantitatem solum, sed ad formam uictus referentes. Vnde cibarijs utuntur, & forma, & substantia longe dissimilibus stante eadem morbi constitutione. Cum quibus disceptare hac de re breuitati consulens præmitto. Solum lectores admonitos esse uelim, si Hip. libros diligenter euoluant, unica uictus forma, ægrotantes alere ab initio, acuti morbi ad statum usque inuenient. Porro iam dicta de ea morborum differentia fore intelligenda dictum est, qui ab initio leuiter incipiunt, & summissim increscunt, et exacerbantur ad iudicationem usque in qua abunde elucent. Verum in morbis ijs qui ab initio florent, et uigent maxime, et ad difficilius increscunt, iusta uero crisis imminuuntur alia fore diximus uictus obseruandum rationē, nempe à robore uirtutis, & à coctione morbi uictus formam sumendam esse. Ita ut cum morbi cruditas affuerit, tenuiter ægrotantes nutrire oporteat. Cunque coctio in materia apparuerit, formam uictus mutandum esse ad crassiorem, quantitatemque augendam. Diximusque;

DE VICTU FEBRICIT.

*in omnibus morbis in quibus procedens coctio sympto-
mata imminuit, hanc uictus rationem seruandam esse.
Cæterum numerum diximus à robore uirtutis, et à mor-
bi constitutione, & à consuetudine sumi. Hæc primum
oblationum numerum indicat, à quo morbus detrahit
aut uirtutis imbecillitas addit. Si ergo quis recte quæ
dicta sunt in singulis uictus scopis percipiat, quæ tuor
esse uniuersi uictus indicantia rationem colliget. Nem-
pe uirium robur, morbus, ægrotantis temperamentum,
& consuetudo. Tot enim, & non plura in ijs, quæ dixi-
mus numerauimus. Hacque indicantium uictus ratio-
nem summam, secundum mentē senis esse scito in libro
secundo de ratione uictus ubi ita scribit. Conijcere au-
tem oportet robur, & morbi cuiusque modum, hominis
item naturam, atque ægrotantis in uictu consuetudi-
nem, non in cibis solum, uerum quoque, & in potibus.*

CAP. X.

*DIVINVS igitur Hipp. in libris de ratione ui-
ctus, de sorbitionibus, & poculis solum egit, tanquam
eæ solum acutis morbis conueniant uictus formæ. De
ptisana scripsit ut pote quæ leuissima omnium aliarum
sorbitionis est, & acutis maxime conueniens. Vt osten-
dat, quod cum in exhibitione huius committatur error
non paruas inde fieri in acutis noxas, grauiores multo
fore si alijs utamur cibis. Primum ipse ostendit ijs uer-
bis, lubricissima est, sitim maxime arcet, facillime co-
quitur in firmissima existit, si optime cocta fuerit, qui-
bus omnibus est opus. Secundum, ijs uerbis ostendit, si
lateris dolor assiduus est, calidisq; fomentis non remit-*

titur sputumque non procedit, ptisanam autem ita affectis dederit, præcipit aget in mortē. Quod autem ijs similia accidunt eis qui alijs cibis utantur, ipse statim ostendit. Præbendū autem inquit hæc, non solum si ptisana intēpestive utantur, verū, & multo magis si quipiam aliud quam ptisana inconuenientius sit edant, aut bibant. Sunt igitur nonnulla, quæ scripsit Hip. de ptisana iudicia cū alijs cibarijs cōmunia, quedam peculiaria ipsi ptisanæ. Communia hæc sunt. Cum morbus a principio floret, & uiget, ut pleuritis, & peripneumonia uitāda est ptisanæ sorbitio, & multo magis quæ ex alijs cibarijs fit, maxime ea, quæ eduntur affectu existente crudo, sunt enim causa suffocationis, et mortis. Sed tunc temporis potus humectantes exhibere conuenit. Cūq; morbus cōtionem iam recipit, & sputa procedunt, sorbitionem dare licet, et eius quantitas prout morbus magis maturescat augenda est. Præterea symptomate quocunque superueniente aut periculo, sicut tunc ptisanæ sorbitionem suspectam esse dixit, ita, & omnem alium cibum qui solidior sit ea. Insuper, et illud commune est, nempe tempus exhibitio in opportunū, cum calidas ad pedes descenderit. Præterea incipiendum esse inclinante febre a magis tenui cibo ægrotañtes alere. Denum illud, nempe post purgationem medicaminis sorbitionem esse ministrandam, quæ consueta sit minor Peculiaris sunt hæc ut ptisana optime appareatur. Nā nisi quis quantum deest contulerit, ut ptisanæ sorbitio sufficienter pareatur, crebrius sanè detrimentum afferet. Deinde illud quibus enim cibus statim inclusus, si quis nō ua-

DE VICTV FEBRICIT.

cuato eo, sorbitionem dederit, dolorem si adest ad augebit, & si non adest protinus inducet, frequentiorque reddetur spiritus, quod malum est, nam pulmonem exiccat. Præterea & illud ubi autem quis medicamentum ebibit, ptisanam protinus sorbendam dato. Nec insigniter minore quàm consuetum est quantitate. Præterea, & illud nisi propter pharmatiam aut clistere ab usu ptisanæ desistendum sit. Gal. addit, aut propter sanguinis missionem, hæc omnia soli competunt ptisanæ minime alijs cibarijs.

C A P X I.

IN solis ijs morbis mulsa utendum est, in quibus præ acuminis uehementia morbus peracutus fuerit. Aut ob aliquem dolorem, aut si periculum instat. In summa morbis ijs quibus supra sorbitiones prohibuimus, indigentes eo quod pulmonem humectet, & sputum mediocriter educat, & tusses mitiget, aut eo quod urinas abunde cieat, aut biliosa deiciat excrementa, mulsa eligimus. Meraciore cauentes ijs qui natura calida, & sicca sunt, amare bilis hominibus picrocholi Græce dicuntur. Is uero quibus, tumefacta sunt uiscera ob scyrrhum, aut ob phlegmonem, immoderato calore bile scit. Scyrrhus enim impedimento est ne cito ad renes, & uiscera transeat. Vnde longa mora in bilem similiter uertitur. Picrocholis igitur dilutior exhibenda est, ut citius penetret. Iis simili modo ministrato in quibus pulmo nem magis lenire cupimus, & sputum magis educere. Meratior uero potentis biliosa deicit excrementa, magis tamen suspecta ijs est qui calida sunt natura. Spumo

sa siquidem ijs, & plusquam conuenit biliosa efficit excrementa in bilem flauam transiens. Vnde aduersissimam liquefaciētibus febribus esse mulsam scripsit Gal. In fine
10. de
metho.
mededi in tertio de ratione uictus. Oximelite in ijs utemur morbis in quibus à sorbitionibus supersedemus. Tunc maxime cum sputum crassum, & glutinosum educere uolumus, aut sitim sedare, flatum discutere, & urinas mouere. Proinde oximeli quod ualde acre est, ad crassa sputa, & uehementer glutinosa uim habet. Verum si huiusmodi sputa non secant aut educant, non solum non confert, uerum, & detrimentum affert. Nā exiccans, ea magis reddit crassa, & glutinosa. Aut ergo quod ualde acre oximeli est proderit, crassa si secuerit sputa, & ea eduxerit, aut id si non præstet abunde nocebit. Quapropter recte Hip. dixit nihil mediocriter efficere, in ijs quæ non facile educuntur sputis. Idcirco egritudinis morigerationem aut malignitatem considerandum esse ait, ut sciamus quibus exhibitum secabit sputa, & quibus non. Iis igitur qui grauiter habēt, et uiriū imbecillitate laborant, non propinabis. Quod si ob uiriū robur de eo bene speraueris, dabis paulatim, & tepidum. Oximelitis nocumenta sunt, hæc quod partem intestini immam reddit humectiorem, & ramenta facit. Vnde imbecilla habentibus intestina exhibendum non est. Est aliquando in acutis morbis, ut ramenta intestini praua ob id sint, quod flatum non modo foras prodire uetant, uerum quoque reuerti faciant. Et ob hæc uires frangūt, extremaq; infrigidant. Qui autem non sorbitionibus sed potione sola utuntur, ijs non semper oximelite uti-

DE VICTU FEBRICIT.

expedit, ob intestinorum abrafionem, eo præcipue quod stercore uiduasint. Cum igitur sputa, quæ in brōchijs pulmonis contineantur, uel glutinosa, uel admodum crassa sunt, mulsaq; sitim inferat, solo est utendū oximilite. Quare, ut longo usu non noceat, aquæ mulsæ tantum aceti miscendum est, ut duntaxat sentiri possit. Et ita simul ad lentum ignem coquere oportet. Hoc enim pacto ad nocendum infirmius erit. Sed abunde à nobis de uictus ratione secundum mentem Hipp. hucusque dictum sit.

CAP. XII.

SED tempestiuum est de potu sermonem faciamus qui febricitantibus conueniat. Hunc, omnia, quæ supra ostēdere uictum diximus induant, nēpè uirtutis robur, morbi dispositio, ægotātis natura, et cōsuetudo. Ut nos docuit Hip. in secundo de ratione uictus in hæc uerba, προσημαρτία δὴ καὶ ἡ ἰσχύς καὶ ὁ τρόπος τοῦ νοσήματος ἐκαστὴ καὶ τῆς φύσεως τῆς ἀσθενείας καὶ τῆς ἕως τῆς διαίτης τῆς καμνοντος ἐνόςου σιτιῶν ἀλλὰ καὶ ποτῶν. Hoc est coniicienda sunt, & robur, & modus cuiusque morbi, hominisque naturæ, & consuetudinis laborantis in uictu, non in cibis solum uerum quoque in potibus. Quibus in uerbis quattuor esse quæ potum indicant aperte docuit. Cæterum si eorum, quæ supra in de qualitate uictus diximus memineris, tria sat esse ad potus indicationē intelliges. Nam laborantis naturæ, ut illic ostendimus, non nisi interuentu consuetudinis indicat. Nam ægotāti frigide naturæ, potui aquæ assueto, aquam non uinum mini-

strabimus, sumpta à consuetudine indicatione, & non à laborantis natura. Neq; rursus homini calidæ naturæ agrotanti, aquam in potu dabimus, qui perpetuo uino assueuerit. Hæc ex Gal. octauo de methodo colligimus de calidis naturis, & siccis loquens in hunc modum. Si quis uero, inquit, non adsueuit, scilicet frigidæ, huic per febrem dare non inceperim, nisi pristina plane sanitate prius reddita. Indicatio igitur à consuetudine, eā obumbrat, quæ à naturâ laborantis sumitur indicationē, durante morbo. Nec id mirū uideri debet nam maximam uim habet consuetudo, repentinaq; ab ea digressio, corpora non parum offendit. Vt a Gal. scriptum est secundo de ratione uictus. Tria igitur sunt, quæ potum indicant, nempe uirtutis robur, morbus, et consuetudo. Virtus cum ualeat, consuetudini in indicatione potus cōsentit, cum maxime potū indicans quæ consuetudo. Cūq; imbecillis est, quandoque dissentit, unde fit ut agrotanti frigidæ assueto, modicū uini quo eius roboretur natura concedamus. Cuius argumentum est, pluribus, dulce bacchi uenenū, primā labijs admouendi occasionem, de disse ægritudines. Morbus cum magnus est, & uehementis consuetudini indicationem obscurat. Nam laboranti acuta febre uino assueto, eū ministrabimus maxime potum quem ægritudo indicauerit, uirtute nequaquam dissuadente. Vt ex Gal. nono de methodo colligitur cū de continentium febrium curatione agit. Vbi frigidæ potum post coctiones exhibet, à consuetudine nullā sumens indicationē. Vbi in hunc modū scribit. Cum ergo coctionis humorū in ijs notas uideris de quibus dictum

DE VICTV FEBRICIT.

deinde in libris de crisi est, audacter frigidam dabis. Et subiungit statim, quod si etiā frigida assuetus ager sit, magna cum fiducia frigidam exhibebis &c. Ac si uelit id quod eodem libro scripsit in hac uerba. Si quidē cum s& e iam uidimus non paucos, ex ijs qui febribus ardentibus præmerentur, cum iam mediocriter concocti humores essent, statim ex frigida potione à febre liberatos, quāuis ei potioni parum assueti fuissent. Multo arbitror magis in ijs, qui assueuerūt, utilitatem fore citra noxam ullam sperabimus. Vnde non ob id quod aquæ assuetus non sit, ab ea desistendum est, nisi cum aliquod effatu dignum incommodum naturæ ab eius occursu timemus. Ob id apposui uirtute nequaquam dissuadente. Idem ab eodem undecimo libro de methodo medendi colligi potest, cum in febribus continuis, absolute citra consuetudinis considerationem, uinum prohibet, & frigidam exhibendam consulit. Imbecilli uero morbo existente, diuersumq; ab eo quem consuetudo indicauit potum exposcente, quæ à consuetudine sumitur præualebit indicatio. Vt manifestum est ex eo quod Gal. octauo de methodo scripsit. Qui cum uinum utilius esse, quàm aquam dixisset, ad coctiones, & urinae, ac sudorum, prouocationem, statim subiungit. Ego igitur censeo eius generis naturas, et dum ualet huiusmodi potione scilicet aqua magno opere iuuari, nec in diaria febre ijs quibus in usu fuit eam circuncido. Si quis uero non adsueuit huic per febrem dare nō inceperim, nisi pristina planè sanitate prius reddita. Ostensum igitur est, quod cum morbus, et consuetudo diuersos potus

inducant, si morbo magnitudo accessit, huius indicationē, obscurare eam quæ à consuetudine sumitur. Quod si morbo nulla effatu digna accessit magnitudo, aut uehementia, scito indicationē à consuetudine tunc præuolare. Cæterum de robore uirtutis, & morbi magnitudine supra abunde dictum est, cum de uictus forma sermonem fecimus. Sciendum præterea quod cum uirtus ob imbecillitatem urget, eum semper indicat potū, quo maxime roborari possit. Qua de causa roborantem potum nuncupamus quem causa roborandæ uirtutis ægrotantibus concedimus. Tale in primis uinum est, quod omnium maxime corporis uires naturales, et uitales roborat. Morbus eum indicat potum, qui morbo aut eius causæ qualitate contrarius sit. Ob id curantem potum eum dicimus, quem morbus ipse indicat. Est autem talis, acutis, & uehementibus febribus, aqua. Ut ex Gal. in tertio de ratione uictus (licet sub alijs uerbis) colligitur, cum ita scribit. Quando igitur, inquit bibi idonea est aqua, cum scilicet potu solo æger nutritus fuerit, nullo pacto accepto ptisanæ cremore. Tunc enim in potionum aliarum medio, aquam tempestate quis ingerit, & præsertim cum siticulosus æger fuerit. Per illa uerba, potu solo nutritus, fuerit, intelligit, ab aliquo ægrotantem acutorum morborum affici, cuius causa solo uictu per pocula nutriatur. Ac si uelit quibuscunque acuto morbo laborantibus, aquam conuenienter in potum exhiberi. Aqua igitur in primis, potus curans in acutis affectibus est. Vires tamen corporis minime roborat, ut ab eodem loco citato scriptum est cum ait.

DE VICTV FEBRICIT.

Quod autem inquit non aliat antea dictū est, quo fit, ut facultatem uitalem roborare non possit, &c. Ab aqua simplici consequenter est ea, in qua uirtus alicuius rei per decoctionem transmissa est. Vt aqua ex decoctione bordei, aut liquiritiæ, aut prunorū, &c. Et sunt tot numero quot sunt res, quæ simul cum aqua decoqui possunt. Est & uinum in aliquibus morbis potus curās. Vt ex Gal. in libris de methodo medendi apparet, & ex Hip. tertio de ratione uictus. Consuetudinem uero eū cui ager assueuerit potū indicare diximus, quæ de causa consuetum potum eum dicimus, quæ consuetudo indicat. Qui unus è tribus est potus, quibus utique terrarū utuntur homines, nempe aqua, uino, Cerulsia. Lusitani aquæ potu delectantur, Galli & Itali uino, Germani, & Angli cernisia. Cæterum potus roborans multiplex est. Nempe uinū potēs, quod uinosum Hip. nuncupauit, id tale est, quod in aliquo uehementissimum est. Est & huius cōtrarium quod aquosum ob id medici nuncuparunt quod aqua maxime, in omnibus simile existit, nēpe tenuitate, colore, & odoris carentia, & non manifesta calfactione. Iis omnibus consentit Gal. tertio de ratione uictus in initio. Porro inter hæc multa esse, quæ mediæ naturæ sunt uina comperies. Nos clarioris sermonis gratia, tria inter iā dicta, media locauimus. Vnū quod uehementissimo proximum est. Aliud quod aequoso. Tertium quod medium obtinet locum. Primum ex duobus maxime dignoscere oportet. Nempe ut in mixtione uinum aquā manifestæ euincat. Item ut in eo aliquod sit uehementiæ uestigium. Secundū contraria qualita-

te dignosces. Nempe ut in eo aqua euincat, & imbecilliter calfaciat. Ex ijs duobus medium intelliges, nempe in quo neutrum sensibilibiter euincat, & nullū in eo uehementiæ uestigiū appareat. Nos quo facilius res percipiat, singulis horum nomina imponemus. Vinū uehementissimū, uinosum nuncupamus. Eius contrariū aquosum. Huic proximum imbecille. Eius oppositum potens. Et medium inter hæc. Scire oportet has uinorū species reperiri posse in simplici uingrum natura. Nam quod fuluum colore est, uehementissimum est. Huius contrariū est, quod imbecillitate, colore, tenuitate substantiæ, odoris carentia, & occulta calfactione, aquæ similimum est. Huic proximum, uinum album tenue, sine odore, imbecilli calfactione est. Cuiusmodi sunt uina alba tenuia inodora, quæ in aliquibus Italiæ locis proueniunt. Proximum uinoso est, uinum colore, rubrum crassum, odorum, cum uehementia calfaciens. Cuiusmodi sunt quæ Hispania profert. Mediū, colore sub rubeo est, splendidum, mediocris substantia, modorum, manifeste citra aliquam uehementiam calfaciens. Cuiusmodi sunt uina, quæ ex gallia deferuntur. Posset quisque imitari has naturas, potenti uino aquā pro ratione cuiusque immiscens. Ita ut aquosum efficias si aquæ portioni tantummodo id uini misceas, ut modica fiat, in eo uini representatio. Id enim discimus à Gal. in tertio de ratione uictus in acutis, qui uinum sic tēperauit multa aquæ cōmixtione. Cuius uerba ita habent cum igitur, inquit seni cuidā ægrotāti quotidie uinū aquosum exhiberē, quidā ex huiusmodi medicis præsens, me uini mi-

minimam, aqua instillantē contemplatus risit, ægrumq; uinum nō bibere sed duntaxat uidere dixit. Non sane intelligens, mixtionem uini quod gratia uoluptatis datur, ad aquam aliam esse symmetriam, & aliā esse eius quod ad opem ferendam ministratur. Nam uini omnino minimū ueluti excitationē quandā quæ ad distributionē aquam trahat permiscemur. Ut duntaxat aqua tolleramus sinceritatē, nō autē aquā uinum faciamus. Sunt autem plerique ex sanis qui uinū aqua dilutū bibant, sed in ijs aquam gustatu ipso euincere non oportet. In ægris uero, ut modica sit uim representatio. Sic de oximelite paulo ante dicebat aquosum laudans, &c. Hucusque Gal. quibus in uerbis modum mixtionis aquæ, cū uino ad aquosum uinum efficiendum aperte docuit. Talem in mixtione seruare iubens symmetriā, ut modica sit uini in gustatu ipso representatio. Imbecille efficies si tantum aquæ inijcias, ut uinū imbecilliter calfaciat. Sed ut exactius rē assequi possis, uinum super aquā infundere expediet, subinde labijs admovento, ut cum primum ad metā imbecillis calfactionis deuenierit mixtio, uini non amplius infundas. Simili ratione uinum quod moderatum diximus efficies, tandiu uinum aquæ immiscendo, donec neutrum duorum euincat. Possit qui uis his alia media inferere, naturasq; eorū penes aliquod trium sensuum obiectum diffinire. Sed hæc sufficere omnibus tam ijs qui acuto, quàm ijs qui hebeti sunt sensu arbitramur. Eo præcipue quod reliquæ quæcunque inter has sunt potus differentie haud facile à sensu discernuntur. Potus similiter quo communiter angli

utantur multiplex est. Nempe uehemens medius, & imbecillior. Discrimen inter hos penes uehementiam, & imbecillitatem, calfactionem, & refrigerationē, & penes substantiæ crassitiem, & tenuitatem habetur. Apud anglos triplex semper paratur potus, nēpe aquosus, quem simplicem cernisiam dicunt, medius, quem trihapeninam, potens, quem duplā cernisiam nuncupant. simplex eosdem effectus præstat quos uinum aquosum. Aperit siquidē, refrigerat, & distributionem adiuvat. Nec decipiatur aliquis credens ob eius amaritudinem calfacere, partes enim quæ cernisiam amarā reddunt, pauca admodum sunt, si ad reliquas conferas, quæ in ipsa refrigerant. Quod colligere ex ratione lupulorum poteris ad aquæ, & hordei portiones. Cito præterea amaritudo à cernisia euanescit, reliquarum uero partium facultas tandiu permanet donec in aliā transmutetur substantiam. Potens cernisia quam duplicem dicunt, potenter calefacit, & quid habet uehementiæ, ut potens uinum. Trihapenina mediæ naturæ est, manifestæ calfacit in nullo tamen uehemēs est. Posset quis duos alios potus efficere mediæ naturæ inter hos, & totidem in cernisia differentias ac in uini natura fecimus. Vt si simplicis cernisiæ duos ciathos uni trihapenina misceas, medium potum inter duos efficies. Quod si simplicis cernisiæ unum, mediæ unum, duplicis mū, simul misceas, medium potum inter mediam, & duplicem efficies. Vocemus hos quinque cernisiæ potus eisdem nominibus quibus in uinorum naturis usi sumus. Simplicem aquosum, proximū quem ex mixtione duo-

DE VICTV FEBRICIT.

rum confecimus imbecillem, deinde medium, & huic proximum potentem, omnium postremum uehementem. Simili ratione totidem posses efficere differentias, illius potus quo molliores anglorum utuntur, (Allam uulgari sermone appellant) sunt qui ceruisiam per u, hunc latine dicant. Potus est ultra modum inflatius, nullam ex eo febricitantes utilitatem capiunt. Neque enim refrigerat, neque aperit, neque ullam promouet euacuationem. Sed nec sitim sedat, Corruptioni præterea aptissimus est potus. Et uicinos ad similem affectum disponit chimos. Eius insuper substantia nimis prompta est, ut in flatuosos soluat halitus, Qua de causa capiti, & neruis incommodus est. Materia insuper obstructionum est, unde iocineri, & lieni inimicus est. In summa amicus potus nemini nisi ueneri. Ab ijs tamen qui eo usi sunt bona ualitudine dimittendus per ægritudinem non est, ut supra ostendimus. Potus quem curantē diximus, nullas tales recipit differentias. Nā cum morbo, aut eius causæ contrarius sit, fieri nō potest, ut per intensiōem alicuius qualitatis, aut remissionē ullas præstet differentias. Oppositio siquidē omnis latitudine caret. Ceterum meminisse oportet uirtutem in maxime, multum, & parum, & nihil urgentem, supra nos explicasse. In totidemq; morbum partitiones unapulus diuississe. Nempe in maxime, multum, mediocriter parum, & nihil urgentem. Signisq; in utrisque sectionibus usi sumus, quibus cui uis facile erit, si nō admodū crassa sit natura, cum uirtus, & morbus maxime, an multum, an parum, an nihil urgeant discernere. Pona-

mus

mus igitur primum à consuetudine nihil indicari, hoc est nulla sit is qui laborat astrictus cōsuetudine in potibus, ut si aqua, uino, & ceruisia si uelis assuetus sit, (Vt cōsueuere gētis Lusitanae profugi, qui in Anglia, & Flandria sedem habuere) huic si uirtus corporis sit imbecillis, eum indicabit potum quo maxime seruari possit, si morbus non prohibeat. Talis potus uini est quem uirtutis imbecillitas indicat. Sed quod nam eligemus nondum constat. An aquosum an imbecille an medium. Verum id natura corporis indicabit, ijs si qui dem qui calido, et sicco sunt temperamento, gracili habitu, imbecille vinū conuenit. Iis uero qui frigida sunt natura, crasso habitu, pingui abdomine, tardi, potens, aut vinosum. Quicumque attrabiliosi & medicæ inter hos naturæ sunt, medium. In sanis igitur corporibus nulli potui assueris, cū aliqua imbecillitate laborantibus. ab ea solummodo indicatio potus in genere sumitur, à naturali uero temperamento species. Quod si nulla imbecillitate eorum uirtutes urgeant, à sola corporis naturali temperie, potus indicatio est sumenda, Vt in sexto de morbis vulgaribus siue Hip. siue Thessalus eius filius traddidit, calidis naturis refrigerationem, aquæ potionem, tūc quietem, consulens. Et hinc licet colligere ijs qui calida et sicca sunt natura cum robore uirū, aqua uti commodius esse quàm uino. Verum quicumque calidi & sicci sunt temperamenti, imbecilli natura, salubrius ijs esse aquoso uino in potum uti quàm aqua. Quia enim aquosum est, calidæ naturæ conuenit. Vt uero uini facultatem habet, imbecillitati subuenit. Vnde ma-

L nifestum

DE VICTV FEBRICIT.

manifestū est, ut ij qui calida & sicca sunt natura, gracili habitu, tenuium succorum, ob id quod cito eorum corpora in habitū soluuntur, & imbecilliores ex inde sūt, uino aquoso per sanitatem commodissime utātur. Hoc Gal. asseruit octauo de Methodo cum ait uinum inquit ipse conscius es, me omnibus huiusmodi naturis cōcedere, sed quod tum aspectu tum uiribus sit aquosum. Id enim ad omnia utilius est quā aqua, utpote quod concoctionem iuuat, & urinas ac sudores prouocet. Ostensum igitur est quod seclusa indicatione à consuetudine, sanis corporibus imbecilibus, genus potus à dispositione uirtutis sumendum esse, speciem uero à naturali temperamento. Vbi uero uirtutis imbecillitas nihil indicet, prout cōtingit inculpatis naturis quas semper nisi cum à morbo detinentur robustæ comitantur uires, à sola naturali temperie & genus potus, & species sumuntur. Vnde fit ut corporibus calidis robustis aqua per sanitatem uti, & non uino salubre sit. Anglis & Germanis qui simili ualent uirium robore, & simili sunt temperatura, et quicunq; ijs Borealiores sunt, cū prospera fruūtur ualitudine, trihapeninam cernisiam, quæ medio inter simplicem potum & duplicem est magis conuenire arbitramur. Simplici potu, nisi æstate feruente non utantur. Vinum ijs nisi medicinae gratia incommodum est. Nam ob frigidam cōtinentis intemperiem, tum ob excrementosa cibaria, tum ob fæculentos potus, crassa in horū uentriculis agregantur excrementa, de genere priuata quæ lōga mora uitiosam qualitatem acquirūt. Iis uinū potens si exhibeas, uitiosos humores

res ad iocinerem & uenas secum defert. Quare ob eorum crassitiē in angustis iocineris meatibus detēti, uias obstruunt. Quę causa est ut coctionem sanguinis perturbent, & deprauent, iocinere ab eis uitium cōtrahente. Quod si imbecilla ijs uina ministres, alterum duorum efficies, aut uitiosos chimos uētriculo magis impinges, aut crudos hos magis reddes. Huiusmodi si quidē uina astrictiōnis, aut quid acetosi habent. Verum medicina gratia, modicum uini ad secundas mensas ut coctionem uentriculi adiuuet, & cibariorum incoctōrum à sole cruditatem emendet suo moderato calore, his salubre est. Quapropter ijs media uina quę nihil uehementiæ habeant commoda sunt. Caterum cum consuetudo suā præstat indicationē, uirtute sani corporis robusta existente, considerandum est, an propriū corporis temperamentum, eundem potum, quem cōsuetudo, idicet, an alium. Quod si eundem, citra aliam considerationem exhibendum eum esse potum scito, quē simul consuetudo & temperamentum indicarunt. Quod si alium, pugna fit inter duo indicantia. Quapropter ætas inter hæc dirimet. Nam si homo citra annum quadragesimū quintū sit, temperamento consentit. Si ultra consuetudini. Omnis si quidem mutatio magno uiriū robore indiget, quod raro in ijs qui ultra quadragesimū quintū annum sunt, reperitur. In omni si quidem mutatione duo adsunt labores, nempe rei consuetæ demissio, et ad insuetam transmissio, ut ergo quę ab ijs eueniunt incōmoda, quis effugiat, et ut spes sit quę futura sunt corrigantur dāna, certo uiriū robore opus est, quod raro in

DE VICTV FEBRICIT.

ijs qui ultra annū quadragesimūquintum sunt, reperitur. Vnde prouerbiū apud Hispanos est, qui cōsuetudinem demiserūt propè mortem accesserunt. Neque im merito nā mors & consuetudo è regione habitant. Nō possis cōsuetudinis egredi limites, quin patentes mortis fores inspicias. Quapropter senibus, consuetis foueri, melius est. Sed de sanorum potu satis dicta sunt. Hoc enim negotium ad speculationem de tuenda ualitudine spectat, quare illic quod reliquum est quære: Nos ad egrotantes sermonē conuertamus. Positis duobus potū indicantibus nempe uirtute & morbo, à consuetudine nulla sumpta indicatione, si uirtus maxime urgeat, eū esse exhibendum potū quo maxime laborantis natura seruari possit, neglecta omnino indicatione quæ à morbo sumitur, supra ostendimus de mente Gal. cum de uictus forma nobis sermo erat. Quod si multum uterq; urgeat & uirtus & morbus, dissentiātq; in indicatione potus, praualebit à uirtute indicatio, nō tamē neglecta quæ à morbo sumitur. Sic Hip. in quarto de ratione uictus, quibus per febres aluus liquida est, & mens turbatur, horūq; multi floccos uellunt, narēsque fodiunt, & parum quidem interrogatis respondent, sed ex se nihil quod compositum est dicunt, talia ijs melancholica esse arbitror. His igitur ita habentibus, si ueter liquidus fuerit, absumēnsque & contabefaciens, forbitiones frigidiores crassioresque exhibendas esse puto. Potūsque qui sistant, uinosioresque, uel etiam astringētiore. Quibus uerbis descripsisse & uirtutem, & morbum multū urgentes, ex ijs quæ in superioribus diximus

*vinum manifestum est. Vinum tamen, non obſtāte delirio
 conceſſit in prædicta conſtitutione cauſa uirtutis mul-
 tum urgentis. Appoſuit qui ſiſtant, ob alui liquidæ
 ſymptoma. Vinofioresq; ob imbecillitatis rationem nō
 equidē uinoſum ijs cōcedit uinū, qui bmoī delirio labo-
 rant, ſed aquoſo uinoſius, poſtremo enim de aquoſo ui-
 no ſermonem fecerat, cum dixit in tertio cæterum uino
 albo tenui paucifero & inodoro &c. Cum ergo uinoſio-
 res potus ſcribit, ad aquoſum conferre opiaandum eſt,
 & eo maxime quod aquoſum uinū in ſimili delirio cō-
 ceſſerat, libro tertio in expoſitione illius cū uero in hu-
 iuſmodi morbis &c. Imbecille igitur uinū quod aquo-
 ſum proxime ſubſequitur ad uinoſum uerſus, itellexiſſe
 arbitror. Sed quod idem rubrū eſſe oporteat, inde ma-
 niſteſtum eſt, quod in huiuſmodi uinorum natura adſtri-
 ctio reperitur. Ex ijs igitur duobus locis & ex ijs que
 ſupra in initio huius ſpeculatiōis diximus, licet collige-
 re quantum ſit aduerſantibus indicationibus à præua-
 lente detrahendum. Quod ut omnibus, inueſtigatiōis
 modus pateat, tabellam apponemus, ijs inſeruientem in
 quibus uirtus & morbus potum indicant à conſuetudi-
 ne nulla ſumpta indicatione. Peracuto igitur morbo,
 multumq; urgenti, aquam in potum exhibendam eſſe,
 uirtute robuſta exiſtēte ſupra oſtendimus in initio hu-
 ius meditationis. Quod ſi uirtus parum ob imbecillita-
 tem urgeat, aquoſum uinum miniſtrandum eſt. Quare
 picrocholis quamuis acuta febre laborātib; aquoſum
 uinum propinabimus, ob id quod horum uirtutes ſem-
 per parum urgeant. Nam horum corporū ſubſtantia,*

DE VICTV FEBRICIT.

facile à leui occasione effluit, ob raritatem pororū, et succorum tenuitatem, & calidam eorum naturam. Sic Gal. octauo de methodo dixit. Vinum uero ipse conscius es, omnibus me huiusmodi naturis concedere, sed quod aquosum tum aspectu, tum uiribus sit. Id enim ad omnia utilius est quàm aqua. Vtpote quod & coctionem inuat, & urinas ac sudores prouocet. Constat autem & Hip. nō in diarijs modo febribus uerum etiā in acutis ex ijs quæ de acutarum uictu prodit uinū dare et c. Ex quibus uerbis manifestum est aquosum uinū in acutis cōcedendum picrocholis esse, ob futura eorū imbecillitatis timorem. Causatius igitur ubi uirtus corporis ob præsentem imbecillitatem parū urgeat, aquosum uinū ministrandum est. Hoc dico puod in omnibus quàm maxime sit aquæ simile. Hoc efficies modici uini multa cū aqua permixtione. Modus sit, ut modica sit uini representatio. Vt legimus Gal. fecisse, qui minimū uini multa aqua cōmiscens id ægrotanti seni exhibuit, ridente alio medico qui forte tunc aderat. Semperq; cum uinum aquosum dixero, tale intelligo, in quo aqua qualitate & uiribus multum in mixtione superat. Vinum uero in gustatu modice solummodo præsentetur. Quod si uirtus multum urgeat, stante eadem morbi uehemētia, aquoso uinosius exhibere oportet. Tale imbecille fuerit, in quo aqua in mixtione superat, uini tamen in gustatu ipso manifeste qualitas percipiatur. Vt dulcor, si dulce. Adstrictio si austerum &c. Hoc, imbecille supra uocauimus. Sic Hip. loco iam citato, uino si ores potus ijs administrare iubet, quorū uirtute multum

zum ob imbecillitatem urgeant. Signum, quod sic habeant est, fluxus ventris, contabesciens, absumensq; . Quod si morbus parum urgeat, uirtute multum urgente, medium potum exhibebimus. Talem dicimus in quo neutrum sensibilibiter in mixtione uincit. Quod si omnino non urgeat morbus, uirtute similiter habente, eum quo maxime seruari possit uirtus, ministrabimus. Hūc potum quandiu uirtus & morbus similiter habuerint, non mutabimus. At cum duorum alterum in aliud uariauerit, pro ratione mutationis, potū ministrabimus. Sic supra cum de uictus forma ageremus iuxta mutationem indicatium, uictus formam immutauimus. Nec enim in ea sum opinione, ut credā ab initio morbi posse medicum, uictum & potum conijcere, qui egrotanti per totum morbi decursum exacte conueniat. Dementia est putare posse hominē eo cognitionis peruenire. Sed de ijs abunde in superioribus diximus. Verum nūc hæc ad tabellam reduximus ut facilius habeantur. Per potum, curantē eum intelligo qui morbo aut eius causa sit qualitate contrarius. Aquosum roborantem eū, qui ex roborante & curante mixtus est potus. Sed similem in eo rationem habet ad curantem roborans, ac uinum ad aquam in uino aquoso. Imbecilliter roborās, in quo hic ad potum curantem similem seruat symmetriam, ac uinum ad aquam in uino imbecilli. Reliquorum similis est ratio. Vt si ponas Socratem morbo parum urgente laborare, ac uirtus eius multum urgeat, potum ei potenter roborantem dabimus

DE VICTV FEBRICIT.

TABELLA HIC INSERVIENS QVIB.
à virtute & morbo potius indicatio
sumitur.

	morbis maxi.	multum	medio criter	parū	nihilur gens
virtus non	curans	curās, ut aqua	curans	curans	curans
parum	curans	aquosus roborās	imbecil- liter ro- borans	medio- criter ro- borans	potenter roborans
multum	aquosus roborās	imbecil- liter ro- borans	mediocri- ter robo- rans	potenter robo- rans	quo ma- xime ser- uari pos- sit
maxime urgens	quo ma- xime ser- uari pos- sit	quo ma- xime ser- uari pos- sit	quo ma- xime ser- uari pos- sit	quo ma- xime ser- uari pos- sit	quo ma- xime ser- uari pos- sit

*Vt si aquam decoctionis seminis fœniculi Socrati potu-
curantem diffinieris, hunc uino miscebis tali symmetria
ut uinum in mixtione manifeste superet. Cateru tem-
pestiuu est ut de ijs faciamus sermonẽ, in quibus assue-
tudinẽ tanquam indicatricẽ contemplamur. Seclusa
in primis ea quæ à robore uirium sumitur indicatione.
Deinde omnia tria simul in indicationem potus conuo-
cabimus. Nunc quæ in superioribus de consuetudine di-
ximus, in mentem reuocare oportet. Nempe consuetu-
dinẽ in maximam, & minore diuidi. Maximam dici-
mus, ut cū uni duntaxat potui quis insueuerit. Vt Gal-
li uino. Anglorum nōnulli ceruisiæ, Lusitanorū pluri-
mi aquæ. Minorem, cum quis uino insueuit, quia eo bo-
næ ualitudini cōsulit, citra aliquod incommodum alio
nō utens potu. Eisdem modis dicitur id quod insuetum
est. Ad hæc scire oportet quod cum morbus & consue-
tudo consentiunt, ministrandum eum esse potum, quem
inducant citra aliam considerationem. Vt laborāti acu-
ta febre Lusitano cū uirium robore aquæ potui assue-
to, aquam hordei quam morbus & consuetudo indica-
runt, citra cōtentionem ministrabimus. Quod si pugna
in indicatione fuerit, quod uiribus superius est, in indi-
catione præualeat. Nempe morbus, si multum aut quā
maxime urgeat. Aut cōsuetudo, si morbus parum aut
nihil urgeat. Sic Gal. octauo de methodo. Si quis uero
inquit frigide non adsueuit, huic per febrem dare non
inceperim nisi pristina planè sanitate prius reddita.
Rursus ponamus hominẽ acuta febre laborantem ui-
ro assuetum, aquaq; nunquam fuisse usum, quem huic
ministra-*

DE VICTU FEBRICIT.

ministrabimus potum, morbo aquam indicante, consuetudine fortiter dissuadente, morbus quidem in indicatione ob id quod multum urget præualebit, consuetudine tamen non neglecta. Quinimmo aliquid ei indulgendum est iuxta sententiam Hip. in Apho. id præstabimus si in dicta constitutione potum aquosum consuetum hoc est vinum aquosum ministremus. Sic olim Dionysio patri meo contigit. Laborabat acuto morbo Gallus cumq; de consuetudine quereretur, dixit. se aqua fuisse nunquam usum nisi ad manus abluionem. Qua propter hominem à morbo liberauit, consuetudinem in indicationem potus admittens. Licet ergo morbus multum urgeat, consuetudini dandum est aliquid, hoc est neq; totum neque maximum. Neque obstiterit quod aphor. solum de numero oblationum agat. Nam uerus est sermo, etiam in indicatione potus. Vt ab eodem didicimus secundo de ratione victus loco supra à nobis citato ubi consuetudinis ad indicationem potus meminit. Sed quod in tali morbi constitutione non sit plus concedendum consuetudini, hinc manifestum est. Hip. in tertio de ratione victus ita scribit. Cum uero in huiusmodi morbis forte capitis grauitatem uel mentis lesionem suspicatus fueris, à vino penitus est abstinendum. Aquamque tunc dare oportet, uel vinum aquosum, flauumq; & prorsus inodorum &c. In quibus uerbis multum urgentem morbum depingit. Cunque morbus ita habuerit, à vino penitus abstinendum esse iubet. Aquamque tunc dare consulit. Et subiungit statim, uel uinum aquosum prorsus inodorum. Cunque non eadem sit aqua & ui-

ni aquosi natura opinandum est, aquam uel uinū aquo-
sum non ideo dixisse, ac si uellet, citra discrimen ullum
utrouis eque nos uti posse. Quod ex ijs quæ statim se-
quuntur uerbis manifestum est, cum dixit. Atque ab ip-
sius potione aquæ exiguum super bibendum est, nam
hoc modo uini potentia caput minus tentabit. Cū ergo
uinum aquosum alterius sit naturæ quàm aqua, ab eis-
dem indicantibus utrumque indicari non potest. Cumq;
tria sint, quæ potum indicēt, nempe morbus, uirtus, &
consuetudo, stanteq; eadem morbi constitutione, utrum
que consuluerit potum, necesse est aut uiriū robur, aut
cōsuetudinem, mutationem accepisse. Proinde cum ob-
seruemus in scriptis suis. Hip. ea semper recēdere signa
quæ uires laborantis imbecilles esse ostendūt, cū ab im-
becilli uirtute capturus est indicationē, sit manifestū,
quod cum scribit aut uinum aquosum, ijs ministrandū
iubet, qui uino per sanitatē perpetuo sunt usi, minime
aqua. Iis fidem præstat, quod quarto uolumine scripsit,
in simili morbi constitutione, imbecillitatis uirium cau-
sas apponens, cum dixit. His ita habentibus si uenter li-
quidus fuerit, absumens, & contabefaciēs &c. In qua
quidē morbi cōstitutione potus uinosiores ut diximus,
ratione imbecillitatis uirium administrare cōsulit. Tri-
bus igitur in locis uinū in acutis Hip. concessisse obser-
uamus. Primo, ratione morbi, ut cū dixit mulsam aut
uinum utrum magis auxiliaturum putaueris. Secūdo,
causa imbecillitatis uirtutis, ut cū dixit his habentibus
si uenter liquidus fuerit corpus absumens &c. Tertio,
ratione consuetudinis. Hoc est quod Gal. octauo de me-
thodo

Primo de
ratione ui-
tus.

4. Eiusdē
3. Eiusdē

DE VICTV FEBRICIT.

thodo dixit. Constat autem & Hip. non in diarijs modo febribus, uerum etiam in acutis ex ijs quæ de acutarum uictu prodit uinum dare & c. Ostensum igitur est quod cum consuetudo morbi multū urgentis indicationi dissentit, eū esse exhibendum potum, in quo minimū fit consueti multum uero curantis. Hunc dicimus aquosum consuetū. Vt uinū aquosum ijs qui uino sunt assueti. Quod si anglo ceruisiæ potui assueto acuta febris accidat, modicum ceruisiæ ei assuetæ multa aqua hordei misceamus & ei ministrabimus. Sed ut reliqua quisq; in promptu habeat, tabellam secundam apponemus, à qua facile horum singula haberi possunt. Sed illud scire oportet quod quæ de cōsuetudine loquentes hucusq; de frigida potioe diximus, intelligēda esse cū gratia potus assumitur, nō prout gratia refrigerandi, cū assatim semel exhibetur post morbi cōtiones. Ad cuius exhibitionem à consuetudine nullam sumendam fore indicationem ex Galeno supra ostendimus in locis quæ supra citauimus. Illud insuper aduertere oportet quod quæ de cōsuetudine hucusq; diximus, de maxima, & potissima consuetudine, intelligēda sunt. Consuetudo uero quam minorē nuncupauimus, aliquā nullas habet in indicatione uires. Vt qui aqua in potū non utitur ob eius frigiditatē & fluctuationem quæ ab eius usu percipit, febre acuta laboranti eam ministrabimus cōsuetudini nihil concedentes. Hæc si quidem quæ ab aqua contraxit uitia, immoderato acutæ febris calore castigantur. Quod si insueti potus incommoda à morbo corrigi non possunt, minor cōsuetudo in indicatione potus uires habet.

bet, sed priori inferiores. Sed raro accidit, ut damna curantis potus, à qualitatibus morbi contrarijs non corrigantur.

CVM A MORBO & CONSVETUDINE
potus indicatio sumitur.

	morbis maxime	multum	medio- criter	parum	nihil vr gens
consue- tudo	curans potus	aquosus consue- tus	imbecil- liter con- suetus	medio- criter cō- suetus	consue- tus po- tus

Reliquum est, ut cum omnia tria indicantia simul ad indicationem potus concurrant, sermonem conuertamus. Scire oportet quod cum virtutis imbecillitas, morbi vehementia, & consuetudo, ad indicationem potus concurrerint, accidere, ut plurimum ut duo indicantia in unum consentiant potum. Quapropter conuenientem potum ab altera duarum tabellarum elicies, ad hunc modum. Querere oportet ab altera illarum potum, qui potiori duorum indicantium, quæ in unum consentiunt conuenit. Eidem quæ addes, aut ab eo minues tertij indicationem. Ut exempli causa laborante Gallo febre acuta, cum uirtute multum ab imbecillitate urgente, omnia simul,
in

DE VICTV FEBRICIT.

*In tali constitutione potum indicantia concurrunt, nempe, uirtus, morbus & consuetudo. Duoq; eorum in unū uini potum consentiunt, nempe uirtus, & consuetudo. Morbus uero utrique dissentit. Quapropter potū quæ res qui uirtuti & morbo multum urgentibus cōueniat talem ex prima tabella imbecilliter roborantem esse inuenies. Tale est imbecille vinum. Huic iuxta indicationem consuetudinis addes. Quare in tali constitutio-
ne potum imbecilliter roborante fortio-rem exhibebimus, talis fuerit vinum quod imbecilli parum vinosius est, tale Gallo febre acuta correptum in potum ministrabimus. Rursus labor et Lusitanus febre acuta assue-
tusq; sit aquæ potui, uirtusq; eius multum ob imbecillitatem urgeat, cunq; consuetudo & morbus in unum consentiant potum, morbo & uirtuti multum urgentibus conuenientem potū quærito talem ex prima tabella imbecilliter roborantem esse comperies, à quo indicationē consuetudinis demam. Quare imbecilliter roborante infirmio-rem, laborāti Lusitano potum exhibebimus, tale fuerit vinū imbecilli magis aquosum. Diximus ergo cū omnia tria indicationem potus indicantia cōcurrant; duo ut plurimū in unū consentire potū, siue Lusitanus Hispanusue Gallus, aut Italus, aut Asiaticus infirmetur. Idq; eo maxime quod ij omnes altero duorū potūū nempe uino, aut aqua utantur. Sub aquæ appellatione, eas in quibus semina herbæ, aut radices per cocta sunt intelligo, ut aqua hordei capillorum ueneris aqua liquiritiæ &c. Quicumq; enim aquæ potui assueti sunt, is potus aquæ hordei insuetus dici non potest*

test

test, & si ea usus fuerit nunquam. Anglis igitur & ijs qui Flandriam inhabitant & superiorem Germaniam Scotisque multoties ægrotantibus accidit, ut omnia indicantia in potus indicatione dissentiant. Quin immo quoties Anglus soli ceruisie potui assuetus ab acuta capiatur ægritudine cum uirium imbecillitate, pugna inter omnia indicantia oritur. Morbus si quidem aquam ut curantem potum exposcit. Virtus ob imbecillitatem uinum ut roborantem, Consuetudo ceruisiam ut consuetum. Qua propter tali concursu aut tres omnes miscendi sunt potus, pro ratione indicantium. Aut uini modicum seorsum semel aut bis aut quoties expediat ad roborandam naturam exhibendum est, de inde mixtum ex simplici ceruisia & aqua secundum symmetriam, & morbo & consuetudini correspondentem potum, quoties opus fuerit ministrabimus. Primum modum non approbo, ob id quod non bene conueniant uinum & ceruisia insimul. Multo adhuc minus si uinum ceruisie quam allam dicunt misceas. Conflatur enim ex ijs potus qui facile acescat in sanorum uentriculis & corrumpatur, nedum eorum qui acuta febre laborant. Qua propter secundum modum insequendum esse opinor. Ut potum ijs qui ita laborant in duplicem partiamur. Altero uirtutis imbecillitati & morbo indulgebimus altero morbo & consuetudini. Vinum uirtutem diximus roborare, sed acuta febre maxime incommodum esse. Quare uinum aque decoctionis bordei & capillorum ueneris aut politrici miscbimus pro ratione primæ tabellæ. Addimus capillarem herbam, ut
simul

DE VICTU FEBRICIT.

simul cum hordeo coquatur, vt hordeū à corruptione seruet, & vt ne vini mixtione acescat. Secundum componemus, si ceruisiam consuetū egrotanti potum, aque hordei misceamus, iuxta rationem secunde tabellæ. Aqua si quidem hordei maxime cum potu vtriusque ceruisia conuenit. Quare quæ ex ijs mixtio fit, natura Angli acuto morbo laborantis maxime conueniens est. Hoc præceptū diligenter ab ijs obseruandum est, qui bona valitudine ceruisia quā allam vulgari sermone dicunt vtuntur. Iis si quidem cum ab acuto morbo capiuntur, incommodissimus est ceruisiæ potus. Mutari quidem tunc temporis ad alium consilium non est. Nam vt didicimus à Gal. repentina à consuetudine digressio, corpora non parum offendit. adduximus præterea supra ab eodem, egrotantē cui aqua vt dixit conueniens potus erat, ob inassuetudinem tamen per febrem non dedit. Cum igitur ceruisia incommodissimus acutæ febricitantibus sit potus, si quis ea bona valitudine perpetuo vsus fuerit, recte aget, si ceruisia multa aqua hordei commixta vtatur. Iis uero qui secunda valitudine medio potu ceruisiæ vtuntur trihapennū hijram dicūt, cū à febre corripuntur simplici ceruisiæ potu vti commodum est. Diximus si quidem hunc potū refrigerare, & meatus aperire. Quare qui ipso per febres vtuntur, trimestrem, defecatum, & quā maxime simplicem querant. Quique ex aqua fluente confessus sit. Hunc quidem in acutis febribus commodiorem ijs esse arbitror quā aquam. Quod si iam dictorum aliquod desit, cum aqua hordei hunc ministrare oportebit.

re oportebit. De potus indicationibus abunde à nobis dictum est.

CAP. XIII.

EXPERIAMUR an medici Lusitani in artis operibus methodū Hip. de ratione uictus insequantur, narremusque quam uictus rationem in febricitantibus dictam Lusitani uocant. Si quis febre corripitur, moto statim uentre inferiori per clisteriū, iure lentium aut cocta borragine cucurbitaue & similibus ad sextam diem ducitur. Qua purgante pharmaco adhibito pulli gallinacei iure, & carnibus alitur. In reliquum tempus hunc obseruant uictum, paroxysmorum aut exacerbationum diem cauētes ad morbi solutionē usque. Tenui magis uictu primis egritudinis diebus utuntur stante uirium robore. A purgatione autem, quam ut plurimum die sexta, aut octaua exercēt, crassiori uictu nempe capi aut pulli gallinacei carnibus febricitantes nutriunt. Id agunt, ubi nullum symptoma occurrat, à prædicto ordine eos perturbans. Hunc modum Lusitani & Hispanorum bona pars insequuntur. Sed ut ostendamus quantum à recta ratione & à mente simul Hip. alieni sint, operaprecium erit eorū audire rationes, & fundamenta, quibus inittuntur, ut his destructis sponte eorum labatur opinio. Ferunt nostra tempestate hominum corpora ob delicias, uenerē, & ob inordinatum uictum, superfluis abundare. Facile enim bis de causis accrescere uētriculo, intestinis,

M iocineri,

DE VICTV FEBRICIT.

iocineri, & uenis, excrementa. Communes uocant materias. Has, utpote propriam morbi effectricem causam fouentes, prius soluendas esse iudicant. Quæ in inferiori sunt uentre clisterio, quæ uero in uentriculo, & uenis, tum subtili uictu, tum pharmaco deiciente, quod non solum communes sed & propriam morbi materiã respiciat. Aiunt huiusmodi purgatione quam minora-
tiuam nũcupant, laborantes minus periclitari, imminuta quantitate propriæ materiæ. Cuius multitudinem ob iam dictas causas suspicantur. Hip. etiam hanc euacuationem quam inter initia morbi exercent, acceptã ferunt ex in Apbo. inchoantibus morbis. Gal. citãt dictum Hip. exponentem in hæc uerba. Ad hoc ut citius fiant coctiones, melius in principio euacuare, ut materiã minorẽ redactã, facilius natura coquere possit. Die sexta iudicantes naturam iam sibi separasse ex cõmunibus materijs bonum, parumque expulsionĩ appa-
rasse, farmacum ministrant ut naturam minus grauata celebris die critica offendant. A purgatione uires naturæ roborare conantur. Quam languere suspi-
cantur ob clisteria pharmacum & tenuem uictum. Quare sorbitionem ex iure pullæ gallinacæ & carnes eiusdem febricitanti apud sextam ministrant. Ut apud uigorem uires habeat natura, quibus morbo fiat superior. Sed usum sorbitionis apud diem pharmaci, approbant ex Hip. dicente cum autem purgaueris, sorbitionibus quibusdam utitor, obseruatis ita februm accessionibus ut nunquam &c.

Cap.

ED ut ostendamus quantum à ratione hæc uia
 deniat. Oportebit primum de minoratiua quam dicunt
 euacuatione parum differamus. Nam hanc suspicor
 præcipuam huius uictus occasionem esse. Hinc sumpto
 initio. Quamlibet artem construi, tum ex ijs quæ in
 uniuersum dicuntur, tum ex ijs quæ in partem, quæ sunt
 excepta, ab ijs quæ generatim dicuntur. In singulis præ
 terea artibus duo cõtینگunt errores, alter cum ea quæ
 in uniuersum dicuntur, in partem quis accipiat, alter
 cum ea quæ in partē, in uniuersum esse dicta accipian
 tur. Grauior quidem error hic priore est, summeque
 uitandus in arte medica, in qua crudele profectò erra
 re est. Concocta medicari & mouere, non cruda neque
 in principijs &c. Uniuersale dogma aut si maioris præ
 ceptum tres habet exceptiones. Quarum singula secun
 dum partem dicuntur. Nempe nisi sint furiosa. Item
 in acutis passionibus raro & in principijs pharmatijs
 uti. Præterea inchoantibus morbis &c. Horum singu
 la ab uniuersali præcepto excepta esse ex eo intelliges,
 quod dixit nisi sint furiosa. Item in eo in acutis passio
 nibus raro. Præterea in eo si quid uidetur. Cũq; sin
 gulos quos sanandos sumis, initio moueas pharmaco,
 innixus Apho. inchoantibus morbis nonne sententiam
 uniuersalem facis, cum ea Hip. particularē fecerit, in
 eo quod dixit si quid uidetur. At tibi forsā id semper
 faciendum uidetur. Cum tamen mens Hip. si quis rem
 exacte consideret fuerit, tribus affectibus nō oportere
 cõtensionem humoris ad eius euacuationem spectare.

M ij Nempe

DE VICTV FEBRICIT.

Nempe aut cum motu inordinato, aut qualitate, aut quantitate, aliquod uitæ discrimen afferūt. Primum intellexit, cū dixit nisi sint furiosa, per corpus inordinato motu uagantes humores ab ignobili ne ad nobilē & principem partem ferantur, timor est. Aliquando contingit humorem morbum efficientem adeo quantitate exuperare, ut merito timeat medicus, ne coctrix facultas sit coquendo aut expultrix expellendo*. Consulte agat medicus aut uenæ sectione, aut purgante pharmaco, utro magis auxiliaturo putauerit, humoris quantitatem inter initia imminuere. Antequā quæ à pharmaco euenire solet commotio, læsioni sit magnæ. Magis eo lædit tempore, quo iam calore putredinali et actione naturæ humores agitātur. Fit ut ob agitationē boni cum prauis simul educantur. Commotio insuper pharmaci in augmēto morbi causa est additiōis potius quā diminutionis prauorū humorū. Id manifestum qui libet existimabit, si opus naturæ intelligat esse coctiōe media separare bonos à prauis: & qualitatē putridi humoris esse, contactu afficere quibuscūq; obuiauērit, eos præcipuē qui à naturali calido haud commode reguntur. Quod si ijs addas, naturæ uires imbecilliores reddi ex pharmaco intempestiue exhibito, cuius proprium est, multum boni et prauī exiguum euacuare, intelliges quantum mali sit, perpetuo pharmacum sexta die exhibere, ni facile coniecēris, humorem quantitate adeo exuperantem esse, ut timeas ne uires naturæ superet. Quod si id indicas, non sexta die sed ab initio morbo inchoante euacuare expedit. Quod uero

uero citant dictū Gal. nempe ad hoc ut citius fiant co-
 ctiones melius in principio euacuare. Perperā de phar-
 macia intelligendum fore contendunt. Nā per euacua-
 tionē, uenæ sectionem intelligit. Hāc in principijs mor-
 borum adhibendam esse ait, ut materiam minorem fa-
 ctam, facilius natura coquere possit. Quod ipse osten-
 dit in expositione Apho. ubi cibus præter naturam
 intrat. Ubi ita scribit ὅτι δὲ κίωσιν μὲν ἀπλῶς αὐτοὶ λίγαν
 ἢ ἱσχυράτης ἔσται ὁμοίως ἅπαντες χυμοὶ κίονται, καθάρσιν
 δὲ, ἔσται ἡ μόχθη κατὰ ποιότητα μάλιστα καὶ χρεῖ. Id est
 quod autem euacuationem simpliciter consuevit Hip-
 appellare cum humores omnes equaliter euacuuntur,
 purgationem autem quando mali sunt secundum qua-
 litatem meminisse oportet. Et infra ait, declarans id
 quo maxime humores omnes equaliter euacuuntur.
 Euacuatio inquit, omnium humorū equaliter quæ ex-
 quisitissima est, fit per uenæ sectionem. Vnde ex ijs ma-
 nifestum est per uerbum κίωσις euacuationem omniū
 humorum equaliter, quæ per uenæ sectionem fit, intel-
 ligendum esse, & non eam quæ per pharmacum fit,
 quam Hipp. & Gal. καθάρσιν nuncupare consueuerunt
 & non κίωσιν. Sed eundem undecimo de methodo me-
 dendi audi, eadem quæ hic de uacuatione in principijs
 morborum retulit, de uenæ sectione dicentem. Cum
 ergo de uacuatione in febribus quæ à putrido humore
 ortum habent ageret. Saluberrimum, inquit, non so-
 lum in continuis uerum in omnibus quas putrescens ac-
 cendit humor, uenam incidere. Leuata enim natura
 ab eo quod uelut sarcina premitur, quod reliquum est

DE VICTV FEBRICIT.

potentius coquet & expellet. Verbum igitur mouere quod in Apho. inchoantibus morbos est, de uenæ sectione maxime intelligendum est. Aliquando uero de purgatione ut scriptum est à Gal. in expositione. Cum ait si quid uidetur mouere, sunt autem hæc maxime uenæ sectio aliquando uero purgatio. Vnde ex ijs colligi licet, sæpius exercendam esse uenæ sectionem inchoantibus morbis, quam purgationem. At ij contrariū agunt purgationem quibuscūq; in morbis perpetuo inter initia adhibent, uenæ sectionem aliquando. Sed in acutis saltem errorem esse fatebuntur. Nam raro in acutis passionibus expedit in principijs pharmacis uti. Quod si die sexta, aut octaua transactum principium in acutis esse dicant cædo. Sed cum status iam instet, grauiori noxa naturā afficiant ut supra ostendimus. Ob id enim dixit inchoantibus morbis. In acutis uero quantum periculose sint purgationes tum ob medicaminis qualitatem, tum ob cōmotionem, declarat Gal. quarto de ratione uictus in expositione illius uerum si ad hæc non aperiatur. Tum nō minus oberrores qui perpetuo in huiusmodi purgationibus cōmittūtur, quos magnas in acutis parere offensas ex Gal. supra ostendimus. At uenæ sectio minus errori obnoxia est. Quinimmo nec eius occasione nec quantitatem errabit doctus & diligens medicus sanguini missioni assistens, sola ex pulsu facta coniectura. Quare in re Dionysius medicus pater meus facile omnes sui tēporis medicos superauit. Perspicuo ex pulsu putridum sanguinem dignoscēs. Quod quam medico possibile sit sensu assequi, & ad opera deducere.

deducere, testabuntur Angli qui mea usi sunt arte, de quo alibi nobis sermo erit. In acutis ergo morbis raro pharmacijs utendum est, nec in eorum principijs, nam commune in ijs præceptum Hip. est uenam incidere, sola indicatione sumpta à magnitudine morbi. Quare Apho. in acutis passionibus raro, exceptio est duorum communium præceptorū, nempe illius quod nobis tradidit quarto de ratione uictus ubi scribit. In acutis morbis sanguinem detrahes si uehemens morbus uideatur &c. Et præcepti concocta medicari. Prout enim inter initia acuti morbi pharmacum ministramus, commune frangimus regulam concocta medicari. Ut uero uenæ sectione non utimur, contra præceptum demittendo sanguine in acutis agimus. Ob quā causam dixit & hoc prius bene dijudicātes facere. Hoc est an pharmacum magis competat phlobothomo, quod quidem ualde necessarium & acuto morbo maxime cōueniens dixerat. Sed quando liceat in acutis pharmacum exhibere alibi ostendemus. Dixit ergo in acutis passionibus raro & in principijs pharmacijs uti, ac si uelit. In acutis raro purgante medicamento utimur, quia ut plurimū sanguinem in ijs mittere maxime necessariū est. Quapropter discernere oportet, an pharmaco uti maiori cōmodo possis, quā sanguinis missione. Cum ergo hæc ita se habeant, fieri non potest ut perpetuo id quod sexta, aut octaua die pharmacum adhibent, recte et secundū rationem ministrent. Vere ita res habet, quod non paucos absque ulla purgatione sanauerim, & multo plures quibus nec quarta, sexta, nec octaua, pharmacum

DE VICTV FEBRICIT.

r. de mor-
bis vulg.

purgans exhibui, sed in morbi inclinatione, uatura in completam crism faciente. In continuis febribus raro quantū memini occasione inueni exhibendi pharmacum inter morbi initia, nedum apud incrementū. Febris. n. continua est, quæ proprie & maxime acuta est egritudo, ut tradidit Hip. Ostensum igitur est purgationē non esse ex usu quæ perpetuo quibuscunque in morbis die sexta aut octaua fit, quare & uictū qui purgationem consequitur. Quod aut de cōmunibus dictum est materijs, nō iusta occasio est à recta deniādi. Quod si ob multitudinem earum nec clisteribus uec syrups digerētibus absorberi posse iudicat medicus, quod rarum est, potiunculam cassiæ ex oximelite initio dare expedit: aut eiusdem tres bolos deuorandos ei qui potionem fastidiat. A quibus quinque oximelitis aut syrups quem acetosum uocant coclearia deglutire cōmodū erit. Sic. n. bilem & pituitam leniendo educit. Nec erit impedimento quo minus rectam uictus rationem ab initio ad uigorem usque instituas. Sed mihi admirari saepe contingit, quod nostro seculo infelici omne communes materia antiquis temporibus non uise, compariere. Aut si erat, non tanti certe habebatur.

C A P. X V.

SED ad reliqua propositi sermonem conuertamus Primis quinq; aut sex diebus febricitantes tenui magis uictu alere, deinde cum morbus propè uigorem est solidiori cibo pascere, omnino præter rōem est. Minus si quidem natura cibo impedienda est, cum morbi ui instimulata, circa morbi materiae coctionem impen-
sus

fus uacat. Vt scite à Gal. scriptū est. Prudens igitur 1. Aphor.
 medicus ad ciborum coctionem, naturam tunc tempo-
 ris ab opere non distrabet. Quinimmo ab ijs quos ante
 ministrabat cibis subtrahet. Vt cibus quacunque leui
 naturæ actione transmutetur. Qui si crassior esset na-
 tura alio intenta corrūperetur. Aut certè laboranti
 naturæ superadderet laborē. Omnis insuper mutatio
 disproportionalis si repente fiat, sanis molestā est, qua-
 re multo magis egrotantibus, ut supra ostendimus de
 mente Hip. Cum ergo uirtus laborantis die sexta, aut
 octaua imbecillior sit, quā erat in initio, minus cibi fe- 2. de ratio-
ne victus.
 ret tunc tēporis natura. Quare ut recte mutatio fiat,
 mutare cibum pro ratione ad magis tenuem oportet.
 Quod si aliter, disproportionalis fiet mutatio, nō parū
 naturā agrauans. Ipsa. n. à magis robusta, prout erat
 in initio, ad magis imbecillē, prout est sexta, aut octa-
 ua die acuti morbi mutationem habuit. Ratio autem
 uictus contrario, nempe à magis tenui ad crassiorem
 mutata est. Quapropter nullo pacto credendum est,
 naturam posse ex huiusmodi uictus ratione iuuari.
 Insuper mutationes insignes in cibo ab initio morbi
 ad statum usque faciendas non esse supra ostendimus.
 Pessimam omnium & magis grauāntem naturā, quæ
 à tenui uictu ad crassum repente fit. Ad hæc, Hipp.
 commentario secundo de ratione uictus aperte dam-
 nat eam uictus rationē qua primis egritudinis diebus
 inaniantur egrotātes, deinde ad sorbitiones, antequā
 morbus iudicetur transeunt. Cuius uerba ita. haent.
 Melius si quidem esse dico ut protinus à morbi initio
 sor-

DE VICTV FEBRICIT.

sorbere incipias quàm inanitis euacuatisque uenis, uel die tertio, uel quarto, uel quinto, uel sexto, uel septimo, si ante hoc tempus morbus haud quaquam indicatus fuerit, sorbitionem inchoare. Præterea ipse eodem libro in expositione illius hoc autem uerius efficaciusque, ita scribit. Sed sanè deterius aget, qui omnibus ijs diebus uasa ante examinauerit, & sequētibus quibusdam diebus ita pauerit priusquam morbus maturus reddatur. Nempe hoc pacto mortē plurimis liquido affert, nisi morbus omnino beneficus fuerit. Quæ uero in principio committuntur delicta ea non similiter domantibus renituntur, sed facilius domari possunt. In quibus uerbis aperte nobis ostendit maximum periculum esse in acuto morbo primis quinque aut sex diebus tenui uictu egrotantis uenas inanire, postmodum morbo adhuc non maturo ad ea quæ comeduntur transire. Ipse præterea eam mutationem damnavit quo ad sorbitionem transitus fit à magis tenui uictu. Cum ait de mutatione quæ in hac uel illa fit, plurima sum locutus quod re uera hæc nouisse commodissimum sit, cum ad omnium ad id de quo nunc agitur. Nam in morbis acutis ex uasorum inanitione ad sorbitiones transitur. Transeundum quidem præcipio ego sed sorbitionibus haud quaquam utendum, prius quàm morbus ad maturitatē perductus fuerit, aut signum aliquod aliud apparuerit &c. Vides ad sorbitiones transeundum non esse à magis tenui uictu antequam morbus maturuerit nedū à iure lentium aut à cocta cucurbita ad capi aut pulle gallinaceæ carnes, quæ crassum uictum constituunt. hu-
iusmodi

iussmodi se habēt uictus, quos febricitantibus ministrāt occidentalissimi medici. Qui quantum ab eo quod febricitantibus conuenit, aberrant, & à uera Hip. mente satis ostensum est.

CAP. XVI.

MAGIS Anglorum medicorū uictus ratio præceptis artis medicæ consentit. Vnica si quidem uictus forma febricitantes ab initio ad morbi solutionem nutriunt. Ius pullæ hoc modo parant, Ante diem mactant quam crassam elegerunt. Deinde bordeo præparato prunis, passulis, buglosa, endibia, uiolis, & huiusmodi herbis, coquiunt, plus satis, ita ut ius spissum reddatur hac sorbitiuncula non solum febricitantes sed eos qui alijs detinentur affectibus nutriunt. Hunc uictum à morbi initio ad manifestam usque inclinationem ministrant. Antiquorum regulas maiori se cura obseruare ostendunt. Tum quia unica uictus forma à morbi initio ad statum usque procedunt citra per mutationem insignem, tum quia sic agentes læsionem quæ ex uictus forme mutatione egrotantibus euenire solet, effugiunt. Secundum ex libro secundo de ratione uictus colligunt. Primum ex Gal. eodem libro in expositione illius interdum autem et cruda &c. Vbi ita scribit uniuersa inquit, hæc contingere his ait, qui perperam cibati sunt à medicis, qui primis diebus exiccatos egros die tertio, uel quarto. uel quinto, uel sexto, repente ad edulia non peractō morbi uigore permutauerunt. Quasi peractō morbi uigore conuenienter eos uictū permutasse dicat. Quod autem dicebat

DE VICTV FEBRICIT.

dicebat permutare quidem sanorum uictū in morbis, neque tamen temere id agendum, iam patere ex dictis arbitror. Nempe cū una quidem corporis conditio sani sit, altera quæ à morbi initio ad statum usque extenditur. Mox & tertia, quæ ad perfectam morbi solutionem sese prorogat. Deinde & quarta quæ totius conualescentiæ tempus ad usque sanitatis habitū occupat in nulla harum quatuor conditionum permutationem uictus insignem facere oportet, nisi prius in alteram conditionis species peruentum sit.

C A P. X V I I.

S E D quo magis antiquorum dogmata insequi eo modo conantur, eo grauius Anglos ledunt ægrotantes eorū uires exoluentes. Angli animo & corpore uigēt cibi, & potus, multum & crebro ingerere assueti. Assuetudini aut cum aliquid concedendum nos doceat Hip. colligitur non esse dictam uictus rationē quibus cunque in febribus certā, sed nimis tenuem, sumpta indicatione ab assuetudine, regione, & celi temperie. Corpora si quidem quæ multo & crasso utuntur uictu, prospera ualitudine, simplici sorbitiuncula alere, tribus morbi temporibus, haud iustum est. Nam uerendum est ne corporis uires labantur ob defectum. Nec obstiterit quod supra in inuestigatione formæ uictus cōsuetudinis non meminimus. Nam & si uere formā uictus consuetudo non per se indicet, interuentu tñ uirtutis indicare uidetur. Nam Crasso uictu assueti, tenui si aliquot diebus utantur, imbecilles fiunt. Quapropter supra cum de uirtutis robore quereremus, cō-

sue-

suætuðinis mentionem fecimus . Ita ut eorum uirtutes qui multo et crasso uictu prospera usi sunt ualetuðine, ob id parum urgere ac si imbecilles sint , posuerimus . Regio præterea ad quinquagesimumquartum gradum uersus boream uergens cum frigida ualde sit , calidum innatum intra uiscera colligens fortius reddit . Vnde crassiori indigent alimento, tum ob hoc, tum ut frigori continentis ualidius obsistat . Quod autem à frigida regione similis sumatur indicatio ac à frigido tempore, ex eo fit manifestum, quia uires ualidas similiter efficit, & consimiles in corpore humano creat humores . Sed hyberno tempore multa quidem propter robur uirium & raro danda sunt . Vt scriptum est à Galeno in expositione Apho. quibus semel aut bis . Consimiliter igitur ijs qui frigidam regionē incolunt, plus cibi quàm quod morbi natura exposcat, ministrandum . Illud regioni & consuetudini concedentibus medicis . Gaudere enim semper naturam consuetis dixit Gal. octauo de Methodo ex autoritate Hip. Sunt præterea quamplurime acutarum ægritudinum quæ adeo tenuem uictum non ferant . Præter acutas febres quas tropicas appellant medici, quibus non competit, sunt et quæ die undecima, & tertiadecima, et quartadecima terminantur, quibus perscriptus uictus non est ex usu, non Italo, non Hispano, si aliqua supra dictarum febrium specie laboret . Cum uterque eorum partius secunda ualetuðine uiuat . Quod si febrem ponas esse ex ijs quæ longiorem habeant terminum, recte profectò colligetur Anglos ægotantes à tenui uictu grauiter lædi . Ea si quidē impenſe

DE VICTU FEBRICIT.

pense grauis noxa non est, qua morbus uires assumit, sed quæ uires, quibus natura morbo oppugnat, adimit.

CAP. XVIII.

SED non deerit fortasse errandi occasio. Anglos bona uale tudine inordinato aiunt uti uictu, uentresq; eorū ob id crudis humoribus redundare. Hos cū agrotant tenui uictu absumi oportere iudicāt. Fouent enim iniquiunt propriam morbi effectricem causam. Sed res aliter habet ut existimo. Ventres anglorum non crudis sed prauis aut semicorruptis humoribus abundare opinor. Quod si crudos eos dicas, quos natura non euincit cado, & appellationem non moror. Sed eo modo quo Hip. solet, cruda nūcupare excrementa, nempe flauam bilem & reliqua quæ corpus alere non ualent. Eos prauos esse dico, qui post coëtricis facultatis actionem nutritioni permanent inepti, cōsimilem à natura mutationem recipientes ac excremēta. Eos ineptos nutritioni signum est, quod ieiunium haud facile ferant, quorum enim uentres crudis abundant humoribus nutritioni aptis facile ieiuniū ferūt, siue assueti sint multum aut parum ingerere. Vt scite scripsit Hip. in hæc uerba, nō assuetam inquit cibi abstinentiam, facilius omnino ferunt, qui parte superiori pituitosi sunt. Quo fit ut, si semel die, cibo utantur, facilius etiam ferant. Rationem assignans Gal. ad hunc modum scribit. Pituita uero temporis processu coquitur, sanguisq; efficitur. Vnde facilius ieiunium ob pituitæ in sanguinē conuersionem ferunt, id longa docente experiētia. Augumento ergo dialectico, quod à negatione consequentis dicunt,

2. de ratio
ne victus.

dicunt, perspicuo apparet, eorū qui ieiuniū difficulter ferant uentres carere humoribus aptis, ut nutriant. Vnde manifestum fit humores quibus eorū uentres abū dant, alimoniam aptos non esse. Ratio vererem ita esse ostendit. Et si hæc sola si satis, ut de re certa habeatur scientia, alia adducemus obiter signa ut pusillanimes ad rem percipiendam confortemus. Cum humores in uentriculo contenti, laudabiles sunt, halitus qui ab ijs ad caput feruntur humidi sunt nullusq; prauæ qualitatis participant. Cunque per poros capitis & faciei effluunt, nulla in transitu particulas extranea afficiunt qualitate. Cum vero parui fuerint, & uentriculo diu insederint, necesse est partes eas quæ ab eo per consensum affici solent, similiter afficiantur. Facies igitur halitus à uentriculo ascendentis qualitatem haud obscure indicat. Corpora igitur Anglorum si circumspectas pulchra esse videbis, alba & leui cute eorum membra obduci. Faciem vero eorū quorum uentriculi crudorum humorum congerie grauantur obscura rubedine, pustulis conspersam, lacera multis in locis cute intueberis. Similem in quo videas faciem crudisq; humoribus grauari eius uentriculū quem iandiu conquerentē audias nōne recte colliges cōiectura habita ex facie eius humores prauā nactos esse qualitatem lōga in uentriculo mora. Halitusque inde ascendentes, faciem inspicere. Vt id calido iocineri quis tribuat, sanguinē biliosum efficiēti talēq; ad corporis particulas mittenti, fieri nequit. Nam cū materia quæ totū nutrit corpus, à naturali mutata est symetria, necesse est ut singulæ corporis

par-

DE VICTV FEBRICIT.

particulæ lædantur cum facie . Quod si adhuc insistas. Sanguinē biliosum aut magis natura excoctum, facilius ad superiora uergeret, cædo. Sed fieri nequit temporis longitudine ad totum corpus quum uitiū permeet. Id præterea senibus crebrius accidere q̄ iuuenibus uidemus, quibus minus causæ est quod biliosum generent sanguinem. Ventres tamen eorum crudis abundare humoribus non extra rationem est. Verum est quod quibuscunq; talis facies futura erit humorum in uentriculo congestorum occasione, immoderato opus est calore, tum ut humores corruptioni disponat, tum ut ab eis fumosos educat halitus, qui faciem maculent. Senibus igitur immoderato uini usu immoderatum calorem intra uiscera excitante, talis generatur facies & non ratione calidi iocineris. Quibuscunq; igitur talis affectus accidit materiam à uentriculo prauæ qualitatis suppediari, calorē uero efficientem uel ab iocinere uel ab ipso uentriculo adscititiū certū est. His fidem præstāt, cibos & potus quibus utuntur, aptissimos esse ut in uentriculo corrumpantur. Vino & ceruisia quam allam uulgari sermone dicunt ad unam mensam utuntur. Potus. n. ceruisiæ, cum statuosus natura sit, uini consortio magis inflatiuus redditur, ita ut caput magis impleat & feriat. Butyro præterea salsis cū piscibus uestuntur . Ita fit ut aduersantibus ciborū & potuū dissimilibus qualitatibus, tota mixtio corruptioni fiat obnoxia . Rōne igitur quispiam asseret, eos non crudis solum, sed & uitiosis abundare humoribus, minime ad nutritionē aptis.

Audi

AUDI quo rem deducam. Aegrotantibus Anglis tenuem uictum ministrare medicos ob id quod eorum uentres crudis redundant humoribus quos ita absumi sperant, errorem esse arbitror. Victū tenuem ministras ut humores in uētriculo redundantes absumas. At ij cum à propria mutati natura, prauamque nacti qualitatem, nutrire non ualeant, ut ostendimus, fit, ut prauos humores morbum efficientes natura (alioquin multum temporis uentriculi coctioni impendere assue ta) ad expulsionis opus parante, alter natura hostis insurgat, ipsam multitudine & praua qualitate & ob sedis nobilitatē grauiter perturbans. Præter id quod à propria morbi effectrice causa laboris patitur. Quod si naturam duplicis hostis in cursu grauata, uiriumq; robore indigentem, accedens medicus contra consuetudinem agens, tenuem uictum offerat, spontemq; reddat imbecillio rem, nonne merito non medicus sanans sed occidens, non adiutor natura sed egritudinis dicetur. Sed ut nulla aduersario super sit spes, constituamus hominem ex corruptione humorum ægrotantem, cum robore uirium. (Corruptos humores eos dico qui à natura propria migrantes nutrire non ualent. Quales Anglorum esse supponimus, qui diu uentriculo infederunt.) Sumpta solummodo ab ijs indicatione, parū an multū raro aut crebro huic cibum offeres. Medicus Anglus modicum iuris pullæ gallinacæ conuenientibus herbis decenter temperari bis aut ter in die ministrabit. Aut quam dicunt hypofetalam. Aut analberi, aliud sorbitionis

DE VITV FEBRICIT.

tionis genus, quæ parum alimenti præstant. Quid si Gal. audias contrarium dicentem, nonne deinceps mutabis sententiam & Anglos in posterum egrotantes crassiori victu ales. Ille igitur in espositione Aph. quibus semel aut bis ita scribit *αὐτὸς μὲν ἐνδείασι ἢ διαφθορᾷ τῇ δυνάμει ἐργῶμενα τύχοι, καὶ πολλὰ καὶ πολὰκις σιτία τοῖς νῦν καμνοῦσι δοσομεν, ὥς ἐν καὶ τῆς διαθείσεως διωμένης πολλῶν καὶ τῆς δυνάμει κρατῆν αὐτῶν δυναμένης.* Hoc est si cum indigentia aut corruptione facultas robusta fuerit, & multa, & multoties cibaria ita laborantibus dabimus. Vt pote multa exigente dispositione & facultate illa vincere potente. Sentis ne dispositionem quæ ex humorum corruptione accidit, non modicum cibū indicare. Sed eundem in eodem audi dicentem. Si facultas inquit laborantis imbecillis fuerit, & ea quæ in corpore est dispositio ex corruptione sit uel indigentia, paucum alimenti his, & sæpius dabimus. Parum quidem quia semel totam multitudinem alimenti sustinere nō potest facultas debilis. Sæpius autem quoniam multis indiget dispositio. Indigentia si quidem adiectione indiget, corruptio uero epicrasi. Hos enim qui cum virium imbecillitate corruptione humorum laborāt, docet Gal. curare in lib. de Metho. medendi, paulisper noxios humores vacuando, & decenti victu laudabiliores semper apponendo. Curationē hāc per epicrasim fieri nuncupat. Quod cū viriū robore, & corruptione humorum, hominem crebro multū cibi & potus assuetum ingerere, ponas, præter hæc, in regione frigida qualis est Anglia,

iudicas ne hunc exiguo & tenui victu alendū fore an multo & crasso, indicationibus tribus in id consentientibus, nempe corruptione humorum, consuetudine, & regione. Ego quidem multum ijs & crebro exhibendū esse arbitror. Nisi obstant paroxysmorum aut exacerbationum inuasiones. Quod si contingat, rarius multū ijs ministrare oportet. Nec hoc præter mentem Gal. est, qui in expositione dicti Apho. ita scribit si uero accessiones nō permiserint nec multi alimenti offerēdi occasiones præstiterint, raro plura exhibebimus, sic quidam transtulit. Aliter tamen habet graecum exemplar nempe. Μηδὲ πολλὰς τῆς τροφῆς ἡμῶν καὶ πρὸς παρῶντων ὁ λιγυρὸς δόσους τὰ πολλὰ, hoc est neque plures ad cibum offerendum occasiones habentes raro plura dabimus. Et uere ita res habet, nam accessiones non solēt plura cibrationi opportuna tempora præstare, præcipue si longæ sint. Velim quisquis hæc legerit sibi persuadeat, me hæc scribere, non ut in medicos Anglos inuehar, sed ut ueritatē omnibus aperiens, simul & Anglis amorē quo eos hucusq; prosequor ostendam. Daboque operam ut absens, calamo efficiam, quod præsens apud nos præstabam. Clarissime uir Thomas Aldea totius Angliæ cancelarie dignissime unicum Anglorum Decus, Ioannes BaKer primitiarum cancelariæ humanissime, in paternarum legum peritia prudentissime, recti immobilis trutina, uobis hæc commentaria de uictus ratione conscripsi, uestra gratia tueamini. (Scio nō deerunt detractores) speculatio tamen cū hominibus ex usu maxime sit, si uestra gratia apud Anglos commen-

N ij detur,

DE VICTV FEBRICIT.

detur erit, ut ad hominū manus libellus ueniat, legatur, quod reliquum est speculationis utilitas præstabit. Hoc quicquid est uobis dicare decreui, ut beneficiorū animum meum nunquam immemorē ostendam uobis. In quibus uirtutū singulare exemplar situm esse scio. Beatam rem publicam in qua ad honores tales euebuntur uiri. Sed beatissimā si uos ad magistratus culmem euectos, diu substitites foueat. Sed ad reliqua propositi redeo. Obijciat nobis *Anglus medicus* illud *Hip.* non pura corpora quantuncunq; nutries magis lades. Qualiter ergo eos qui ex corruptione humorum laborant adiectione indigere asserimus. Prauos humores aliquādo in uentriculi capacitatem cōtineri, et quandoq; inter eorum tunicas, et eorum aliqui crassi & lenti sunt, aut tenues, quandoque quiescentes, uentriculo inherent, aut mouentur intra eius capacitatem. *Hipp.* sermo de ijs est qui in spatio uentriculi, aut in uijs per quas com meatibus humoribus continentur. Qui in prædictis locis tumultuantes praua qualitate cibum nuper aduenientem corrumpunt. Vnde fit ut cibo talia non corroborentur corpora. Nobis uero de ijs qui intra uentriculi tunicas crassitie & lentore pigri continentur, sermo est. Quorum causa non est quod corpus non nutriatur: Sed aliter dicamus. Posito uirium robore in duobus æquali, & paribus cæteris, eorū alter corruptione humorum laboret, alter ex multitudine eorum qui laudabiles sint. Cui nam eorum plus cibi concedas. Ego quidem sentio cum *Gal.* corpus humorum laudabiliū multitudine grauatū, multū inuari inedia, aut modico cibo.

bo. Alter uero ex his deteriore fieri. Nam corrupto-
rum humorum praua qualitas naturæ vires dissoluit.
Quare inediam si his aut tenuā uictum iniungas, mul-
tum profectò imbecillio rem reddes. Quia tamen eueni-
re potest ut ob prauā humorum qualitatem cibus corrū-
patur, præsertim cum in uijs cibi fuerit adhibere pur-
gationem consulit; antequam resicienti uictu conuale-
scentiam corpora nutriamus Hip. causam reddens qua-
re corpora eorum qui cibum assumpserunt non corro-
borentur, ait, quod eorum corpora nō pura sint, uacua-
tionēque indigeant, ut corpus sumpto cibo corroboretur.
Nobis uero in præsentī de ijs sermo est qui intra
uentriculum diu inherentes nutritioni corporis non ob-
stant. Quod ex eo manifestum est, eos non obstante hu-
more uentriculi, ex cibo & potu iuuari. Quod argu-
mentum est, aut humores intra tunicas uentriculi esse,
cibum aduenientem nō tangentes, (cui adhæreo sentē-
tiæ) aut si in capacitate uentriculi sint, ob eorum pi-
gram crassitiem & lentorē haud quaquam posse adue-
nientem cibum multum inficere. Corruptio igitur hu-
morum non indicat inanitionē ut arbitratus est oriba-
sius in expositione Apho. corpora non pura. &c. Sed
potius cibi adiectionem; ut manifeste à Gal. scriptū est
in fine dicti Apho. quibus semel aut bis. Autumno ue-
ro, inquit morbi qui ex corruptione sunt assimilantur.
Quapropter qui eo febricitant tempore continua opti-
mi indigent adiectiones, & si vires ualidæ fuerint sæpe
& multa, si uero imbecilles pauca & sæpius afferemus.
Anglis igitur cum humores ij qui uētriculis eorum in-

DE VICTV FEBRICIT.

herent & crassi sint & lenti aut inter ambas uentris
tunicas collecti, aut certe quiescente, non est quod te-
nuis uictus ministretur. Quinimmo danda est opera,
ut cum huiusmodi corpora febre detinentur, aut alio
morbo uires eorum quoad fieri possit seruemus. Vt na-
tura, multitudinem humorū manuteneat. Si. n. ob im-
becillitatē imbecilliter eis dominetur, facile in eis febrī
lis concipitur calor, ob prauā eorum qualitatem. Vnde
fit ut præter propriā morbi materiā, aliam denuo mor-
bificam causam suppeditet uenterculus, prima multo
tenaciorem, & seuiorem. Caute ergo cum ijs agendum
molliterq; tractanda sunt huiusmodi corpora, & cras-
siori uictu quā pro morbi ratione sunt alenda. Eua-
cuatio etiā talis adhibenda his est, ut propriam morbi
materiam solum respiciat, incommotis ijs qui in uen-
triculo commorantur humoribus. Hos enim securius
bona ualitudine tractabit medicus. Hoc meo discrimi-
ne didici, crassiori uictu hmōi corpora alere, & leuius-
culis purgationibus subducere, in quorum uentricu-
lis multitudo frigidorum humorum diu congesta est.
Semper diligenter præcauens nequi in uentriculo sunt
humores morbosam affectionē cōcipiant. Tribus ergo
indicationibus in crasso uictu consentientibus, iudicas
Anglū exiguo & magis tenui uictu, posito morbi acu-
mine equali nutriendum quā Hispanum aut Italum.
Ego quidē arbitror crassiori & ampliori cibo Anglos
indigere. Scioq; optimos quosque medicos probaturos
sententiā meam. Nā nullam mihi legitimam reddes ra-
tionem ob quā causam magis tenui cibo, & eius mino-

et copia egrotantes Anglos nutrias, posito equali morbi acumine quam Hispani medici egrotantes Hispanos, aut Itali Italos, qui alioquin magis tenui indigerent, tamen ob calidam regionem tum maxime ob id quod partius secunda uiuunt ualitudine. Manifestum igitur est hunc uictum Anglis uirium esse detrimentum et labefactionem maximam. Nec illa in ista errandi occasio est, ob fugiendam mutationem in uictu, febricitantium robur simplici iure multis diebus absumere. Profecto grauior error est, quo natura uires exoluimus, quam quo morbo fometa ministramus eque urgentibus uirtute et morbo. Nec omnem damnauit Hipp. mutationem quae in uictu ratione apud egrotantes fit, sed solum repentinam et disproportionalem ut in superioribus dictum est. A tenui igitur uictu egrotantes Angli grauius leduntur. Cuius argumentum est sudores qui non raro bis, per febres circa caput et collum accidunt. Quorum causa praecipua, uirium est imbecillitas et non morbi acumen. Nam huiusmodi sudores in acuta aegritudine et in mitiori contingere solent. Vt ab Hipp. scriptum est cum de sudoribus qui circa caput et uultum et ceruicem fiunt loquitur. Quos in acuta aegritudine et mitiori posse contingere ait. Imbecillitas uirtutis ergo est quae praecipue hos operatur sudores et non morbi acumen. Anglis igitur hoc crebrius per morbos accidere quam sibi uicinis Gallis Hispanis aut Italis a duabus causis nempe, ob uictus tenuitatem et eo quod cubiculis aerem uelut carcere occludunt euenire putandum est. Tenui si quidem uictu cito labuntur corpora multo cibo assueta.

1. praecisionum.

BRVDI LVSITANI
DIONISII MEDICI
FILII
DE VICTV FEBRICITANTIVM
AD ANGLIOS.
LIBER TERTIVS.
CAP. I.



ED tempestium est, ut de
victu agamus qui singulis
febris conueniat. Ex-
emplis si quidem manudu-
cere lectorem oportet, ut
facilis fiat sermo. Causus
cum à biloso ortum habet
humore si cum robore vi-

rium adsit et ager tali sit habitu, ut non facile exolu-
tur, potu nutriatur, ut dictum est. Hordeum medio-
cris etatis plenum, album, exutumque ab utroque cor-
tice coquito in aqua fontis, quæ aut coctione aut longa
mora residentiâ fecerit. Sit que hordei pars una aquæ
partes viginti. Bulliat tandiu, ut inflatur hordeum &
rumpatur. Collatum propina cum opus fuerit. Hic po-
tus erit egrotantis uictus. Quod si sitim non sedat.
Preparato eundem potum & hora una antequam ab
igne amoveas recentes violas mediocris magnitudinis
infi-

Aqua hor
dei.

Aqua hor
dei cum
uirtute
violatum.

inſimul coquito, à collatura parū zucari miſceto. Eli-
gito pruna cuius ſapor medius ſit inter dulcem & ace-
toſum, ita ut nulla participant adſtriſtione. Coquan-
turque in aqua quæ prius per ſe ante ebullierit, ſitque
prunorum pars, una aquæ partes duodecim coquantur
tandiu, ut pruna tumefcentia rumpātur. In eadem te-
ſta qua coſta ſunt potum ſeruato. Dato cum modico
zucari ubi oportet. Aquam per ſe coquito ad tertias,
cunque ſubſidentiam fecerit ad aliudque uas collatam
effuderis, ſyrupi acetofi imbecillioris partē unā, aquæ
partes quindecim miſceto ad lentum ignem ſpumā au-
ferendo tandiu ut permisceantur adinuicem. Quia ue-
ro non omnibus una placet mixtio, conſulto egrotantis
palato prædictum ſyrupum magis aut minus acrem ef-
ficito, plus aut minus aquæ miſcens. Idem cum ſyrupo
violarum efficies, ſi tibi cōmodum uidebitur aut alijs.
Quod ſi de viribus egrotantis non fidas, ut ſolo potus
perdurare poſſit ad criſis horam, aut & ſi in præſenti
vires conſtent, nihilominus times futuram imbecillita-
tem, aut quia homo raro habitu eſt, aut conſuetus alio
quin multum ingerere, horū uerique talem exhibebis
viſtum. Aquam hordei ut ſupra parato tandiūq; hor-
deum coquito ut rumpatur, lintheo raro hordeum ſu-
ſcipito, fortiterque exprimito, ita ut totam hordei me-
dullā exire facias, hanc multa aqua hordei miſceto ut
tenuis fiat ſorbitio, eſt cū pauco zucaro exhibitō. Sy-
rupi acetofi acris ſi tantum miſceas ut aliquid acetofi
habeat izm dicta ſorbitio, faciasque ut modicum bul-
liat, optimū cibum huic febri efficies. Idem cum pru-
nis

Decoctū
prunorū.

Potus ace-
toſus.

Piſane te-
nuis ſorbi-
tio.
Acris pi-
ſanæ ſorbi-

DE VICTU FEBRICIT.

Panarella
acetosa.

nis efficere possis. Micam panis mediocris ætatis à fure
fure sinceri ad paruulas partes radito, in aquam infun
dito frigidam, digitisq; confricato terq; aqua innoua
to, deinde coquito in aqua hordei uiolacea, cumq; utrū
que permixtū fuerit, infunde succi granatorū acetoso
rum & zucari singulorum tantum ut ægrotantis pala
to placeat, iterum coquito ut misceantur, fac ualde te
nuem sorbitionē multa aqua panē diluēs, quā ijs dabis,
quorū uirtutes ob imbecillitatē parum urgent. Hip. da
curatiōe huius febris agens, aque mulsæ coctæ & a quo
se quantū æger uoluerit concedit. Hócq; potu ægrotan
tem ad crisis horam ducit. quod manifestum est ex eo
quod in hunc modum scribit. Et sorbitiones, inquit nisi
dies iudicatorij transierint non dabis. Sub audies cum
Gal. si uirtus ægrotantis robusta esse uideatur. Zucarū
usum mellis præstat. Efficariorem tamen uirtutem mel
habet. Zucarum utpote temperatius ad causi curatio
nem magis probandum. Antiquorum ætas eo carebat,
& si sacharum tunc non deesset.

CAP. II.

Q V O D si causis à materia pituitosa salsa
fuerit, crassiori uictu alendi sunt ægrotantes. Nem
pe sorbitione tenui. Potus non erit ijs uictus ido
neus. Quare sorbitionibus in hunc modum, uteris, si
uirium adfuerit robur, habitusque talis sit ut non fa
cile corpus effluat, parceque sit assuetus uiuere se
cunda ualitudine. Sorbitionem ex hordei medulla
cum syrupo acetoso eo quo supra dictum est modo præ
parato. Acrem ptisanæ sorbitionem appellauimus, ad
ministra

ministra ubi oportet. Eam insuper sorbitionem quam ex mica panis ter loti scripsimus, acetosam panatellā diximus preparabis, addito loco succi granatorum syrupo acetoso acri, hunc dico qui plus aceti recipit, Hūc uictum intellige ijs conuenire qui maligno causo nō laborāt. Discernitur cum malignus est, ex assidua extremorum frigiditate, de ijs infra agemus. Iis ergo qui causo à pituita salsa laborāt, sorbitionem dato ex hordeo aut pane modo predicto bona syrupi acetosi quantitate iniecta, ita ut palato effatu dignam offerat representationem. Quod si facultas imbecillis fuerit, aut futura imbecillitatis suspicionem præstet corporis habitus, aut cōsuetudo, aut si alius ab initio liquida fuerit corpus absumens (hoc. n. symptomate solo posito, uirtutem multum urgere supra diximus) talis cōmodus fuerit uictus. Pullum gallinaceum qui matrem insequitur pinguem coquito ad lentum ignem recenti testa, prunorum & hordei preparati quantum singulorum manu capi possit, aquam sufficientem infundito, mali deinde granati accidi grana quantū manu capere possis projice media hora antequam pullum ab igne moueas. Sūt qui tandiu pullum ad ignem coquunt donec hordeum rumpatur. Huius decocti portionem seruato ut egrotanti exhibeas, cum tibi opportunū uidebitur, ex residuo decocto cum pane in aqua frigida ter infuso sorbitionem facito. Dato quando oportet ei cui alius liquida fuerit. Caterum scire oportet causam cum à salsa pituita generatur, si cū aluo ab initio perturbata fiat uires naturæ multum absumere. Quapropter uictu

crassiori

Decoctū
pulli ex
granato
acetoso.

DE VICTV FEBRICIT.

crassiori eos indigere qui huiusmodi causo laborāt. Præsertim si habitu, sint raro & assueti multū adere. Natura si quidem huiusmodi causo laborantis symptoma-
ptū prauitate: & humoris contumaci resistentia cōtrā
ci facultati repugnantis, exoluitur.

CAP. III.

H I P. iubet attractorias exhiberi sorbitiones. Sed
quid sibi Hip. uelit per illud uerbum attratorias dice
re non facile est. Præcipue cum Gal. uerbum absque
interpretatione reliquerit. Græce ita habet *σφοδρὰ
καὶ ἐπισπαστικὰ διδόναι*. Hoc est sorbitiones super attrato-
rias dato. *ἐπισπαστικὰ* composita dictio est à præposi-
tione *ἐπὶ* cuius officium est dictionis significato ali-
quando aliquid addere. Vt Hip. infra *ὅτι δὲ λαπαρὺ ἴσως
καὺσος ἐπιγίγνεται*, hoc est causus superueniat. Aliquan-
do idem ualet quod apud latinos. In. Vt cum idem ait
τὸ ἐξωδὺ πνεῦμα ἐπάρκεσαι, hoc est exteriorem spiritum
inducere. Vul. Hip. ut sorbitiones attrahenti pharma-
co misceamus. Pharmacum enim sorbitione mixtum,
melius nuncupare non potuit, nomen ab utroque sim-
plici compositum efficiens, nempe sorbitiones attracto-
rias. Quod autem antiquioribus consuetum fuerit me-
dicis, in sorbitionibus pharmaca miscere, manifestum
est ei qui antiquorum scripta euoluerit. Ipse etiā Gal.
in phlegmonis iocineris curatione, cortice helebori in
ptisana, mercuriali, & philicula utitur. Idque non uul-
gare præceptum est in uebementi febre aut maligna.
Nempe cum purgatio admodum sit necessaria, ti-
meatque medicus inualidis ægrotantis uiribus. Con-
sulte

sulte aget ut cum pharmaco uti uelit, id simul cum sorbitione agrotanti offerat. Sic enim pharmacum minus commouebit, minusque calfaciet, & exiccabit, quæ omnia inuebementi febre aut maligna ne fiant, diligenter obseruandum est. Pharmacum præterea ita exhibitum uires naturæ minus exoluit. In maligna febre aut pestilenti optimus fuerit exhibendi pharmaci modus, quo nullus alius certior, minorique humani generis damno. Id ita esse intelliget si Gal. sententiæ sis memor, in expositione Aphorismi quibuscumq; crisis fit, ubi plures iudicationes ad bonum terminari uidisse ait. Nouimus inquit ipse plures esse ex egroti sanatos quàm mortuos nisi pestilens sit constitutio. In iudicatione autem natura trisantes chirmos ad expulsionem commouet. In qua quidem commotione natura solet in pluribus uictrix exire, nisi cum pestilens morbus fuerit. Cauenda ergo sunt, quæ humorem pestilentem pura pharmaca commoueant, offerre. Ab utroque enim & à pestilenti humore & à pharmaco agrotantis robur absimitur. Quod si pharmacum cum sorbitione misceas, ab utriusque ictu naturam magis seruabis, eique simul materiam unde sibi arma ministret suppeditabis. Prudentissime igitur Hippoc. in maligni causi curatione sorbitiones attractorias ministrare iubet. Quod autem in causi curatione pharmacum purgans aliquando exhibere oporteat, ipsemet docuit eodem libro in hæc uerba. Si liquidam aluum habenti causus superueniat, si tibi uideatur purgatio necessaria, intra dies tres non purgabis, sed quarto. Sermomis consequentia

4. de ratio
ne victus.

DE VICTV FEBRICIT.

sequentia huc me adduxit ut de administrandi pharmacī modo disererem, alibi enim de pharmacorum administrandorū methodo latius agemus, ubi quale, quātum, quando, & quibus exhiberi debeat pharmacum, inuestigabimus.

CAP. II II.

N V N C ad sermonem reuertamus. E nostris medicis nonnulli medullam cucumeris, citruli, alij lactucam, portulacam, alij lac amigdalarum, aliqui scarriolam cum aceto aut agresta uel succo berberorum aut acetositate citri utrique causo concedunt. Sed quantum astringentia aduersa sunt legitimo causo, tantum frigida potentia, notho. Quod ex hoc maxime intelliges. Legitimus causus fluxu sanguinis aut sudore, soluitur, ut ab Hip. discimus. Quae autem potentia nimis frigida sunt, tum ea quae astringunt, utriq; obstant terminationi. Quod notho seu non uero causo non conueniant ea quae potentia ualde sunt frigida, ratione manifestum fit. Humor si quidē huius febris difficilis coctionis est, idque maxime ob id quod frigida glutinosa & crassa pituita sit, quae hanc febrem generat. Quapropter abcessu solet haec febris terminari, ut à Gal. scriptum est. Quare omnia quae potentia frigida ualde sunt huic febre incommoda esse quouis percipiat. Quod Rasis in haec uerba asseruit. Et pone, inquit in cibarijs scilicet in non pura, res calefacientes & subtiliantes. Quid igitur prudens lector de illo sentis, qui camphorā cum aqua rosarum dissoluens, laborāti causo exhibet. At quae astringunt nisi symptomatis gratia exhibita,

4. de ratio
ne uictus.

In 1. de ra
tione ui
ctus.
16. conti
mentis.

exhibita, utrunque causum perniciosum aut discretum efficiunt. De causi utraque specie satis sint dicta. Vtriusque synochi victus forma, similis est ei, quam causo conuenire diximus.

CAP. V.

CUM enim uterque synochus febris sit nullas habens intermissiones, indicat egrotantem potu fore nutriendum. Et quia hac febris raro accidit cum imbecilli facultate, aut calido & sicco temperamento, neque habitu raro, ob id solum in hac febre de consuetudine queremus. Quem ergo egrotantem parca uiuere bona valitudine scias, solo potu nutrire oportet. Aquam igitur hordei ut supra parato, cuius accipito partes decem syrupi acetosi acrioris partem unam, misceto simul ad lentum ignem, dato ubi oportet. Bonum est hordeum à primo solum exuere cortice, nam ab utroque exutum, magis humectat & minus absterget. Ad synochum absque putredine. Antequam aquam hordei ab igne amoueris hora una. Mali granati accidi grana secundum quantitatem hordei projicito, Zucari purissimi quantum satis, coquito spumam auferendo, ad lentum ignem, exhibeto egrotanti quod oportuerit. Commodissimus huic febre est potus. Ad putrescentem synochum. Hordeum ablato uno cortice coquitum in aqua ut dictum est, antequam ab igne amouea, hora una, politrici, aut capillorum Veneris non uetustioris uno mense acetosae herbae projicito singulorum quantum manu capi possit. Transacta hora, remoue herbas quas filo collegeris & projicito syrupi acetosi acrioris quantum videbitur, dato ubi oportet.

Potus acetosus.

Potus ex malo granato.

Cibus conueniens putrescenti synoco.

Aqua hordei cum uirgure capillorum veneris.

tet

DE VICTV FEBRICIT.

*tet, postquam ad lentum ignē probe mixta fuerint. Ob
seruandum tamen est, ante missionem sanguinis aut ue
tris subductionem aut clisterium bono temporis inter
uallo exhibendam non esse aquam hordei ut discimus
ab Hip. Nō pratermittendū est, synochum à putredine
paulo solidiorem exigere uictum. Nam dispositio ex
corruptione humorum, indicat ciborū adiectionem ut
supra ostendimus de mente Gal. in expositione illius
quibus semel aut bis. Natura insuper citius labitur à
febre & à putredine simul inuadentibus quàm ex sola
febre. Sorbitiunculam igitur tenuē ex hordeo aut pa
ne parato in hunc modum. Aquam hordei cum politri
co & acetosa coctam parato, in eius portionē dissolue
micā panis per horam in aqua endibiæ infusi. Coquito
ad lentum ignem cunque permixta fuerint infude sy
rupi acetosi acrioris quantum in gustatu aperte sentia
tur, iterum modicum coquito miscēdo. Potus sit aqua
hordei cum malo granato acido cocta, in synocho absq;
putredine in eo uero qui cum putredine est aqua hor
dei cum politrico & acetosa cocta.*

CAP. VI.

*NOSTRI iuniores medici, cibos ex cucurbitis
spinachis lactucis portulacæ uirgulis, citruli medulla
conficiunt. Hos uictus in continentibus febribus re
probandos fore, una ratione ante ostendi. Heæ qui
dem febres cum ualde acute sint, natura eas diu fer
re non potest, cito enim fit crisis qua aut natura uin
cit, aut uincitur. Ut scripsit Gal. primo de glauconem.
Summa ergo diligentia curare medicus debet, ne aut
humores*

1. de ratio
ne uictus.

1. Aphorif
smorum

Panatella
cū uirtute
politrici

humores aut corporis vias ad crisim indisponat. Vi-
ctus autem ex frigidis herbis potius efficere hoc valent
quàm humoris igneam qualitatem refrangere, aut sitim
egrotantis sedare, quæ alioquin magna aqua frigida
quantitate uix haustu ebibita uix sedatur. In conti-
nentibus igitur febribus uerendum est ne uictus ex hu-
iusmodi ualde refrigerantibus herbis aut mortem aut
prauam crisim inducant, ad fluxum sanguinis è nari-
bus, & ad sudores corpus laborantis, & humores si-
mul indisponendo. Est qui iniuuas, & lentes cum ace-
to, & cum granatis, & sumach ijs concedant quando
intentio esset ingrossare sanguinem, aut quando natu-
ra esset nimis mollis. Et subdit, & si sit aliquod horum
per quæ constrictio timeatur scilicet ne uentrem strin-
gat, frangatur eius constrictio cum siracosi, & prunis
& cibetur tunc cum cibo factum de cucurbita, & herba
acetosa. Et conuenit ollus frigidum factum de acetosa
endiuiæ, & lactuca. Sed forsitan quis cõtra hæc obijciat.
Quod nam magnæ dignitatis commodum in continen-
ti febre ex sanguinis ingrossatione sequitur, ut eius gra-
tia sumach condimentis miscere ausus fuerit in syno-
cha febre. videtur tamẽ duplici de causa id concessisse,
nẽpe aut ingrossationis, aut symptomatis gratia, ut cū
alius liquida præter modum fuerit. An symptomatis
occafione concedi debeat, prætermitto. At ingrossandi
sanguinis gratia, haut quaquam rectum esse opinor. Nã
prudentis medici non uidetur esse, in fluxione quæ à
toto aut ab aliqua parte in aliam sit, bitiosum sangui-
nem crassiorem reddere cum ijs, quæ ualide astringunt,

DE VICTV FEBRICIT.

ne superfluum humorem fluentem in parte aliqua magis fortasse momentanea detineamus. Aut ne id quod in parte affecta est, magis impingamus. In synocha vero febre sanguis feruens in alium tumet, mora aquæ ebullientis in olla. Huius feruorem igne non remoto coepescet, si igneam qualitatem ab aqua remittas; id efficies aut aqua frigida iniecta, aut si es testæ discooperias ut aeris refrigerium capiat. Sic in febre synocha, aut potu aquæ frigida efferuentem humorem compescere oportet. aut conandum est, ut per corporis poros ebulientes chymi libere transpirare possint. Hæc enim uia ad salutem centior est. Nam febris remissio ex efferuentium humorum traspiratione fit. Quæ duplici arte fieri potest, nempe cum aut pori totius aperiuntur, aut humores aequaliter minuuntur. Vt à Gal. discimus octauo, & nono de meth. med. Astringentia autem ex quibus unum uiribus ualens rhus, est, quam recentiores sumacha appellat, tantum abest, ut per spirationes liberas efficiat, ut eas prohibeant corpora constringendo. Nam est triplici causa prohibita traspirationis una constrictio corporum est. Ex ijs igitur manifestum est, rhus, & cætera astringentia nimis esse continuis febribus infecta, eo quod traspirationes quæ remissionis febris sunt causa prohibeant. Symptomatis gratia uti possumus ijs quæ potentia mediocria sunt. Frigida potus exhiberi potest utrique synocha, sed signum coctionis in eo qui cum putredine est obseruare oportet. Exhibitio tamen frigida uno hausu, disputationis nostræ egreditur limites, non enim, ut potus sed ut medicinalis portio offertur.

C A P . VII .

FEBRIS tertiana continua dupliciter intermit-
tit, aut in intermissione quiescunt symptomata, aut so-
lum remittuntur. Sitque primum continua tertiana in
cuius remissione non omnino quiescunt symptomata.
Hæc dico capitis dolor, vigilia, sitis magna, delirium,
grauiter ferre morbum, & reliqua. Facultate robusta
existente, habitu tali, ut non facile corpus inhalitus di-
geratur, consuetusque sit parce uiuere, acri pitiana
sobritione utitor, eo quo supra parauimus modo. Feбри-
citantī panis offam infusi in aqua endiuie, & succo gra-
nati accidi, simulq; decem, aut duodecim pruna in aqua
tantum percocta, modico zucari super asperso, super
exhibeto.

Præterea prunorum acetosorum ad dulcorem acceden-
tium quantum manu capi possit, borraginis recentis à
uermibus non tactæ eadē mensura, hepatica quā liche-
nas Dioscorides apellat, Lusitani hepatēga, angli liuer
wrth bis tantum, hordei ab utroque cortice exuti, ter,
mundato diligenter à terrestri excremento herbam, co-
quitoque omnia cum pullis duobus teneræ ætatis crassīs
admodum, tandiu, ut hordeū rumpatur, dato ubi opor-
tet. Conuenientissimus hic cibus fuerit ad omnes fe-
bres, quæ à putrescente bile ortum habent. Febrilem
calorem reprimit, qui in iocinere est, facultatem coctri-
cem iuuat. Quod si facultas imbecillis fuerit, aut habi-
tus rarus, aut multo cibo eger assuetus, crassiorem sor-
bitionē hordeo expresso multoties in prædictum ius effi-
cito. Aut medulla panis infusi in aqua endiuie in idem

Sorbi-
tio ex
hepatica

DE VICTU FEBRICIT.

pulli decoctum dissoluta, sorbitionem conficies magis nutrientem.

Quod si in intermissionibus quiescunt omnino symptomata, uirtute robusta existente, & habitu duræ resolutionis, assuetusque sit parce uiuere, altera duarum sorbitionum pulli dicto modo temperati febricitantem alito. Panemque in aqua endiuia, & succo granatorum infusum super exhibeto. Quod si facultas debilis, aut habitus rarus facilis resolutionis, aut multū adere assuetus sit, febricitantem altera sorbitionū iā dictarum & pulli extremitatibus alito pane similiter infuso.

Quod si febris continua nulla quidem aut parua affert symptomata, uirtute, habitu, & assuetudine, ut supra habentibus simili uictu hominem nutries.

Quod si uirtus imbecillis fuerit, aut reliquis crassiorē uictum indicantibus, pulli etiam carnes febricitanti ministrato. In tertiana igitur continua, quæ debilia affert symptomata uirtute robusta existente, habitu, & assuetudine, ut supra habentibus, sorbitione utere in hunc modum.

Sorbi-
tio ex
lupulis.

Hordei ab uno cortice exuti man. tres, capillorum ueneris, cimarum lupulorum, passularum enucleatarum, ana quantum manu capi possit, coquantur insimul, cum pulla crassa, quæ nuper matrem reliquerit, hora una antequam ab igne amoveas, immitte aceti albi quantū satis sit, ut acetum gustatui se offerat, huius partem seruato, ut bibat inclinante febre, sorbitionem ex reliquo cum pane conficito.

Quod si uirtus imbecillis fuerit, aut habitus, & con-

suetudo similiter indicent, extremitates pullæ quæ teneræ sunt magis, inualido ægrotanti exhibeto. Huic uictus conueniens forma, per ea quæ comeduntur est, Semperque à tenui iure incipiendum est, deinde temporis interuallo sorbitionem ministrato. Contingit aliquando febre iam inclinante, iterum à quodam inflammante calore febricitantes rursus molestari. Quod duplici de causa contingit, aut quia intempestiue eis oblati sunt cibi, aut cum in uictu erratum est.

CAP. VIII.

SUNT qui assa gallinaceorum hepata post sorbitiones laborantibus febre continua exhibent, quod minime probo. Nam cibus longum in laborantium uentriculis immoratur. Quod non parua occasio est ut ob id corrumpatur. Præterea hepar assum inter cibos exiccantes numerandum est, quapropter febricitanti non conuenit. Cuius argumentum est sitis quàm excitat. Eos qui in continuis febribus, lactucis, & huiusmodi refrigerantibus herbis utuntur, ante morbi iudicationem, supra ostendimus in damnum ægrotantium errare. Sed non erit ab re, recensere uictum quo utitur quidam è nostris recentioribus, nam ex hoc aliquod capiet lector commodum. In die remissionis febricitantem pulla alterata (ut ille ait) nutrit, ante uero exacerbationem. & in febris inclinatione farre, & lactucis, qui ualde dissident ab inuicem uictus, & qualitate, et substantia. Nutrimus tamen insuper quod ex pulla habetur multum est, parum uero quod lactuca prestant. Aquosum namque sanguinem generant excrementis abundanter, quapropter cum in si-

DE VICTU FEBRICIT.

gnis sit inter eos differentia, magna fiet utiq; mutatio cum ab uno ad alium transitus fiat. Stante autem eadē morbi conditione mutationem in uictu faciendam non esse supra ostēdimus de mente Hip. Vbi Gal. citauimus dicentem à morbi principio ad statum usque eadem uictus specie alendū esse febricitantem. Quo in loco cautum medicum reddit, ut tunc insignes mutationes caueat. Nonne melius esse iudicas si pulla ægotantē alere illi mens erat, ut ante exacerbationem, & in febris inclinatione, sorbitione ex pullæ decocto uteretur. Multo si quidem magis inter se conueniunt pulla, & sorbitio ex eius decocto, quàm pulla cum lactuca, & farre, facilius præterea sorbitio coctionis est. Quod si cibum minus nutrientem se uelle exhibere dicas, pullam quare exhibuit die tranquilliori rogabit quis, quæ multo magis nutrit quàm eius sorbitio. Non enim prudentis medici est, ægotantem uice una implere, ut cum uice alia parum exhibuerit satisfaciatur. Multo salubrius ægotanti esset, id in partes secare, ut natura nullo ex mutatione afficiatur grauamine. Si ergo pulla recte in die tranquillo exhibetur, facta ex ea sorbitio modo quem diximus salubrior erit profecto ægotanti ante exacerbationem quàm far, & lactuca. Multo præterea commodius fuerit inclinante febre ius pullæ dicto modo confectum exhibere, deinde temporis interuallo sorbitione uti, quàm far, & lactucas in cibum ministrare. Oportet ergo non solum simili forma uictus sed similis substantiæ cibarjjs febricitantem quo ad possis, stante eadem morbi conditione nutrias.

CAP. IX.

FEBRIS continua à pituita ortum habens si cū uirtute robusta fuerit, habitu, & assuetudine, ut supra habentibus, hunc uictum exposcit. Hordei ab uno cortice exuti quantum manu capi possit, passularum enucleatarum, & petroselini tantum, tbymi partem mediam, coquito insimul cum pulla crassa modicum, antequam ab igne amoveas immittito capillorum ueneris recentis, aut politrici man. unum. Ligato insimul herbas, coctasq; abstrabe. Projicito aceti albi quantum satis ut ingustatu representetur. Denus coquito quousq; permisceantur. Fac sorbitionem ex pane, utere, & iure si uidebitur. Ex pulla carnibus hora quietiori dato febricitanti quod tenerimum sit. Meminisse oportet in continuis febribus ubi suspitio est de pororum obstructione ante totius euacuationem incommoda esse quæcunque aperiunt, & incidunt.

Sorbi-
tio ex pe-
troseli-
no.

Cicerum facilis coctionis man. unum infundito in modicum aqua endiuia, testam tota nocte in calido cinere seruato. Mane in aqua è fonte sufficienti bulliant, adiectis hordei ab uno cortice exuti man. tribus, passularum enucleatarum man. uno, cortice radice cichorij uno, coquantur insimul cum pulla, & antequam ab igne amoveas, petroselini man. semissem addito, & parum aceti, fac sorbitionem, ut supra. Extremitates pullæ ægrotanti dato.

Sorbi-
tio ex ra-
dice ci-
chorij.

Quod si imbecillis æger fuerit, permitte ei phasianum ædere, optima si quidem ijs caro est. Bonum est, ut cibum assumpturus æger, syrupi acetosi acrioris coclea-

DE VICTV FEBRICIT.

ria duo, mellis rosati colati unum, mixta ante sorbeat. Aquam decoctam cum hordeo, & semine fœniculi bibant. Verum de potu abunde dictum est.

C A P. X.

IN febre phlegmatica quam arabes laticā dicunt, aut latentem, humidi natui multum exoluitur, cibum ideo multi nutrimenti dare oportet. Corpus humilitate madefaciēte, et laxatē affectū est ab humore frigido & humido, sed ob putredinem calido effecto. Vnde non aliter ab hac febre corpus, quā pars aliqua ab occurſu aquæ ebullientis afficitur. Vnde ebullientem hanc febrem nonnulli dixerunt. Cibum conuenientem ijs qui hac detinentur febre actu frigidum, & siccum esse oportet, potentia autem humidum. Hoc autē est, ut humiditatem madefacientem exiccet, & ut corpus ab humido innato exolutum efficiere ualeat, & ut laxa membra induret. Hoc autem difficile est in simplicibus inuenire. Quapropter sorbitionem ijs ita parabis. Phasianum iuuenem, aut perdicē, aut hœdum (hæ enim ex carnibus optima ijs sunt) coquito cum radicibus cichorii, petroselini, passulis, tenerrimis lupulorum cimis, et corticibus citri, cauliculis altilis cardui, quem hispani cardo uulgariter appellant, quo ubique locorū ad finē mensæ utimur, in simul coquantur ex iure fac sorbitionē cum pane. Dictā herbam quam nonnulli scolimon, esse à Dioscoride appellatam opimantur, cum capō aut pulla si simul coquas, si phasiani, aut perdicis copia

Sorbi-
tio ex
carduo

non detur idoneum illis parabis cibum. Carduus humiditatem madefacientem, et laxantē maxime remouet. Membriū laxum induratur, idq; citra humidi natiui absumptionem. Ad hæc aperit, & urinam prouocat, & in altum pēntrat, quod ad huius febris sanationem expectandum est. Humor si quidem ad minimas est corporis particulas dispersus. Vnde crassam urinam copiosamq; & sudorem duō esse huius febris remedia ratione quis arbitrabitur. Tres ergo insimul coquens cauliculos, cardui sorbitionem facito, quam febricitanti ministrabis ubi oportet. Ex carnibus id quod maxime tenerum sit, & facile ab ægrotante coqui possit exhibeto. Nec prætermittendum, solam hanc febrem ex humoralibus indigere uictu qui maxime uirtutem corporis augere possit. More hectica febris cui ualde similatur. In illa enim caliditas præter naturam totum iam occupans, naturalis similitudinem acquisiuit. Sic humor huius febris per totum ad minimas usque partes dispersus more naturalis humiditatis, natura eius coctionem, separationem, aut expulsionem non curat, sed eum ob mixtionem ad minima cū naturali humiditate seruat. Vnde hos nec euacuatione uentris, aut fluxu sanguinis sanatos uidemus. Quin immo si sponte, aut à medico imperito alius moueatur, peiores redduntur. Quod si aliquandiu manet, euacuato bono simul cum malo separatione non facta, moriuntur. Quapropter scopas turationis in ijs fuerit, eos more hectici nutrire. Oportet enim totum id quod in ijs de humiditatibus est superfluis, sensim absumere, ciboq; salubriores inducere,

Quos
præbeat
usus car
duus.

qualitatesq; humoris quibus corpus affectum est, contrarijs successine euertere. Et quia huius febris curatio à uictu, ut diximus maxime dependet, libet sermonem longiorem facere. Iis qui cum imbecillitate uirium hac febre detinentur hunc ministrato cibum.

Perdici secundum complementum assæ succum ad æquales portiones cum uino albo decoctionis radicum plantaginis misceto; febricitanti ieiuno stomacho exhibeto. Fac ut modicum sudet. Idem è phasiano efficere possis. Quod si carnes perdici, aut phasiani digerere non ualeat, ipsarum succus postquam complete assæ fuerint diligenter per linteum expressus, cū pane ministretur, aut cū modico uini albi misceatur, & propinetur. Sed diligenter obseruare oportet, ut uinum sit maxime imbecille quod ijs propinaueris, nā alias non parua ijs læsioni erit. Nec silentio prætereundum esse, ijs qui ita laborant commodo esse in edulij sorbitionibus ue præsertim ijs qui assueti sunt alliū, ut simul bulliat immittere. Nam prærogatiuam habet in roborando naturales facultates; corrigendoq; damna quæ in ijs à duarum qualitatum immoderantia fiūt, nempe à frigore, & humiditate. Putridi insuper humoris cum per totum spargitur, corpus uitia corrigit. Habet enim præter hæc facultatem qua à centro ad circumferentiam pellit. Tria hæc quæ allium habere diximus ex Dioscoride licet colligere qui de eo ita scribit. Potum cum origani decocto pediculos, & lendes enecat. Præterea magna, & allio utilitates contra aquarum mutationes. Demum in fine dixit utile hydropicis, ad quem quidē morbum hæc fe-

bris corpus non parum disponit. Veruntamen propter calorem, & eius acrimoniam modicum in sorbitionibus miscendum est. Macerare tamen prius oportebit in deco herbae acetosae. Potus ijs cōueniens sit uinum album pauciferum defœcatum clarū cuius sumito partes duas succi granatorum medijs saporis partis unius semissem, aquae in qua decocta est capillaris herba recens, aut politricum unam, misceto. Conuenientissimus huiusmodi ijs potus fuerit. Nec pratermittendum est indicæ radicis decoctum maximo ijs fore remedio. Cuius si datur copia, unciam unam in lupinares sed multo subtiliores formulas scissam, in decem libris aquae in qua nocte ante eam maceraueris coquito. Sequenti die ad lentum ignem ad medias ebullire permittito. Propinato in aurora quantum uno haustu bibere possit calidum, sed egrotantis corpus prius fricare linteo aspero oportet. A potu uestimentis cooperiatur, & sudet quantum pro uirium ratione. Cubiculum ubi egrotans iacet, perpetuo calidum undique clausum seruare oportet. Nullus alter potus melius sudores ciet. Partes insuper ab humore assiduo laxas roborat, indurat, sed ijs qui iam sunt imbecilles caute exhibendus est, quia plus iusto exiccat. Quare ijs qui imbecilliter habent non inutile fuerit, succi granatorum medijs saporis partem unā miscere tribus decocti, simulque propinare. Summa diligentia obseruandum est ne ijs aliud liquida fiat, quin potius huius contrarium, nempe astrictam aluum efficere conamur ijs, quæ poros cutis aperiant, & sudores mouent.

Deco-
ctū in-
dicæ ra-
dicis.

DE VICTV FEBRICIT.

C A P. XI.

TERTIANA simplex pura hunc exigit uictū. Paretur crassa sorbitio ex hepatica altero duorum modorum quos supra tradidimus. Ius dato ut bibat in febris inclinatione, ex reliquo fac sorbitionem, qua utitor ante aduentum paroxismi, & cessante febre. Carnibus in die tranquillo uestatur.

Sorbi-
tio ex
cucur-
bita.
Panis
infrigi
dans.

Pullam cum cucurbita & prunis & uua acerba coquito fac ut supra.

Panem album trium dierum in subtiles partes planas diuidito, & in aquam endiuie infundito, acidumq; suc cum arantij desuper exprimito, zucarum deinde radito, tantum ut dulcor, & acetositas manifeste ingustatu sentiantur. Pane in hunc modum utatur die tranquillo bis aut ter & in maxima inclinatione paroxismi ante sorbitionem. Magna huic cibo uis est, in refrangendo biliosi humoris acuitatem. Ventriculi præterea, & iocineris immoderatum ardorem extinguit. Robur eis addit. Plures à tertianis liberari iuuenes, et adultiores ætate hoc cibo uidi, absque pharmaco, aut alia potione. Oportet tamen diligenter aduertere ne adsit pororum obstructio, aut condensatio, aut corporum constrictio. Quapropter in continuis febribus a bile ortum habentibus in quibus de pororum apertione solliciti sumus, ante totius euacuationem exhibendus non est. A uenæ sectione in continuis febribus secure exhibebitur.

Dupli-
ci ter-
tiana
uictus
conue-
niens.

Duplex tertiana tenui eo magis uictu indiget, quantum in ea minus quiescit natura. Sorbitione cucurbitæ, aut hepaticæ utere. A carnibus nisi sit imbecillis aggre-

tans temperandum est. Aut nisi multo sit cibo assuetus. Potus utrique febris conueniens aqua hordei est.

Tertiana simplex non pura ab humore bilioso cū crasso phlegmate mixto ortum habens quem recentiores choleram uitellinam dicunt, hunc exposcit uictum. Thymi petroselini, passularum, enucleatarum, singulorum manip. unum hordei ab uno cortice exuti tres, coquito cum capo, aut pulla gallinacea herbas iam coctas extra hito, immittitoq; aceti albi quantum satis. Parum coquito denua quousq; permixta sint. Dato ut bibat inclinante febre ex residuo fac sorbitionē, Qua uti poterit cessante febre, & ante aduētum paroxysmi, horis septē ante accessionem, carnibus uesci poterit in die quietis, Pisciculos saxatiles in aqua coquito cum saturegia, thymo, sale & aceto, & modico purissimi olei. Facilis coctionis cibus est. Ventriculi appetentiam excitat, quae in hac febre plurimum expetenda sunt.

Olei purissimi ex immatura oliua, partem unam, aceti albi duas, permisceto. Panē infundito febricitanti exhibeto. Quod si olei immaturi copia non detur, hispano utere. Mixtio ex oleo, & aceto cum humana maxime conuenit natura. Quandoquidem ex contrarijs utrisq; qualitatibus constat. Miscemur enim calidum frigidū humidum & siccum. Ventriculum roborat. Hepar & lienem. Distributionem adiuuat. Coctionem & appetentiam excitat. Aperit, incidit, humectat, refrigerat. Quod si piperis grosso modo contusi parum addas, frigido uentriculo pituitoso conferet. Quod euenire in hac febre multoties solet. Rationalem merito quis

Tertiana non pure cōpetens uictus.

Sorbitione cū aceto.

Pisces petrosi.

Mixtio ex oleo & aceto.

DE VICTV FEBRICIT.

mixtionem dixerit. Quæ febrî à pituita, à bile, & ab attrabile conuenit. Quod si oleo, & aceto parum aquæ misceas sitim sedabit.

**Cibus
herba-
ceus.**

Aliū Alexandri herbæ cauliculos, laueris super aquas crescentis, foliorum rafani, uiolarum borraginis, lactucæ, singulorum manip. unum coquite in aqua quousque percocta sint. Herbas exprimito quantum possis, cultelloq; ad minimas partes incidito, addito olei purissimi, salis & oximelitis acris singulorum quantum sit satis. Cum pane utitor. Mundificat cibus hic uentrem, utranque euacuationem promouet.

Quod si post expressionem herbarum, & earundem incisionem cum pinguitudine iuris capi, aut pullæ herbas coquas adiecto oximelite, magis nutrientem cibum efficias.

**Herba
ceus ci-
bus ma-
gis nu-
trienti-
s. Sorbi-
tio ex
hepatic-
a cum
malo
grana-
to. Sorbi-
tio ex
lenti-
bus.**

Quod si bilis permixta tenui humiditati aquosa fuerit, febrisq; fiat ex cholera citrina. Vtere sorbitione ex cucurbita, aut crassa sorbitione ex hepatica, adiecto malo granato acido hora una antequam ab igne amoueas. Dato ius in febris inclinatione, ex residuo fac sorbitionem. Vtere & pane infrigidante, modico cinamomi adiecto si opus fuerit. Lentes hispanas coquito in aqua cum petroselino, coriandro uiridi, oleo, sale, & aceto, & modico croci. Vtere decocto cum pane. Cibus hic frigidus, & aliquantulum exiccans est. Hispanis multum in usu est. Febricitantibus quibuscunq; sorbitionem ex lentibus exhibent, exceptis quartana laborantibus. Quos & si nulla ob id laude dignos esse existinem, ita eos non absque erroris crimine, qui lentes

omni prohibent egrotanti. Id ex Gal.asserētes qui eas cibum hominum non esse dixerit, cū de pleuritide ageret in qua lentes prohibuit. Sed relicta pleuritide febricitanti febre tertiana à cholera citrina certe conueniet. Si febris effectricem causam & qualitatem in partibus derelictam consideres. Cholera citrina humor calidus et tenuis substantiæ est, maxime omnium humorū penetrans. Ius lentium contrarias operatur qualitates nam refrigerandi, & inspissandi uim habet. Cholera insuper citrina eam in quā incidit partē totā eius acuta penetratione macerat. Ius lentium non solū partem cogit, ut minus prompte penetrationi fiat peruia, uerū id quod humidū est tollit equali sua siccitate. Iis prætereque qui ex hac febre immoderate sudant, & non ob id alleuiantur non parum cibus ex lētibus confert. Quod si adhuc lentes aciem oculorū obtundere, & ægre concoqui, & somnia tumultuosa excitare ex Dioscoride asseras. Hæc omnia lentibus nō earum decocto tribuit. Hæc damna in hispana lente non percipimus. Stomachum male habere ex ea scripsit Dioscorides, hispana uere lens uentriculum roborat, & minime inflat. Lens Itala maior, & candidior est, minor uero Hispana colore ad rubeū uergente nec tumultuosa excitat somnia, ut de ea proditū est. Et si quid uitiosæ qualitatis hispanā habere contendas à uiridi coriandro castigatur. Vbi cūq; ergo humores corporis inspissare, aut corporis particulas cogere citra calfactionem mens est, ius hispanæ lentis in cibis recte porrigitur. Quod si id cum petroselino, coriandro uiridi, oleo, aceto, sale, & croco pa-

2. de rati-
one ui-
ctus,

DE VICTV FERRICIT.

raueris, conficies cibum ad iam dicta conuenientissimū in passiuis qualitatibus temperatum, in actiuis ad frigiditatem declinantem.

Pedes uituli anteriores duos, aut arietis omnes in aqua plus satis coquito, radicum plantaginis, cichorii, petroselini, singulorum manip. unius tertiam, hepaticæ hordei ab uno cortice exuti, prunorum & passularum singulorum unum, addito mali granati acidi tres, ius dato ubi oportet, ex reliquo fac sorbitionem. Quod si post coctionem pedum antequam malū granatū injiciat herbas abstrahas, ius collans, tertiam sui partē succi acidi mali granati immittas, pane & zucaro simul coquas, quousque permixta sint, cibum ijs ualde idoneum, & plurimis alijs egrotantium parabis. Quem ut conuenientissimum memoria dignum ducito. Nam multum nutrit, corpus refrigerat, & humectat, particulas cogit, tenues humores inspissat, bilis feruorem reprimat, uentriculum, & iocinerem roborat, sitim sedat.

Sorbi-
tio ex
pedib⁹
uituli.

CAP. XII.

EX arabibus medicis sunt qui in tertiana pura a cibis in quibus est caro abstinendum esse dixerunt. Alius rectum est, inquit, ut in potu ei detur sicut sorbition hordei, & etiam ei simile, nisi natura iam fuerit lenificata. Dixit alius si in ultimo diei erit tempus accessiones, non erit inquit, incongruum in diei principio aquam hordei propinare ad subtilitatem declinantem. Dixit unus e nostris, intellexerunt prædicti regulariter operando, nam coacte aliquando cibamus ante accessionem & in ipsa. Dixit infra hic idem uir
aqua

aqua tamen carnis in ijs febribus prohibenda est quantum possibile fuerit. Si autem coacte eam exhibere debeamus, ab ea carne in frusta parua redacta, et aqui in frigidantibus abluta sublimetur, et cū aquis infrigidantibus tribuatur. Sed operæ precium studioso lectori erit examinare, an dicti medici rationabiliter uereantur carnes nedum animum paruarum exhibere usq; ad inclinationem uniuersalem febris. Et si quidem has in die accessionis prohibent, recte agere ita consulētes arbitror. Quod si nec in die quietis asserant, audire quibus inniuntur rationibus oportet. Tertianam puram ex Hipp. asserunt intra septem periodos iudicari, hos dies tredecim continere, terminum uero acutarum quattuordecim esse. Omni autē morbo intra quattuordecim dies indicādo, tenuis uictus exhiberi debet. Vt supra ostēsum est. Carnes igitur nullæ dandæ sunt, quia tenuis uictus limites transcendunt. Præterea in ea febre bilis utpote nimium acris, membra plus iusto calfacere solet, exicca re, & corrodere. His uero symptomatibus uentriculum & iocinerem plus affici, eorumq; actiones imbecilliores ob id fieri certū est. Iis ergo de causis uictu facilis coctionis, quique contrariæ sic qualitatis, nutrire eops oportet. Carnes uero ob id quod non facile coquantur, & qualitati humori contraria non uigeant, sed media, à uentriculo, & iocinere male parantur. Vnde fit ut ad humoris morbum efficiētes naturam, bonæ earum pars conuertatur. Danda igitur sunt quæ facillime sint coctionis, & quæ humori qualitatibus contrarijs uigeant. Hæc non in carnibus, Sed in herbis, fructi-

DE VICTV FEBRICIT.

bus, seminibus, inuenire est. Vt in lactuca, endiuia, portulaca, cucurbita, malo granato, arantio, hordeo, prunis, et similibus. Has, & similes non contemnendas rationes assignabunt, qui in tertiana pura die quietis à carnibus quibuscunq; agrotantes prohibent. Sed nos qui in supradictis pullum gallinaceum unū, aut duos parari iussimus cum hordeo, uiolis, endiuia, hepatica, prunis, adiecto succo mali granati acidi. Consuluimusq; ut hoc iure in febris inclinatione febricitans uteretur, positoque temporis interuallo sorbitione ex pane in aqua endiuia hora una infuso. In die uero quietis præter ius & sorbitionem pulli carnibus uesteretur. Et arbitramur sic iubentes, recte agrotantibus consulere. Nullū equidem alium salubriorem quis uictū inueniat, quiq; magis naturam roboret, & corpus ad suam temperiem efficacius, morbifica qualitate euersa reducat. Quod ita ostēdimus. In tertiana pura duplex corpori siccitas aduenit, altera positina (ut dicūt) qua bilis natura sicca corpus afficit, altera ex consumptione humiditatis naturalis à sanguine ortum habentis. Vtrique siccitati subuenire tenetur medicus. Sed secundæ citius occurre re medicum posse, iure pulli refrigerantibus herbis temperato, & sorbitione ex eodem, quàm herbaceo quocunque cibo inde manifestum est, quod in sanguinem bona illius cibi pars uertatur, minima ex oleribus, & fructibus. Quod si mente concipias corporis quamuis minimæ particulæ concessam esse facultatem, qua conueniēs trahat, et triste eijciat, intelliges ius pulli, aut eius sorbitionem, quia humane naturæ magis familiaris est,

multo magis humectare exteriores corporis, & interiores particulas. Adde quod cibus, ex herbis, & oleribus cū minime ad sanguinē laudabilem conuertatur, iocinoris gibbum transmeans ad urinam demittitur, aut in halitum euanescit. Vnde minimum est id quod conuersum in sanguinem humectare singulas corporis particulas possit. Quare si utique uelimus obstare siccitati, non cibum ex herbis solum, aut fructibus, exhibebimus, sed cum ijs simul miscebimus, quæ bonum præbeant alimentum, indigenti naturæ opem ferens. Per hoc enim herbarum facultates efficacius operabuntur, cū ad minutas ita corporis particulas deferantur. Quantum autem facilis coctionis sint, ius pulli, aut eius sorbitio constat. Ad hæc, in inclinatione paroxysmi, et ante accessionem, ex infrigidantibus herbis cibus alendos ob id nō esse febricitantes opinor, quod illic febrilem caliditatē intropellant, hic expulsionem naturæ retardent. Quo in tempore infrigidantia, et corpus constringentia ministranda non sunt. Sed potius quæ à centro ad circumferentiam educant. Vt naturæ opus immittemur regulariter agentis. Hoc discimus à Gal. octauo de Methodo qui à balneo ægrotanti ante accessionem aquam in qua apium incoctum erat ministravit. In die quietis pulli carnes exhibentes nihil peccabimus. Nam à paroxysmo præterito, et ab instante, inter sunt horæ decem, et octo quibus corporis natura à labore præterito iam quiescens, vires resumpsit, ut pullum tenellum satis coctum coquere, & parare possit. Superestque idem temporis interuallum, ad initium instantis paroxysmi. Quo tem-

DE VICTU FEBRICIT.

pore uerendū non est, ne puroxismus cibum adhuc incoctum offendat. Quanto enim citius anticipatio fit, tanto, & citius febris finit in tertiana exquisita. Adde quod cibi ex herbis, & fructibus promptissimi sunt, ut putredinem efferuentis humoris concipiant. Quapropter recte à medicis prohibetur in febribus horarij fructus. Aliæ rationes satis efficaces adduci possunt, ad id ostendendum. Hæc tamen sano intellectui satis sunt. Hunc dico, qui uero statim assentit, falsaque (& si magis appareat) arguit minime applaudens. Quod autem de numero dierum quibus indicatur tertiana dictū est, nihil obstat ijs quæ diximus. Formam enim uictus à cōstitutione morbi, & à robore ægrotantis sumendam esse ostendimus. Diximusque eum cuius uirtus parum ob imbecillitatē urgeat, crassiori uictu quàm morbi dispositio exposcat alendum esse. Ostendimus insuper ijs qui raro sunt habitu, & humores tenues habent, & natura sunt calida, & sicca ob id quod eorum corporum cito resoluuntur uirtutes, crassiozem cibum ministrandum esse. Vnde manifestū est medicos qui in tertiana pura tenui uictu febricitantes utraq; die nutriūt in marasmū eos qui gracili habitu, & natura calida, et sicca sunt, deducere. Aut si alio sint tēperamento, ex pura nothā tertianā administratione frigidarum herbarum, & olerum efficere. Quorum utrunque bonus medicus summa cauere debet diligentia, nempe ut ne morbum periculosiorē, aut diuturniorem efficiat. Quod si siti uexetur ægrotans, multo sanè commodius fuerit si frigidam propines (si ea usus fuerit) quæ multo magis

fitim sedabit, quàm cibus ex refrigerantibus herbis. sed non ab re fuerit in præsentia adducere quas nugas nobiscum agat unus è nostris medicus. Qui cum nos cautos in tertiana pura simplici, ijs uerbis redidisset. Aqua inquit carnis in ijs febribus prohibenda est quantũ possibile fuerit. Si autem eam coacte exhibere debeamus ab ea carne in frustra parua redacta, et aquis infrigidantibus abluta sublimetur, & cum aquis infrigidantibus tribuatur. Post hæc cum de uictu continuæ colericæ agat, inquit. Ipsa enim eget subtiliori regimine, & frigidiori quam sua compar interpolata. Ipse tamen incurratione unius qui febre cõtinaua tertiana laborabat, complexione colerica, ætatis quadraginta annorum macro corpore, mense Septembri, cum capitis dolore, et magna siti, delirabatque per accessiones, hunc tamen post lænitium ex manna singulis diebus intermissione pulla nutrit. Forsan aliquis in secunda intermissione pulsum magis debito prostratum inuenisse eũ dicet. Ob idq; pullã ei dedisse. Quã tamen ea de causa nõ concessisse, arguit id quod in alio scribit febricitante in quo nihil tale inuenit in pulsu signũ, de quo ita scribit. Iuuenis erat colericæ cõplexionis febre continua tertiana laborabat cui pullã paruatam alteratam cum lactuca super asperfo succo arantij exhibui. Quid nam de eo sentiendum est, qui cum tenui magis uictu alendos esse qui continua febre laborant quàm qui sua compare. interpolata scribat. In interpolata ab aqua carnis abstinere iubens inquantum possibile fuerit, incontinua tamen sua compare carnes pullæ febricitanti ministrare audet

DE VICTV FEBRICIT.

nullo interueniente symptomate quod uires deiecerit. Turpe profectò est honesto uiro contrarium quod dixerit agere. Vnum scriptis posteris mandare, aliud operibus exercere. Neceſſe enim eſt, aut altero, aut utrobique falſus deprehendatur. Sed melius fuerit in hac re Gal. in de febribus ad Glauconem, ut iudicem admittere, an à carnibus auis abſtineat necne, ſed de ijs haſtenus. Nò enim id ago ut medicos carpā, quod ſi uoluiffem ampla nobis dabatur area, quæ chartam longiorē expoſceret. Ob id dedita opera authorum nomina prætermiſſi, qui de hac re aliter ſenſerunt. Quod ſi quis hoc mihi uitio uertat, cado, ſentiat quiuis, ut uoluerit, & mihi quæ a tergo mantica eſt, ut ſuſpendam, æquū eſt cadant, adun-
cos quoſcunque naſos. Mihi ipſe uiuere, & more meo agere decreui. Popularem auram, & uulgi famam ueritatis ſtudio ſcientiæq; poſpones, ratus cum Gal. hac, nullam eſſe honeſtiorē nec diuiniorem poſſeſſionem.

C A P. XIII:

FEBRIS, quæ à pituita dulci ortum habet talem exigit uictum. Coquito phasianum, aut capum, aut pullam ijs quæ ſequentur. Petroſelini, thymi, endiuie amaræ, ſingulorum man. ſemiſſ. acetosæ man. unum, berberorum tātundem, ſalis parum, antequam ab igne amoueas immitte capillorū ueneris, aut politrici man. unum bulliant quouſque permixta ſint dā ubi oportet. Cicerum infuſorum in aqua tepida per totam noctem man. tres, petroſelini, thymi, hordei ana man. unū, rad

Sorbitio
berbero
rum.

Ex cice-
ribus for-
bitio

ces tres cichorij coquito cum pulla crassa adiecto aceto ut supradictum est. Aceti albi partes tres, olei purissimi oliuarum immaturi partes duas, zucari, aut mellis partem unam, his madente utatur pane. Mirabile est ad omnes febres quæ à pituita ortū habent. Ventriculum roborat, appetentiā excitat, omnes præterea naturales actiones adiuvat. Nec prætermittendum his utile fore, ante cibum oximelitis coclearia duo, melis rosati colati unum, singulis diebus deglutire ante cibum. Nam plurimum confert stomachum mundificans, & præparans ad ciborum rectam coctionem.

Oxizachri rationalis mixtio.

À pituita salsa febricitantibus sorbitionē parato in qua sit duarum sorbitionum facultas uenpe hepaticæ, et petroselinī absque aceto. Caput arietis post decentē eius præparationem cum hordeo, uiolis, petroselino, hepatica, pulegia, thymo passulis, prunis, radicibus cichorij, et petroselinī coquito. Fac, ut crebro decoctum febricitās sorbeat. Optimum ijs huiusmodi decoctum fuerit, quod nutrit, abluir, et pituitæ salsæ malitiā corrigit. Bonū est, ut ij ante cibum zucari offam deuorent, parumque aquæ ex hordeo & fœniculo dulci coctæ super bibant. Qui à pituita acida laborant, raro febricitant. Nam pauci omnino sumi, à re acida eleuantur. Quare ad eos qui à pituita crassa, & lenta febricitant sermonem conuertere commodius erit. Is talem ministrabis uictum: Pullam crassam, aut capum coquito cum thymo hordeo, passulis, ut singulorum man. unum, pulegiæ duos sumas bulliant simul ut supra, modico sale ius parato, & sorbitionem.

Caput arietis.

Sorbio ex pulegio.

DE VICTV FEBRICIT.

Item paretur sorbitio ex fursure quā infra traddemus cū de obstructione nobis sermo fuerit, quæ ualenter incidit aperit, & abstergit. Capparibus ciceribus radicibus ut pote nimium aperientibus in principio non utemur cum obstructionis suspitio est. Præstat enim ijs quæ abstergunt, & leniter incidunt cum eibis miscere, ut pulegium thymnum, & id genus alia.

CAP. XIII.

SED qualis uictus febrī quæ à pituita ortum habet, conueniat hucusque dictum est. Inuestigare tamen oportet, an uerum sit, quod nonnulli ex nostris medis asserunt, crassio rem uictum exposcere hanc quàm tertiam simplicem. Rationem ad id sumentes longiorem hanc febrem esse quàm tertianam, cunque crassities uictus, & eius contrarium, à distantia status sumenda sint, sit, ut morbi qui breuius finiantur magis tenuē, qui uero tardius, crassio rem uictum exposcant. Præterea labores, & symptomata maiora seu uehementiora, cibum magis quàm remissiora prohibere. Iis, & similibus adducuntur rationibus, phlegmatica febre crassiori uictu laborantes alant, quàm tertiana. Sed eos à recta deuiare existimo triplici ratione, duabus ab ipsa febre, tertia à morbi utraque causa coniuncta, & antecedente. Et ut apertius res percipiatur, ponamus duos temperatura, ætate, habitu, & reliquis consimiles, alterum phlegmatica, alterum colerica febre laborare. Positis cæteris paribus præter febres, & causas utrasque earundem. Uictus, ut in superioribus ostensum est, à uirtute sumitur morbo non prohibente.

Vnumq; diximus alimonie scopum esse, uirtutis custodiam. Ut à Gal. primo de ratione uictus scriptum est in fine. Vbi igitur uirtus magis exoluitur, plus alimonie opus esse, ut seruetur, quam ubi minus, si per morbum liceat. At in tertiana febre plus exolui corporis uirtutem quam in febre phlegmatica manifestum est experientia id ostendente. Plus igitur in illa ministrandum est si per morbum liceat. At licet, nam una integra die & nocte sunt à morbo liberi egrotantes, & placide quiescunt. At in phlegmatica febre contrarium accidit, ita ut neque tanta fiat exolutio, neque tantum per morbum liceat. Corripiuntur enim à febre omni die, & non raro prima adhuc non euanescente proximi subintrat. Aut parum est id quo quiescunt, temporis, & id quantumcunque est, absque motione aliqua intrinseca non est, incipiente ad instantem paroxysmum disponere. Vnde fit, ut necessum sit febricitatem alere priore febre adhuc non soluta, aut si id spectes, intra limites dispositionis ad futurum paroxysmum nutrias. Cunque hoc ut deterius caueant prudentes medici, reliquum est ut primum sit eligendum. At febre adhuc non euanescente, minus cibi & tenuioris dandum esse supra ostendimus de mente Hip. plus & crassioris cum corpus ab ea liberum est. Vnde fit ut magis tenui uictu in phlegmatica utendum sit, crassiori uero in colerica. Ad hæc si humorem pituitosum ulteriori coctione in sanguinem conuerti, & nutrire posse intelligas, magis assentes opinioni huic. Nam in corporibus quæ ab hac detinentur febre, abundant pituitosis excrementis

DE VICTV FEBRICIT.

uentriculus, intestina, & meseraica. Quæ resolutioni utriusq; causæ antecedentis, et coniunctæ obstant. Hæc nullo alio melius quàm subtili uictu consumes, ut recte sensit, qui usq; ad septimum subtili uictu hos transigere præcepit. Quod si antecedentem species causam; propter inæqualitatem substantiæ pituitosæ, & qualitatis eius diuersitatem, multo plus habet hic natura quod separet, coquat, & conuertat, quàm in colerica; in qua propter causas contrarias æqualiter putredo concipitur. Ex ijs igitur manifestum est magis tenui uictu alendos esse qui à pituita, quàm qui à bile febri-
 citant. Iis adde ob multitudinem materiæ quæ ut plurimum in hac febre coincidit, cibum non parum ob stare eius subtiliationi, incisioni, & consumptioni. In febre uero colerica quantum ad biliosi humoris synerici dispositionem attinet, non solum cibum non ledere, uerū & iuuare, & ad reprimendam humoris acredinem, & ad inducendam humori nimis tenui crassitiem debitam. Assenties uerum esse quod opinamur, si audias quæ aduersarius de uictu agens qui quotidiana febre laboranti conueniat, scribat. Citans Hip. quarto de ratione uictus dicentem custodire patiētem febrem hyemalem in fame oportet. Per hyemalem febrem eam intelligit; quæ sit à phlegmaticis humoribus similibus naturæ hyemis hæc ille. Quod si ita est, ut ille Hippocratem intelligit. Subtilior uictus in phlegmatica quàm in tertiana exhibendus est. In tertiana enim non custodimus ægrum in fame. Sed re uera Hipp. aliter quàm ille contra se perperam opinatur, intellexit. Nam Hipp. non de

omni febre hyemali sermo est, sed de illa quæ praua affert symptomata. Vt patet ex ijs quæ dixit, lingua aspera redditur, prehendunt animi defectiones. Hunc iubet symptomatum non febris ratione ægrum, in fame seruare. Hæc ipsemet sentit cum dicit huic tam & si febris remitti consueuerit, in eo tamen qui per famem fit cruciatu conseruare ægrum oportet. Neque per famem solum inedia intelligas, sed uictum qui solis adhibetur potibus. Nam λιποκτῖνια uel abstinentiam omnimodam significat, uel eam saltem, quæ in potibus solis fit, uictus rationem. Vt Gal. citato loco scripsit. A manu igitur aduersarij oblatam nobis palmam renuimus, malumus quam uictrici manu decerpimus. Ad rationem quam adducit pro se aduersarius de distantia, & propinquitate status iam supradiximus. Sciendumq; non in omni febre instituendam uictus rationem penes status distantiam, sed solum in ijs quæ aut continuitate, aut symptomatum causa periculum intra dies aliquot uitæ afferunt. At tertiana, & præcipue exquisita citra periculum est. Vt ab Hipp. in primo commentario de morbis uulgaribus accipimus. Quanto autem ab hac degenerat, mixtione phlegmatis cum bilioso humore non absque periculo aliquo febris est. Nam quotidiana siue ea nocturna siue diurna sit, eo non uacat ut ab eodem discimus. Quapropter ratione periculi quod in phlegmatica febre est, tenui magis uictu eos, qui ea detinentur alere oportet. Vt in superioribus adduximus de mente Hip. in eo quod si dolor aliquis uel periculum aliquod comparuerit. Quod si in hac re

i. de morbis uulgaribus.

i. de ratione uictus.

DE VICTV FEBRICIT.

Gal. ut iudicem quis admittat scio aduersariū non obtenturum. Nam legimus eum auium carnes oua, & pisces petrosos, gallorum testiculos, & similia concedere ei qui tertiana febre laborat. Verum in primo ad Glauconem de quotidiana agens, uictum incisiuū administrare iubet. Talem minus nutrire quā prædicta manifestum est. Ex ijs aliquis recte colliget in tertiana non pura ubi bili pituita est admixta, subtiliorem uictū competere quā in ea quæ exquisita est. Qua in sententia Gal. est eodem libro ubi de uictu per cibum, & potū agens, inquit. In non certis tertianis prohibere oportet magis, in quantum possibile est, ita ut neq; ægritudinem augere neque prostrernere patientis uirtutem tempori ampliori affligendam. Id præterea ab eo percipimus cū in huiusmodi non certis tertianis singulis alternis diebus febricitantes solummodo alere iubet. Quod in pura tertiana non consuluit. Quod ergo tenui magis uictu qui à febre phlegmatica, quā qui à tertiana detinetur indigeant satis ostensum est.

C A P. XV.

SED operæpretium erit uia speculationis inquirere, quæ nā uictus forma in quotidianis competat. Nā inter recentiores medicos non conuenit in hac re. Aliqui antiquiores insequentes tenui uictu alere febricitantes usque ad septimum iubet. Ab hoc ingrossare uictum præcipiunt ut uirtus reficiatur, idq; gradatim, Cunque ad ingrossationē debitam augmento peruentū sit, subtiliori utuntur usque ad statum. Alius nō solum primis septem diebus sed per totum ad declinationem

usque iubet, dicens non oportet, ut comedat pullas neq; coturnices subintelligit quidā neq; alias carnes donec quiescat febris ab acuitate sua, et uiolentia. Alius dixit neq; subtilibus, aut subtiliter dīxetur, ne uirtus infirmi deficiendo molestetur. De ijs qui subtilem amant uictum, quidam aquam hordei ad tres dies cōsuluit. Qui post hunc secuti sunt medici per tres dies totum principiu morbi intelligunt. Quidā ex arabibus non spernendus author cōsulit, ut per hebdomadā regatur eger ex aceto & oleo rosarum, zucaro, menta, & oleribus radice siclae & similibus. Ab alio tamen ex arabibus antiquiore medico hanc habuit opinionem, dicente in febre phlegmatica subtilia regimen usq; ad septimum diem. Et si uides eam diminutam diminutione multa procede hac uia. Si uero non uides eam minui, ingrossa regimē secundum quod tibi uidebitur, quoniam inueterabitur, & est dubium de casu uirtutis. Sunt & plures qui diuersa sentiunt, sed longum esset omniū percurrere opiniones. Sed antequam in hāc messem nostram immittamus falcem. Dicere necessarium duco, unde tanta inter medicos discordia in uictus exhibitione in hac febre orta sit, ut à communi ratione quæ chronica febris qualis uictus competat ostendit, discedant. Causa est, ut supra tetigimus communis materiæ abundantia, eueniens ut plurimum in hac febre. Quæ utriusque causæ, et antecedentis, et coniunctæ præparationē, et consumptionem remoratur. Hanc esse in uentriculo, intestinis, & mese raicis hanc in sanguinē conuerti posse si cōtagiū corruptionis non acceperit certum est. Hæc propter eius len-

DE VICTV FEBRICIT.

torem, et tenacem adhærentiã non potest clysterio, aut
 ullo alio medicamento incisivo citra commotionem, &
 læsionem melius erradicari quàm subtili uictu. Nam te-
 nui uictu non solum hæc putant consumere, sed & an-
 tecedentis materiæ bonam partem, natura alimentum
 sumēte conuerso crudo humorem sanguinem. Nam ut
 supra tetigimus, putredo in phlegmate inæqualiter con-
 cipitur, propter partium substantiæ diuersitatem, unde
 natura multum habet quod separet. Vt ergo medici
 experiantur phlegmatis putrescentis dispositionem,
 nempe aptum sit, ut actione naturæ ad bonum reduci
 possit, necne, subtili uictu febricitantes regunt ad se-
 ptimum usque. Considerantq; tunc uirtutis dispositio-
 nem multum, aut parum, aut nihil sit imbecillior facta,
 quod si parum, aut nihil imbecillitatis incurrerit, & cū
 hoc materiam morbi dispositiones naturales recepisse
 medicus coniecerit, sciet humorem aptum nutritioni,
 actioniq; naturæ cadentem, & hac uia procedendū
 esse ad sanationem usque. Quod si contrarium eue-
 niat, à subtili uictu cessandum, naturamq; crassiori
 reficiendam, ut uires assumat contra malum, et fortem
 hostem. Signum si quidem est, putredine humorem ua-
 sta correptum esse. Quapropter ineptum nutritioni
 esse, contumacisq; resistentiæ. Vtraque ergo de causa
 crassiori uictu indicant alendum febricitantē. Quod si
 quod medic loco est eueniat, ut uirtus imbecilla fuerit,
 humor autem dispositionem naturæ receperit, paulo
 crassiori uictu febricitatē ales, ut naturā roboretur.
 Sed minus crasso quàm in prædicto. Est & alia causa

huius controuersia. Febrem hanc chronicam ex sui natura esse, & non absque periculo ut Græci, & Arabes medici testantur. Quia longa est, crassum uictum exposcit, ob periculum uero quod affert, ob paroxysmorum quotidianam inuasionem, & eorum longitudinem, & oris uentriculi læsionem, ad nauseam disponentem, tenuem. Vbi enim aliquod uitæ periculum imminet, attenuandum esse uictum nos docuit Hipp. primo de ratione uictus, & primo de morbis uulgaribus. Cum ergo hæc ita se habeant, non ex æquo hæc uictus difficultas in omni phlegmatis specie accidet. Nā in acetoso minus quam in dulci, & quam in naturali, at in uitreo adhuc acetoso minus. In salso adhuc multo minus. Nā in omnibus, præter naturalem & dulcem pituitæ speciebus materiæ cōmunis multitudo non coniungitur. Nutritioni præterea parū aptæ sunt. Quo fit ut in ijs præter rationem sit subtili uictu per septē dies uti. Præsertim in ea quæ à pituita salsa ortum habet. Tum in ea summam, in qua materiæ communes pituitosæ in uentriculis intestinis, & uis ductuum existētes, ineptæ sunt nutritioni, ob prauam earum dispositionem. Quarū in huius operis initio mentionem fecimus. In quibus non parū leduntur febricitantes ex subtili uictu per hebdomadam. In summa in omni febre longæ terminationis cum materia nutritioni est inepta ex abstinentia, aut subtili uictu, febricitantes grauiter leduntur. Ea si quidē grauis noxa non est qua morbus uires assumit, sed qua corporis uirtus exoluitur, morbi dispositione nihil aut parū in melius addente. Id enim manifestū est, nam

si hominē qui sic afficiatur, sola inedia per aliquot dies
 serues, multo eū imbecilliozem reddes, humore pituito-
 so parum in melius addente. Crassus enim humor, &
 frigidus natura longo indiget tempore, ut coctionē re-
 cipiat. Præcipue cum longe à propria natura est, Qua-
 re citius uirtutem corporis in deterius subtili uictu ad-
 duces, quàm morbum in melius. Cum ergo hæc ita se
 habeant, grauemq; noxam febricitantes incurrere ostē-
 derimus à subtili uictu, cum humor nutritioni ine-
 ptus est, nisi perpetuo aliquo signo, aut signis id discer-
 nere ualeamus, dementis profecto est aliquid agere al-
 cuius commodi gratia, sub periculo maioris damni.
 Quod si id citra uirium dispendium adipisci posse alia
 uia speres, qua materias communes absumas, & ante-
 cedentes si opus fuerit, non ne illam amplectendam esse
 merito quis existimabit, quapropter cum signum certū
 firmum non habeamus, quo à prima, die discernamus
 humoris dispositionem, an ad nutritionem sit aptus nec
 ne, multo melius est, & ægrotantibus salubrius, com-
 muni uia, & regia circa uictus rationem procedere, ci-
 tra aliquod uirium incommodum, quàm ægrotantem
 per discriminum compendia ducere. Adde quod si hoc
 detur, ut à primo die humoris naturam cognoscas aptā
 esse nutritioni, si materiæ communis adest abundan-
 tia, & hanc quoque subtili uictu consumere speres,
 prius putredo in antecedentis materiæ altum penetra-
 bit, quàm natura communem absoluerit. Lōge melius
 profecto est, clysterio quæ in inferiori cōtinentur uētre
 euacuare, lamituo māne, aut floris cassiæ cū oximelite
 aut

aut melle quæ in superioris sūt. Hoc si semel, aut bis usus fueris cū uictu, ut oportet incisivo intra dies tres materias communes absumes. Licet earum abundantia detur. Et interim materia antecedentem non penitus neglexisti. Horū si quidē lenitiuorū quæ acutior pars est ad iocinorē uenas, et renes festinat, ad materiamq; antecedentem cui obuiat non parum iuuat. Quibus ū qui subtili uictu suos nutriunt febricitantes uti nō possunt. Nam ieiunantes non oportet laborare. Quod si communes non adsint materiæ, antecedentis autem bonam nutrire posse partem conieceris, optimum esse iudico subtilem uictum administrare. Vt pote quo natura plus temporis in opere impendit, antecedentemq; ob id materiam citius apparabit, bonum separans, et sibi accipiens prauum ad expulsionem præparans. In subtili præterea uictu incisivas qualitates, & abstergentes inuenias quibus in magis nutriente uictu similes non reperies. Sed difficilis admodum est coniectura dispositionis humorum qui iam putredinem conceperunt, an sint ad nutritionem apti nec ne, nisi id experientia ostendente discamus. Quā in re non expectandum esse septenarium duco, sed melius ita agere. Cum ex signis pituitam naturalem, aut dulcem esse, putredinemq; non profundatam in materia conieceris (quod ex febris uehementia, longitudine, et ipsius inceptione, et finitione, præterea ex symptomatibus, & ex colore faciei, et alijs percipies.) parato statim clisterium ad hunc modum. Cētauream minorem, camomillam, hyssopum, maluas, hordeum excorticatum, contusum, in aqua, & oleo

DE VICTV FEBRICIT.

communi ad æquas partes bulliant quousq; consumpta aqua, olei residens untias decem accipito, adipis anatis aut capi, & mellis, singulorum untias tres, salis parum, quantum possit sublineat. Ab excretionē dato oximelitis untiam unam, mellis rosati collati unam, & semis, aquæ decoctionis seminis fœniculi dulcis duas, et semis, misce dato bis eadem die. Sequenti aurora floris cassiæ, aut mannæ untiam unam, & semis, dissolutæ in aqua decoctionis seminis fœniculi dulcis thymi, et hyssopi, oximelitis untias duas, dato hora quietiori diei secundæ. Quod si bibere potionem renuerit, fac tres bolos cum zinzibere, et zucarō, quæ postquam deglutierit, sorbeat oximelitis coclearia septem. Cūq; hæc peregeris ægrū symmetro uictu seruato eo modo quo supradiximus. Hoc est crassa sorbitione ex decocto pullæ, & ex carnibus eius. Die tertio syrupum bis dato, & similem uictum exhibeto. Quarto die cliesterium ministrato et simili uictu febricitantem alito. Verum à quarto die ad septimum hoc uictu ægrotantem nutrias.

Cicerum electorum man. tres, hordei duos, infundito in aquā tepidā per totam noctem in testa recēti, proijceq; aceti albi tantū ut aqua acetosa reddatur. In crastinū olei purissimi antiqui quantū satis misceto, petroselinū thymi singulorum man. unum, salis parum, coquito ad lentum ignem. Vtere decocto ter in die, et cum pane sorbitiunculam facito. Propinabisque ante cibū mellis rosati collati coclearia duo, oximelitis unum ut supra diximus. Hoc uictu utitor ad septimum usque. Quo temporis intervallo nec purgante medicamento nec clisteri

uteris. Die octavo & vires infirmi & ægritudinis dispositionem contemplare. Si nullam differentiam inueneris sensibilem ad undecimum ita transi. Quod si tunc ægrotantis uirtus parum fuerit imbecillior, morbi autem dispositio in melius plus addiderit, perge hac uictus ratione. Si alias eueniat, crassiori utitor uictu. Et quia bona hominum pars unum duntaxat uictum per dies aliquot ferre non possunt, sunt & qui cicera odio habent, cibum alium apponemus huic proposito maxime idoneum, quo uti possunt qui tenui uictu in hac febre per dies aliquot procedendum esse iudicant. Petroselini herberorum singulorum man. unum, coquito in aqua modice quantitatis &c. In qua duo oua bullire tandiu finito, ut satis dura reddantur, fac collaturam cuius accipito partes tres, olei purissimi unius semis, aceti unam, zucari unam, cum pane fiat sorbitio ad lentum ignem. De subtili igitur uictu qui ad dies septem ab antiquis arabum medicis obseruatur satis sint dicta.

CAP. XVI.

SED qualis uictus ijs qui à quartana detinentur febre conueniat, iam percurramus. Hæc à triplici humore ortum habet, nempe ab atrabile quam sanguinis fecem recte quidam nuncuparunt. Et ut plurimum fit, nulla alia præcedente febre. Fit etiam à bilis croceæ & à pituitæ incensione, & hæ duæ species quartanam notham seu non puram efficiunt, successu aliarum febrium, scilicet tertianæ & quottidianæ. Fit etiam ex sanguinis adustione. Verum ex incensione melancoliæ

DE VICTV FEBRICIT.

naturalis atra bilem posse fieri certum est, sed quod ab ea generetur febris quartana non recipimus. De hoc alias differeñdi aptior dabitur locus. Nunc quem uictū singulæ species exigant dicamus. Iis qui à naturali melancolia febricitant, hanc ministrato sorbitionem.

Pulegij, scolopendrij, hepaticæ, passularum enucleatarum singulorum man. unum, coquito cum pulla crassa, parum antequam ab igne amoveas, immitte florum borraginis man. unum. Coquātur simul, quousque sint permixta, croci modico adiecto, ius dato febricitanti. Ex vel iquo fac sorbitionem.

Sorbi- Iis qui intemperie frigida, & sicca laborant, conuenit
tio ex pulegij, chamæmeli, scolopendrij, hepaticæ singulorum
tocolo- man. unum, passularum enucleatarum unum, coquito
pedrio, cum capo, aut pulla crassa, adiectis floribus borraginis,
fac ut supra. Cunque omnia percocta sint, decoctum col

Sorbi- Iis qui intemperie calida, & humida laborant, conuenit
tio ex unius semis, bulliant ad lentum ignem quousque permi
medul- sceantur. Dato ut sorbeat bis in die aut ter, quod si iu-
la, uenibus, aut alijs natura calidis cibum similem parare
uelis, loco chamæmeli utere uiolis, cum pullis duobus,
reliqua exerce, ut supra.

Acetū Aceti albi libram unam, & semis, passularum enuclea-
pulegij. tarum man. unum, pulegij, chamæmeli, conquassato-
rum ana man. unum, & semis infunde in acetum per
diem & noctem, deinde parum coquito, & collato. Hoc
acetum dicatur pulegij.

*Huius accipe partem unam, olei amigdalorum dulciū
recenter extracti partes tres, zucari albi partes duas,*

coquito in duplici uase quousque permixta fuerint, dato coctearia quinque ut sorbeat ter in die. Quod si caput arietis coquas cum pulegio chamemelo, passulis, scolopendrio quod alias ceterach arabes nuncupant, efficias ius, & sorbitionem satis convenientem ad siccum affectum. In Anglia expertum est mixtionem uini, & lactis his prodesse facta distillatione. Calidam, & humidam aquam ex ijs fore ratio demonstrat. Qua sanari posse eos qui frigida, & sicca intemperie laborant uerisimile est, si parum abcefferint à naturali temperie, quod si quartana à bili adusta ortum habeat, hoc uictu utere. Si iuuenis sit.

Sorbitione
ex capite
arietis

Accipe hordei excorticati ab utroque cortice, man. unū & semis, uiolarum recentium, hepatica, chamemeli, singulorum man. unum, coquito cum duobus pullis crassis quantum satis, deinde parum antea quam ab igne amoueas, addito florum uiolarum man. tres, collato accipitoque huius decocti libras tres, medullæ cruris uituli libræ unius semis, coquantur omnia simul donec permisceantur, dato ut ter in die sorbeat.

Sorbitione
ex floribus
uiolarum.

Sorbitione quoque ex pedibus uituli decoctis cum bordeo uiolis hepatica pulegio scolopendrio, aut politrice passulis, croco, ualde utilis est ijs, qui a bile adusta febricitant, cum coquantur donec tenerrimi reddantur.

Aquæ decoctionis florum uiolarum, aut borraginis libram unam, amigdalorum dulcium, & nucleorum persicorum singulorum untias tres, excorticentur, et tritentur diligenter, & exprimito in decoctum toties donec aqua albescat, butyri recentis multoties loti untias

DE VICTV FEBRICIT.

- Lac nu
cleorū
perfico
rum.** *tres, zucarī albi quantum satis, sit cinamoni parum, bulliant ad lentum ignem donec permixta sint.*
- Sorbitio
ex adipe** *Lactucas quoque crudas ex melle offeres ijs, ut cum libuerit deuorent. Iis ante cibum dato syrupi uiolarum purissimi untias tres, uinum album dilutum ex aqua de coctionis politrīci recentis, super bibant.*
- Iis qui quartana ex phlegmate adusto laborant sorbitionem parato, ex pulla crassa cum chamemelo, pulegio, thymo, passulis, satiregia, postquam herbas iam coctas abstuleris, axungia ab anate recenter extracta, aut capi si illius copia nō detur, immitte untias tres, longi piperis grosso modo contriti, grana tria, bulliant simul adiecto croci modico, ius propina ubi oportet ex re fiduo fac sorbitionem.*
- Sorbitionem præterea ex furfure cum chamemelo pulegio & melle administrato. Quam in fine huius libri cum de obstructione nobis sermo fuerit traddemus.*
- Sorbitio
ex alleis.** *Pinguis arietis ceruicem, satiregia, chamemelo, pulegio, tribusq; alijs integris ciceribus & sale coquito, cunque herbas iam coctas abstraxeris, addito adipis anatis, aut capi recentis partem quintam, croci parum fac ut supra.*
- Sorbi-
tio ex
camo-
milla.** *Capum pinguisimum cum chamemeli tribus man. coquito, & cum sale & croco fac ut bulliat sufficienter, consulito ægrotanti ut bis aut ter in die magnum sorbeat hantum calidum. Commodissima his sorbitio hæc est, ad alios usus etiam utilis. Ante cibum ijs dato mellis uiolacei colearia quinque.*
- Iis qui quartana ab adustione sanguinis laborant, hñc*

administrabis uictū. Hepatica man. tres, hordei ab uno cortice exuti, capillorum ueneris recentis prunorum singulorum man. unum, passularum enucleatarum unum, eupatorii quod alias agrimonia à Dioscoride dicitur, foliorum pentaphilonis singulorum unum & semis, coquito simul cum duobus pinguisissimis pullis, aut in uene capo, fac ut supra. Ante cibum sorbeat syrupi uolarum coclearia tria, syrupi borraginis coclearia duo simul mixta.

Sorbi-
tio ex
eupato-
rio.

C A P. XVII.

INTER medicos circa uictum qui quartanæ cōpetit non satis cōuenit, sunt qui magis crasso in initio quā in augmento & hic quam in statu utendum esse contendāt, continuari febrium rationem, ad omnia febrium genera communem facientes. Sunt qui contra cēseant, nempe in principio magis tenui, & crassiori semper ad statum nutriendos esse aegrotantes, in eo autem tenuius multo reficiendum esse. Sunt & alij mediæ opinionis, qui à principio ad aliquot dies tenuiter febricitantes reficiunt, deinde crassiores exhibēt uictum. Multoties quartanas febres in principio curatas esse tenui uictu dicentes. Si enim febris parum sit duratura, & crassum uictum in principio humeris resolutionem prohibētem ministraueris longiorem eam efficies. Quod si longa futura sit, parum nocebis aut nihil, si tenui uictu quo uirtus non absumatur per dies aliquot utaris. Qui ita sentiunt pullorum carnes ad uigesimum diem prohibent. Ego autem quid sentiam citra disputationis contentionem dicam. In quartanis quæ aliarum febrium

DE VICTV FEBRICIT.

successu sunt, locū non esse huic dubitationi arbitror. Non est enim quod uirtutem multum defatigatam à præcedente febre, & aduentu alterius, iam languescentem, tenui uictu exoluas, ad certamen eam denuo impellens. Neque si detur ut tenui uictu laborantem ad uigesimali diem, serues, & morbi materiam absumas, ob id hominem à febre liberabis. Nam in quartanis febribus quæ post alias succedunt, solent ab intemperie aliqua, uiscera molestari, quæ morbum fouet, & durationis eius præcipua est causa. Hac enim stante in uasis, iocinere, aut liene, continua fit humoris regeneratio. In quartana igitur febre quæ successu alicuius alterius facta est, præcipuus sanandi hominis scopus est, ut uiscera ad pristinam reducamus temperiem. Cæterum alterantia medicamina cibus immiscere melius esse supra ostendimus, quam si nuda exhibeamus. Ut consueuere triuiales nostri temporis medici, quorum nisi quis syrupos, apozimata, distillationum aquas, electuaria, purgatiua medicamenta exhibeat, se nihil bono medico dignū egisse putat. Et hinc fit ut ex reiteratione multiplici illa fastidientibus infirmis, in uentriculo non recte ad actum reducantur, quæ causa est ut infelicitè operentur. Quapropter non solum non prodesse tunc temporis, sed nocere certum est. Cum multoties propter illa cibos fastidiant infirmi, & imbecilliores ideo reddantur. Quicumque igitur medicam artem ita exercent, necesse est, ut multoties ægrotantes lædant, præsertim si corporibus imbecilibus, & à longis ægritudinibus tabefactis obuiant. Qui uero Hip. sequuntur, & eius in

primo de morbis uulgaribus acquiescunt consilio, dicē-
tis. In hoc te exerceto, ut saltem si non prosis ne quid no-
ceas, longe melius esse existimabunt, ut huiusmodi cor-
poribus non tenuem uictum, non medicamina alteran-
tia, si nuda offerantur, sed ijs quæ nutriunt, & bonum
generant chrymum, ea miscere, quæ paulatim ualeant
morbificas partium intemperies euertere. At in febre
quartana quæ repente incipit, subtilem uictum ut pote
qui facilioris coctionis sit, ad dies uiginti qui septē con-
tinet quartanæ periodos, probo. Hunc dico pullorum iu-
scula, sorbitiones, eo quo supra parauimus modo.

C A P . X V I I I .

S E D cum in quartana febre compertum sit ciba-
ria diuersa prauæ substantiæ, liberare multoties eos qui
hac febre laborant. Ita ut alios, iurides ficus, aut uuas
nocturno rore madentes, alios carnes porcinas ad satie-
tatem comedētes, sanatos esse sciamus, & plurima alia
id genus. Ad medicum arbitror attinere, si horum non
lateat rationes. Vt ijs quādo occasio affuerit uti sciat.
Præterea quātum medico dedecoris est, per plures dies
& menses uarijs remedijs abuso, et nihil proficienti, ac-
cedente rustico salsuginem offerente, sanetur ægrōtās,
medico & eius arti irridente, tantum ei gloriæ est ea
non latere quæ multoties admirabili in homines repen-
te ab antiquis liberant ægrotudinibus. In febre igitur
quartana rationem reddere conabimur, quam ob rem
diuersa cibaria quæ prauæ substantiæ sunt, aliquoties
quartanam soluant. Secundo illud aliquoties, signis
manifestis describemus, ut cum occasio affuerit eam

DE VICTV FEBRICIT.

arripere diligens possit medicus. Paroxysmorum causa, motus est humoris putrescentis, cui naturæ expulsio cōiuncta est. Putridi humoris est, quodā putredinali irritamento naturam instimulare. Facultatis uero expultricis, humorem certis periodis irritantem, meliori quo possit modo, depellere. Contingit autem ut cum per senfiles repente excrementorum copia feratur partes, horrorem, rigorem, aut frigus excitari. Motus ergo ille quodammodo medius est inter naturalem, qui à natura sola naturaliter operante fit (ut cum post coëctricis facultatis actionem agit) et in naturalē, qui à sola causa præternaturali fit, ut cū mouetur furiosus humor. Nec igitur à sola natura fit paroxysmus. Nec à solo humoris irritationis motu, periodicè febres cōtingunt. Vterq; enim motus & naturæ & humoris concurrunt, in paroxismo, ut perdocte à Petro Aponensi peritissimo medico scriptū est, in hæc uerba. Quantum (inquit) ad naturā particularem comparando in quantum scilicet motus humorū ex actione uirtutis dependet, tempora periodorū in morbis non sunt determinata, nec unius modi, ut possimus dicere quod morbus factus ex cholera habeat motū de tertio in tertium, et de phlegmate in diē, & ex melancolia in quartū, immo respectu cuiuslibet humoris hæc tempora sunt, & possunt esse diuersa. Ita ut aliquando periodicè morbus factus ex uno humore eueniat secundū dies, aliquādo secundū menses, uel annos. Quod ideo contingit quia uirtus expulsiua suā operatur actionē quocunq; tempore superfluum ei occurrerit, irritans eā per sui lesionem ad actum expulsionis,

Et quia tale superfluum potest diuersis temporibus occurrere cum eius generatio dependeat à causis diuersis, nunc uno tempore occurrentibus, nunc alio, et alio iccirco tempus periodici motus non est unum, sed diuersum. Similiter et aggregatio superfluitatis, quæ depēdet ex defectu uirtutis digestiue non habet tempus præcise determinatum, sed diuersum secundum diuersitatem eorum, quæ occurrunt intrinsecus, et extrinsecus. Hæc ille, interceptio ergo paroxysmorū dupliciter contingere potest, aut ratione expultricis facultatis, aut ratione superflui aggregati, primū adhuc dupliciter, aut quia non instimulatur, factō sensu hebetiori, aut ob fortem animi motionem expultricem ab opere suo perturbantem. Ad primum modum reducuntur medicamenta ea, quæ uirtutes habent narcoticorū, ut theriaca, athanasia, philonium Romanum, quæ sanare quartanas febres experientia compertum est. Id etiam discimus ex Gal. ijs diuersis locis utente, ad sanationē febris quartanæ. Ad secundum reducitur quod ab aliquibus dictum est. ob uehementem lætitiā plures quartanam euasisse febrem, sensoria facultate munere suo non fungente. Ob quamlibet prædictarū causarum uirtus expultrix non irritata, expulsionis opus non aggreditur. Non facta, expulsionē interrumpitur paroxysmus, ut supra habitū est. Ratione superflui dupliciter, aut quia non aggregatur, aut si aggregatur euacuatur. Primo modo adhuc dupliciter, aut ob uigorem uirtutis cōtricticis, aut ob defectum causæ aggregatricis. Et hoc adhuc dupliciter, aut ut efficiēs, aut ut materia. Hoc modo alimus febrim.

DE VICTU FEBRICIT.

citatem febre quartana cibarijs, quæ suapte natura in melancoliam facile conuerti non possunt. Talia sunt cibaria calida & humida, non quæcunq; sed quæ non facile in melancoliam conuertantur, ut pulla gallinacea, capus, arietis caro. Sunt alia quæ calida & humida sunt & longe absunt, ut in melancoliam conuerti possint, talia sunt olea matura præcipue amigdalarum, sesamæ, axungie anatis, ficus aridæ, & similia. Omnia ergo huiusmodi cibaria calida & humida difficulter melancolica naturæ cædētia, si cum hoc à coëtrice facultate facile uincantur, utroq; modo quartanas febres sanant, nempe efficientis causæ & materiæ ablatione. Id est quia melancolici humoris intemperiem aggregatricem, scilicet causam contraria qualitate euertunt, & quia ut materia inepta melancolico humori, cessare faciunt atra biliosi humoris regenerationem. Ad has duas causas reducuntur cibaria à nobis supra scripta, quæ quartana laborantibus administrari iussimus. Hoc modo oleum amigdalarum dulcium cum croco, aceto pauco bibitum, sanat quartanas. Hac de causa distillatione uini et lactis plures quartanam euasisse compertum est in Anglia. Tunc ob fortitudinem coëtricis facultatis ægrotantes euadūt quartanam, cum maior pars humoris qui ad paroxysmum aggregatur suppeditatur à cibis & potibus quibus quotidie laborans utitur. Cunq; hoc conieceris facultatem roborare coëtricem, quartanæ remedium esse scias. Roboratur dupliciter, aut absolute, aut respectu alicuius cibi, & potus. Pro comperto est ea quæ nimis delectant, & placent, melius à co-

et trice, coqui ab attractice trahi, à retentrice retineri, uberiusq; multo nutrire, et minus superflui ab ijs quàm ab alio implacido accrescere. Hoc modo cibum quem avidissime febricitans appetat quartanam posse sanare experientia compertum est. Quod si præter hoc quod magno appetatur affectu supra dicta habeat, quæ ad defectum aggregatricis causæ facere diximus, adhuc certius quartanam erradicare posse sperabimus. Hac de causa plurimos carnis porcine usu, à quartana liberatos fuisse compertum est. Quia enim nimis appetitur recte coquitur in uentriculo, iocinere, & uenis, quare parum ex ea superflui colligitur, sed & intemperiem obiter siccam quæ humoris atra biliosi uelut scaturiens fons est, mire corrigit. Soluere igitur quartanam carnem porcine aliquando posse, ex dictis manifestum est. Quæ etiam absolute roborant coctricem facultatem, quartanam soluere possunt. Vinum ante omnia præcipue odoriferum id habet, ut ualenter naturales roboret actiones, unde ebrietatem posse curare febrem quartanam, tum hac de causa, tum sensu facto hebetiori haud dubium est. Curantur similiter quartanæ febres ex superflui aggregati euacuatione. Hoc modo medicamenta melancoliam educentia, ut polipodium, epithymum, sene, corticem hellebori, sanare quartanas pro comperto est. Hanc partem solum sibi nostræ tempestatis medici reseruauerunt, reliquas omittentes, ac si non esset præter illam uia alia, qua à quartana liberentur homines, hoc modo qui uuas maturas nocturno rore madentes ad saturitatem ingerunt, & ficus magnas tempestiua ma-

DE VICTV FEBRICIT.

turitate cadentes, à quartanis febribus liberantur. Hi enim et similes fructus aluū aliquando immodice cient. Cū igitur perceperis ex cibis, aut potibus humoris maiore partem qui paroxysmum efficit suppeditari, dandi ea quæ placent tunc occasio est. Illud autem ijs signis percipies. Primo subtiliori te utente uictu per aliquot dies, si imminuatur febris magnitudo & uehementia. Secundo, cibo id experieris, qui difficulter in melancoliam conuertatur, aut minimū habeat melancolicæ naturæ. Si enim hoc cibo te utente per dies aliquot, imminuatur paroxysmus, adhuc certiori cōiectura inniteris, à cibis & potibus humoris maiorem partem ad paroxysmum suppeditari. Hoc idem est ac si dicas si iuxta ciborum quantitatem & qualitatem quibus laborans utitur ita uariant paroxysmi, cōiectura assequeris exhibendi ea quæ ægrotanti placent occasionem adesse. Quare diligenter inquirito quem nam ex cibis febricitans ardentem appetat. Si ex ijs fuerit, qui qualitate atra bili contrarius est, & tali substantia, ut difficulter in melancoliā conuertatur, laboranti porrige hora cōsuetā, quæ ab initio uenturi paroxysmi duodecim horis ad minus distet. Comedat pro appetentia citra saturitatem. Quod si cibus quem appetierit melancolicæ naturæ sit, aut in melancoliam facile conuertatur. Considerare tum opus est signa cōtioneis, quæ si sint, dato eo, quo diximus, modo, quod si non, modicum illius febricitanti abnegare nolle, sciens nonnulla fieri & plura posse, citra rationem homini manifestam. Parū insuper deterior cibus si delectabilis, &c. Quæ facultatem

expultricem respiciunt, tunc sunt administranda cum nimis uigilanti sensoria facultati præcipuâ continuationis paroxysmorum dederis causam. Tunc aut his quæ aliquâ habent narcotici uirtutem, aut forti & repentina aliqua motione, sensum ægrotantis oportet hebetescere, animum alio trahendo. Illud percipies si primo quæ nam sint corpora acuti sensus cognoscas. Hæc aliquando iusto quærentur, quandoq; iniusto. Cum initia paroxysmorum grauius ferunt, rigore, frigore, uehementer quatiuntur molestantur, ipsam autem febrē parua, magnitudine, duratione, uehementia intelligas. Scito sensoria in ijs facultatē parumper ob dormire remedium esse. Sunt tales ij qui acerrima sunt præditi imaginatione, ita ut multoties cogitantes rideant, facies mutent, oculos, manusue moueant. Iis parua occasione, imaginatione coniuncta, multoties paroxysmum efficit. Quare hos tales curabis si eorum mentes alio trahas, ut mihi in Anglia contigit. Erat iuuenis habitu gracili sicco temperamento, laborans tertiana, cunque post aliquot dies abire Londinum decreuisssem (nam in rure erat) ei dicturus accessi, quæ me discedente agere deberet. Cunque finem sermoni imposuisssem, tu inquit discedis quia me moriturum certo conijcis. Cunque iureiurando contrarium ostendisssem, repente in lecto sedens, uestem & calceos petiuit. Quid inquam cum istis agere uis, surgere inquit, ut experiar an me meis pedibus sustinere ualeam, quod si hoc detur abi. Cunque surgens in fenestram quæ in uirides campos late patentes prospectū habebat concessisset, intuens, animi deliquio captus

DE VICTV FEBRICIT.

est. Cunque in lectū portaretur parumq; requieuiſſet, lachrymis obortis, domine inquit Brude non ne tibi dixi quia morior. Cunque uxorem clientes, & amicos conuocasset, omnibus aſtantibus dixit, ſcitis amici morior, medicus abire uult, ut me morientem non uideat. Cunque ei obieciſſem, quid inquam mihi dabis, ſi te ab hoc morbo liberum reddam. Repente miro animi affectu commotus, pete inquit, non minus dabo quam poſtulas. Cunque peterem dedita opera aliquot aureos. Parum inquit petiſti, allato ſcrinio numerauit pecunias. Quia inquam ſtatim ſoluiſti liberalis uiri functus officio, non te relinquam prius, quā ad rus concedas, & perdices, et phasianos aliquot ex tua uenatione mecum in domum portē. Hoc audito clamauit ſanus ſum. Cunque aperte perſpexiſſem hominem acri præditum imaginatione, ut qui modo mortuum ſe eſſe putabat, nunc ſe ſanum fateatur, pectore hæc uerſatus, modum quo hominem à tertiana liberarem inueni. Die ſequenti cum febris hora decima eum inuaſura eſſet, nocte ante habito cum uxore, & clientibus conſilio. Inſi ut omnes fenestræ ad horā nonam aperirentur (aperiebantur enim ante ſextam) tresq; horas hæro ſuffurarentur. Cunque hoc ita decretum eſſet, mane omnes ex conſulto non intrarunt in cubiculum. Cunque uxorem hora octaua uocasset, quotta inquit hora eſt, illa quintā dicens, dormireq; eum iubens abiit. Hora tranſacta clientē uocans, cum ab eo accepisset horā eſſe ſextam, quiete egit, poſt horā quam ſeptimā exiſtimabat, acceſſi. Cunque in ſermonibus horam traxiſſemus, præcor inquam

R

DE VICTV FEBRICIT.

passi medicorum opem inane diu experti, à rustico filiculi am, aut rici semen, aut quod uis aliud ministrante repente liberati sunt. Indeque arbitratur uulgus illa pharmaca longe ab ijs quibus medici utuntur abesse, et ea ut sacra ueneratur, ignorans quanti sit occasio ad saluationem momenti. Hanc nactum medicum secure operari, cito sanare posse certum est, minimo humani corporis damno. Morituris nullius occasionem esse. Adhibendi ea quæ aliu ciet in quartana, aut alia longa febre occasione, in principio morbi, aut inclinatione quæ uere oportet. Iis duobus temporibus intemperies non est, quæ febrem ad longum foueat. Verum quandoque intemperies febres præcedit. Oportet ergo, ut signis proprijs singulas quas in corpore unaquæque febris generat intemperies cognoscas. Cum has omnino abesse scias, humorem autem collectum in loco uno ex hypostasi laudabili, conijcies occasionem adesse pharmaci offerendi. Fructus autem qui medicamenti educentis uim habent, plus prodesse quia citra abhominatorem assumuntur, quinimmo appetuntur, ut plurimum. Quapropter recte in uentriculo ad actum reducuntur, & per totum distribuuntur corpus. Vnde quadam naturali, & consueta naturæ corporis actione, suum opus agunt. Quare multo commodius id quod noxium est educunt. Contrarium euenit ijs quæ cum uiolentia operantur pharmacis, naturæ corporis uim inferentibus, quadam præter naturali commotione, bonum simul cum malo educentibus. In ea autem commotione noxi contactu bonum posse affici certum est. Vnde fomentum

dari recidiuæ. Quare habita occasione ijs quæ citra commotionem educunt utere.

CAP. XIX.

MALITIA morbi quam Græci κακότης, uocant, dupliciter dicitur, aut actionis, aut resistentiæ ratione. Primo modo malignum dicimus morbum, cum uiolenta actione substantiam spiritus qui naturæ ueicum est instrumentum exoluit, aut sanguinem ad eorum generationem indisponit. Aut quia pertinaci resistentia uires coquentis facultatis obtundit. Primum malignitatis modum tetigit Gal. in expositione illius, & refrigerata extrema. Secundum quarto de methodo medendi aliquod ulcus cacoethes, hoc est malæ morigerationis uocans. Pestilentes febres primo modo malignæ sunt. Vtroque autem modo febris quæ à carbunculi inflammatione originem habet. Pestilens febris non eam quam reliquæ acutæ febres uictus rationem exposcit. Causa est quia tenuem uictum in illis, ob id maxime ministramus, ut natura coctioni materiæ morbi fortiter uacet. At in pestilenti febre id diligenter curamus, ut duellum inter naturam, & pestilentem humorem caueamus. Nam ut plurimum ex tali certamine natura uincitur, ut scite à Gal. scriptum est in Apho. cū dixit. Nouimus plures ex crisibus sanatos quam mortuos nisi pestilens fuerit constitutio, &c. Cum ergo hoc ita se habeat, cessat in pestilenti febre una tenuis uictus causa. Quinimmo cum hæc febris substantiam spiritus fortiter exoluat, & materiam ad eorum generationem indisponat, oportet ut diligentia omni prudens medicus

4. de r
tione
uictus

DE VICTU FEBRICIT.

Et cibo, et potu competentibus, materiam generationis spiritus suppeditet. Et quia ab antiquis medicis ostensum est spiritus unicum esse ad omnes actiones instrumentum, cunque in nullo, et si acutissimo morbo tanta fiat spiritus consumptio ac in pestilente febre, recte quis colliget eo cibo utendum esse qui facillime sit coctionis. At huiusmodi cibaria tali sunt substantia ut prompte huc, et illuc mutetur, ita ut rationabiliter uerendum sit ne à pestilenti corrumpantur prius contagio, quam à naturali calido uincantur. Crassa uero cibaria exhibenda non sunt, quia à naturali eorum calido, ut pote languido uinci non possunt. Quæ causa est, ut non solum spiritus materiam non ministrent, uerum, et in pestilentem causam addant. Cui necesse sit alterum duorum eis dominari. Quæ facillime coctionis sunt, et mediocriter nutriunt, ut oua, et carniū succus, fugienda esse uidentur, nam promptus à pestilentis cōtagij ui, quam à natura uincuntur. Difficile igitur nimirum est conuenientē cibum in pestilenti febre reperire. Talem dico qui materiam spiritus abunde suppeditet, facillime sit coctionis, difficulterque pestilenti cedat contagio, in simplicibus hæc inuenire raro admodum est. Quare in ijs, quæ adinuicem miscentur, quod conueniat reperire tendendum est. Iis quidem, quæ spiritus multitudinem creant, et facili coctionis sunt, ea miscere, quæ pestilenti contagio obsistant. Et autem sunt, quæ natura sunt sicca, et in altum corporis cita penetratione semergunt exiccantem facultatem toti communicantia. Quod si præter hæc à tergo astrictoria polleant ui, quæ cor-

poris vias compescant, quodcunque id sit pestilenti contagio obstare recte dicetur. Sal in primis habere locum usus ostendit, quo corpora incorrupta ad longum tempus seruamus. In eo igitur iam dicta percipimus nempe exiccationem, penetrationem, & astrictionem. Secundum locum habent omnia acetosa, ex quibus acetum in primis se offert, deinde succus arantij, & succus malignanati acidi, ab ijs amara, sed quia calida sunt, minus conueniunt. Oua recentia facillime sunt coctionis, et ad generationem spiritus materiam præbent. Ne ergo in pestilentem materiam conuertantur, ea hoc modo exhibere expediet. Ouum recens integrum immittito in aquam frigidam mixtam cum aceto, ibique esse finito tribus horis, tandem ouum rumpito, & album extra mittito, succo arantij, aut aceto albo capacitatem impleto, salis tantum addito, ut mediocriter salsum efficias, coquito supra cinerem calidum, miscetoque donec crassum reddatur. Vtere eodem cum succo mali citrei loco arantij aut aceti. Item perdicis carnosæ, aut phasiani, aut iuuenis colom bæ viscera effodito, eamque salem condito, ita ut perdicem mediocriter salitam efficias, eam sic esse finito die una in æstate, aut duabus in hyeme. Postmodum in eam mali citrei frustra immittito, & petroselini folia, ut quod inane in perdice est impleatur, eamque ad ignem lentum coquito. Cunque humor intrinsecus extra erumpat, & perdix tota humecta fiat, super eam sal undique spergito. Cunque mediocriter assa fuerit, humorem qui ab ea deorsum destillauerit digito excipito, experieque an salsus sit, quod si non, adhuc iterum

DE VICTV FEBRICIT.

sal inſpergito, ut tandem ſuccus mediocriter ſaluſ red datur. Tandiu ad ignem perdicem eſſe ſinito quouſque humor exiccetur, poſtea ab igne amoueto, perdicemque in parua fruſta ſecato, & in linteum demittito, duobuſque in contrarium retorquentibus prouiribus totuſ eiꝯ ſuccuſ extrahatur. Quem ægrotanti miniſtrato. Multum quidem nutrit, ſpirituſ ſubſtantiam auget, uentriculũ roborat, & peſtilenti infectioni ualde obſiſtit. Idem eſt capo, aut pulla gallinacea. ſi illoruꝯ non detur copia efficere poſſis, & alijs montan. paſſeribus. Neque aliquiſ admiretur, noſ, & ouum, & ſuccoſ ex carnibus ſaluſa ex conſulto efficere. Cum enim abiiciens animo uoluat, peſtilentem febrem naturales priuatim actioneſ corrumpere, nempe cordiſ, iocineriſ, & uentri culi (ut ex uomitu fluxu uentriſ, uriniſ rubeiſ cõturbatiſ, & ex inordinato pulſu, oſtenditur) peſtilentemque infectionem citiuſ ijs partibuſ quæ humidiora ſunt communicari (humiditaſ enim peſtilentiſ contagij fomentuꝯ eſt) haud quaquam præter rationem eſſe ea, quæ diximus exiſtimabit. Quinimmo ab ipſa reruꝯ natura in id ducimur. Eaſ ſi quidem corporiſ parteſ, quæ peſtilenti contagio affectæ ſunt, ſcimuſ præter naturam humectæ eſſe, actioneſque earuꝯ ob id reſolui. Quare uel cibaria ipſa natura ſicca eſſe oportet, aut ſi talia propter duram cõtioneꝯ non conueniant, ſaltem cibiſ ea quæ exiccare ualeant ſunt miſcenda. Sal autem, ut diximuſ omniuꝯ eſt efficaciffimuꝯ aduerſuſ omnem corruptelam, maximeque humano generi familiare. Quare ſaluſa omnia huic feбри conuenire rationaliſ me

thodus docet. Neque ob id quod sitim generant rejicienda sunt, quinimmo hoc nomine amplectenda. Nam saluberrimum est in hac febre sitire, duplici ratione, & signi, & causæ. Indicat enim actionem sensoriæ facultatis oris uentriculi incolumen esse. Sitiens præterea frigida delectatur. Potum autem aquæ frigida ijs salubrem esse communis medicorum schola fatetur. Sed non deerunt qui salsa ijs damnent, tanquã feбри, et eius causæ incommoda. Nam salsa feбри non sunt contraria. Potius enim frigida, & humida. Nam omnem febrem calidam, & siccam esse intemperiem, medici asserrunt. Putridus præterea humor non salsus, sed ijs, quæ per aluum, aut urinam, aut sudores educere possunt extra corpus pellitur. Sed si quis accuratius cuiusque humoralis febris remedia consideret, inueniet, medicum utraque artis medicæ parte uti, tum ea quæ curat, tum ea quæ præcauet. Frigidam offerens medicus, febrem præsentem curat. Exhibens pharmacum, futuram præcauet. Vomitum, sudores, urinas euocans, humorem putridum febrem efficientem extra corpus pellit. Poros autem corporis aperiens, aut abundantiam euacuatione minuens, perspirationes liberas efficit. Exindeque præcauet ne ulterius putredinalis affectio grassetur, et sanos corruptela ne afficiat humores. Hoc autem est causam corruptionis tollere. Hocq; est ultimum quod rationali deuenimus methodo. Idque primum quod opere exequimur. Nempe cum aliquis intra corpus putridus humor sit, febrem efficiens, ut qui sani sunt ne eius contagio afficiantur humores in primis curare. Si

DE VICTV FEBRICIT.

igitur in omni humoralī febre id agere tenemur, multo
 p̄fectō causatius impestilenti, quæ efficacissima ui qui
 bus obuiat afficit, id in primis nos agere iustum est. Qua
 re non solum ijs, quæ perspirationes liberas efficiūt, nec
 potionibus, & medicamētis quæ intro assumūtur (quid
 alias in alijs febribus ob imbecillem putridi humoris
 uim fecisse sat est) sed, & cibus id tentandum efficere,
 ut pro uirili corruptioni exitialiter grassanti obstemus.
 At salsa, ut diximus primum habent locū, ut experien-
 tia, & ratio ostendunt. Melius si quidē res salis quàm
 acetosis seruantur. Efficacius sale quàm aceto. Neque
 ideo quod febrilem calorem acuiunt, ab eorum usu ces-
 sandum est. Nam prudentis est inter damna minus eli-
 gere. Insuper præceptum est nobis à Gal. in de compli-
 cati affectibus ad id quod uicem causæ habet, aut ma-
 gis urget, præcipuam indicationem habendā esse. Quæ
 propter utraq; ratione pestilenti contagio prius obsta-
 re debemus. Tanquam ei quod magis urget, & febris
 futuræ uicem habeat causæ. Medici præterea cibos exic-
 cantes ministrare iubent. Vt acetum, & multa, quæ po-
 testate astringunt. Vt succus granatorum, arantij, ace-
 tose herbe, et similia, quæ omnia humoris corrupti ex-
 cretioni obstant. Corruptionem grassantem, magis
 quam febrē, & eius causam respicientes. Ad hæc in pe-
 stilenti febre diligente prospiciendum est uentriculo,
 ut id quod assumit æger retinere possit, alioquin neque
 uirtuti opitulari, neq; morbo occurrere possimus. Qua
 re eo me hæc adduxit ratio, ut mihi persuasū sit, salitos
 pisces ijs fore ex usu. Si sint ex ijs qui facile coquantur

Hos si quidem uenterculum ualde exiccare, roborare, appetentiam excitare. sitim immoderatam inducere, subuersum uenterculum, et nauseantem componere certum est, cum hac scriptis mandarem, mihi relatum est, chirurgum senem in Anglia solitum esse piscibus salitis quos herinches angli uocant, pestilentia laborantes feliciter nutrire. Quorum si copia non detur eorum loco ex paruorum piscium genere utitor, quod sal & fumum melius recipiat. Caterum oportebit ab usu salitorum piscium egrotantem admonere, ut à potu hora una abstineat. Postmodum frigidam quantum haustu bibere possit dato. Vsus huiusmodi piscium aduersus humiditatem tenuem corruptam in uenterculo efficacissimus est. Quantum autem huiusmodi saliti pisces uenterculum robovent, & nauseantem reprimant, & appetentiam excitent, odor eorum declarat, quo non parum uenterculi appetentia elicitur. Qui ergo ijs assentit rationibus, eis utatur assis infusis in aceto, aut in succo acetosæ herbe. Carnibus autem sale conditis quibus borealior Hispania pars utitur, ob id quia duræ sunt coctionis uti consilium non est. Earum tamen succo cum decenter assæ sunt uti melius erit. Spiritus abunde carniū succus generat, & uenterculum roborat. Proinde id summo opere cauendum est, ne eundem cibum toties offeramus, ut eum fastidiat eger. Quare oportet medicum diuersa cibaria mente concipere, ut eorum singulis utatur cum opportunum fuerit. Dulcia omnia & unctiosa & quæ calida sunt, & humida diligenter cauenda sunt. Lentes cum multo aceto, & sale croco,

DE VICTV FEBRICIT.

Et petroselino cocta, ut supra diximus cōueniunt. Granata acida cum uoluerit laboranti dato. soleas conditas salsamento salubriter ijs ministrato. Quas ita parabis. Lauato & sale eas conspergito, & oleo coquito, postmodum eas refrigerari sinito, eas tandem in acetum acerrimum infundito. Et frusta mali citrei, & limonum, & folia lauri projcito, quantum earum copia poposcerit. Iis ad diem tertium utere. Carnes ad hunc modum quæ sub renibus sunt uitulæ sale conspergito, & in acetum acre cum origano, & mali citrei, aut limonum segmentis, & allijs infundito. Ad diem quintum percoctarum ad ignem succis utere, ut supra dictum est. Quod si ager carnes huiusmodi edere appetierit parum dato, & cultello minutatim incidito. Simili modo perdices, phasianos, & montanos, passeret condire possis.

C A P. XX.

EST quidem unus è nostris qui cum de cibis, & potibus ageret, qui præseruant ab epidimia dixit. Non auscultetur opinio illorum, qui dicunt allium ualere quia falsa est, quia generat, inquit fumositatem, & super calfaciendo adiuuat ebullitionem, & sanguinē adurit, ex quo adusto generantur apostemata mortifera. Sed non ab re fuerit, an allia in pestilentia conueniant gratia præseruationis inuestigare. Et postmodum an in cibis miscenda sunt gratia curationis. Primum illud querendum an præseruandus ijs assuetus sit bona ualitudine, quod si sic haud dubio dimittenda non sunt. Nā imprudentis fuerit hominis consuetudinem in pestilen-

tiali constitutione demittere. Nam eius demissionem efficacissimam morborum causam esse à peritissimis medicis ostensum est. Aegrotandi autem occasionem dare in pestilentiali constitutione stultissimum est. Quod si ex ijs fuerit, qui alijs aliquoties utatur, et quandoque non (ut sæpe accidit) neq; capitis gravitatem, nec præter solitum se calidiorē ab eorū usu sentiat, huic profecto ad præseruationem pestilentis contagij allia ministranda fore prout eis alias usus est censeo, præsertim si hyems sit. Hoc ut ostendamus experientiam aliorum in medium adducere non ab re erit. Messeres æstate feruēte incalescente sole post meridiem allia cum pane uorant, ut minus ab æstu offendantur, et in sudores eorum minus soluantur corpora. Nam aliq; ui continentis æstui fortius obsistunt, quàm ij qui eis usi, non fuerint. Adde quod ab externo frigore idem corpora tuetur, & ei minus obnoxia ea reddit. Hos effectus allium sola, ut agat qualitate fieri non potest. Nam in symbolizantibus facilius est transitus. Neceffe est ergo hoc in esse allio ob id, quia calidum roborat naturale. Quo fit ut corpori ualidius dominetur. Ita ut ab externa causa quæcunque sit difficilius uincatur. Fieri quidem nequit, ut exterior occasio in corpus humanum suam imprimat actionem, calido naturali ualido existente. Quod cum ita sit, quis negabit pro pestiferi contagij, aut cuius uis impressionis præseruatione, ea fore omni diligentia querenda auxilia, quæ natium calidum roborare queant. Cunque hoc insit alijs, recte ministrari ijs, qui citra læsionē eis uescuntur quilibet sanæ mē-

DE VICTU FEBRICIT.

4. de ra-
tione vi-
ctus.

tis concedet. Iis autem qui alijs usi non sunt, pestilenti cōstitutione incipere eis assuescere, an rectum sit, apud me decretum non est. Nā calidis tēperaturis, & ijs qui gracili sunt habitu, præterea pueris, & imbecillibus, in summa ijs quorum facile digeruntur corpora, crediderim alijs in pestilenti cōstitutione primo uti incommo- dum fore. Qui autem crasso sunt habitu, aut frigido temperamento, & difficulter in halitus solvuntur, præsertim si hyems sit, eos arbitror ex usu alliorum uotum consecuturos. Iis adde allium à crapula, & ebrietate optime præservare, ut ab Hipp. & Gal. scriptum est. Quantum autem crapula, & ebrietas corpora ad quālibet impressionem externā suscipiendā disponant, declarāt malæ habitudines quæ ijs exinde nascuntur. Qui ergo inordinato utuntur victu in pestilenti commoran- tes aëre, illis allium uorare sanum esse censeo. Quod si ijs addas illud Dioscoridis dicentis, magnæ & allio utili- tates contra aquarū mutationes, non solum uia præser- uationis sed gratia curationis concedenda esse allia re- ãte colliges. Huic fortasse assentes opinioni, in mentē si reuocet, hāc febrem adeo perniciosam esse, ut nostro- rum medicorum quidam dixerit, remedia in hac febre cum temeritate esse sumenda, alijsq; curationem Deo cōmittat. Cunque medicamentis utentes medici omnia & si temerarie tentare non uereantur, cur nobis idem non licebit, qui cibis tentamus. Minoriq; damno huma- ni corporis si aliter eueniat, rem tractamus. Quod si eo tentemus quod longa experientia scimus naturale roborare calidum, appetētiam uentriculi excitare, co-

Etiones, et reliquas naturales actiones acuerē, cibumq;
 corrumpi non sinere, quæ omnia in allio scimus esse. Ho-
 rumq; omnium contrarium corpora pati à pestilenti fe-
 bre, non ne ob iam dicta allium cum cibus ei qui pestilen-
 ti febre laborat citra temeritatem miscere nos iudica-
 bis. Quod si allium uentriculum exiccare ut de eo scri-
 psit Dioscorides consideres, in pestilentiali uero febre
 humiditatem prauā esse in uētriculo à qua omnes eius
 actiones corrumpuntur, præsertim qua cibus coquitur,
 et ea qua retinetur, has omnes utilitates ob id nihil fa-
 ciendas esse rectum esse existimabis? quod allium plus
 iusto calfacit. Ego sanè ob id ab alliorum usu non desi-
 sterem, sciens minus mali pati laborantes à caliditatis
 quàm à pestilentis putredinis additione. Si enim contra
 aquarum mutationes magnæ sunt allio utilitates ob id
 quod naturale calidū roborat, hac ipsa de causa, & con-
 tra mutationes aeris pestilentes ualere haud dubiū est.
 Naturale si quidem calidum cum potēs est, humido na-
 turali ualidius dominatur, extranearumq; causarum
 impressioni fortius obstitit. Caliditas etiam allij in ter-
 restri parte non est, ut caliditas rei amaræ, sed in parte
 aquosa quæ statim in halitus soluitur, ab internis ad
 partes externas statim migrans. Quod in pestilenti fe-
 bre non parū conducit, ut alias demonstrabimus. Neq;
 te dictū Hipp. turbet, alliū flatū parere, caliditatemq;
 in thorace, & capitis grauitatem, & cibi fastidium fa-
 cere. Nam contraria efficere, asserit Gal. ipsa experien-
 tia eductus. Quinimmo ait capitis soluere grauitatem
 si post euacuationem detur. Omnibus igitur pestilen-

In 4. de
 ratione
 uictus.

DE VICTV FEBRICIT.

ti febre laborantibus allij uirtutem in cibus niscendam ut saluberrimum consulo. Vt exiccatione sua, naturaleq; calidum roborando, corruptioni exitiatiter grassanti obftet. Et ut uidelicet quod corruptū est, aut per uias urinae, aut suo uiolento motu ad circumferentiales partes detrudat. Et non minus symptomatum uentriculi gratia, nempe uomitus, & ciborum abominationis. Ceterum scire oportet, omnibus nec similiter, nec quantitatē eandem fore exhibendam. Sed cuilibet pro consuetudine, & uehementia febrilis caloris, pro etate, tēperatura, & anni tempore. Sed ut ijs morem geramus, qui cum de aliqua re plura cōmoda, & magni momenti audierint, ob aliquam & si læuissimam qualitatem cōtrariam, eam tanquā infestā damnant, non considerantes difficile esse aliquid inuenire quod citra lesionē magnifice prosit, ut Gal. prudenter scripsit in libris de methodo medendi, libet igitur ea quibus allij caliditas refrangitur referre. Quam ob rē illos ob id bona esse mēte hortamur. Allij caliditas coctione plurimum euanescit, ut scripsit arabum præcipuus medicorū Auicenna. Quare qui allio integro uti uult, citra aliam præparationem simul cum cibus coquat. Quod si frangere quis uelit, in acetum, aut in succū acetosæ diē una infusum sinat, postmodum utatur. Nec silentio prætereundum est, commodum quod ab allio ij qui pestilenti febre detinentur habent. Formidinem pellere de eo proditū est, præcipue in decoctione oliuarum & nucis, ut tradidit dictus uir, qua ut ait utuntur christiani. Pro comperto est eos qui pestilenti febri detinentur, ab horrida con-

cuti formidine quæ omnium maxime animi motuum spiritus absorbet. Quod inhibere modo quo possit curabit pius medicus. Iudico igitur allium in omnibus edulijs, quæ pestilenti febre laborantibus offeruntur commode misceri. Opinorq; non solum fore innoxium, sed ex eo quàm plurima sequi cōmoda. Ad natiui caloris robur, & grassantis pestilentis contagij inhibitionem, & ad corrupti humoris ex omni parte cutem uersus expulsionem. Vnus è nostris medicus sal commendat, dummodo tantum non sit, ut sitim inferat. sed paucis agendum est cum nostro medico. Si sitim inducere noxium est, similiter ea censenda sunt noxia, quæ hanc nata sunt efficere. At talia sunt omnia, quæ corpus exiccant. Cibos igitur qualitate exiccantes damnabit. Quapropter humidos laudabit. Quos & ratio, & experientia in pestilenti febre noxios esse monstrant. Cum igitur periti medici cibos exiccantes laudarunt, necesse est ut quod ex ijs necessario sequitur non damnent. Quinimo si rem exactius tractemus inueniemus, ea fore exhibenda, quæ uenter exiccare, & sitim inducere ualeant. Exiccatio enim quæ effatu digna est, & sensu percipitur, sitim infert. Quæ citra hanc sit, parui aut nullius momenti est, utpote ob imbecillitatem sensum immutare non ualens. Humectum autem, & nimis laxum uenter prout in hac febre est, non utcunque exiccare oportet, neque paulatim id agere tentandum. Nam ægritudo maxime exitialis (ut hæc est) præsentaneum exigit remedium. Exiccandi igitur eorum uentriculi adeo sunt, ut exiccatio sitim ualeat in-

ducere. Per hoc enim humiditates quibus pestilens contagium primo cōcipitur, & alijs communicatur exiccabuntur. Humectus præterea præter modum uenterculus, & relaxatione laborans, & ob id cibum cito euomens, tali exiccatione curabitur. Meliusq; retinebit ea quæ ingeruntur ex cibis & potibus. quod non parui momenti est in huius febris curatione. Cuius gratia salitos pisces supra concessimus, ut qui maxime ad uomitum ualent. Vt scripsit Rasis in hæc uerba. Pisces in-
 22. Con- tinētis. quit saliti calidi sunt & sicci, incidunt phlegma, & cōferunt uomitui eo quod emittunt phlegma uiscosum de Stomacho. Et quanto uetustiores tanto magis calidiores & sicciores. Sed laudabiles ij sunt qui condiuntur cum aceto hæc ille. Actio præterea facultatis, quæ potum appetit salitorum piscium siccitate acuitur. Vnde fit, ut frigidam appetant, bibant & retineant, quæ non parum ijs prodest. Sunt præterea huiusmodi exiccantia, ut signum appetentis facultatis quæ in uentriculo est, nempe superficies sit an mortua. Si enim adhibitis ijs quæ exiccant, & sitim ualent inducere, laborantes nō sitiant, signum est appetentem uentriculi facultatem mortuam esse. Quod in pestilenti febre non raro contingit. Vanum ergo est sitim uereri in hac febre, ob id quod alijs in febribus ægrotantibus sitire noceat. Neque ideo quod contra sitim multa tradiderunt medici remedia ut Hipp. in libris de ratione uictus in morbis acutis, in pestilenti febre ea prohibenda esse, quæ sitim inducunt opinandū est. Sed neq; obscurū erat ex præceptis medicorum intelligere, alia fore incurratione pestilentis

stilentis febris methodum obseruandam, ac longe diuersam ab ea quā alijs in febribus tradiderunt. Quod ex cibis exiccātibus, et ex ijs quæ astringūt, & ex crasso uictu, & ex eo quod in hac febre, ut comedant, & bibant agris persuademus. Quæ omnia alijs in febribus diligenter prohibemus. Sal igitur tantum edulijs miscendum est, quantum sano homini sitim inducere ualeat. Vnde celso sitim excitandam esse in hac febre recte uisum est. Sunt qui uinum prohibeant, alij qui suadeant, albumque consulant, sic temperantes. Vini pars una, aquæ partes quinque. Qui exhibendum putant, dicunt familiare humanæ naturæ uinū esse, imbecillitatibusque subuenire, spiritus materiam abunde ministrans. Quapropter in pestilenti febre ubi magna sit spiritum exolutio ministrandum fore. Et quia calorem, & commotionem timent ob id multa aqua diluunt. Ego uero potum quem solummodo morbus ipse indicat, referā. Quē enim egrotantis uires, & consuetudo indicent, abunde in superioribus sub uniuersali sermone tradidimus. Hic solum potū curantē indicatione solummodo ab ipso morbo sumpta apponemus, ut in singulis febrium speciebus fecimus. Cæterum quicumque potum nosse cupiat qui Socrati quauis febre laboranti conueniat, percepta uirium dispositione, & uiri consuetudine, habito simul potu quem in singulis febribus apposuimus, ad tabellas quas superscripsimus recurrat. Ab eis iuxta ea quæ ibi tradidimus documēta facile conuenientem potū quibus eliciat. Quapropter non est quod hic de potu differamus qui pestilenti febre imbecillitatis uirium aut con-

DE VICTV FEBRICIT.

suetudinis ratione conueniat. Curantem potum diximus eum qui morbo, aut eius causæ contrarius sit. Proinde cum in ijs, quæ supra diximus ostensum sit, curantem potum eum esse qui morbo, aut eius causæ contrarius sit, pestilentemq; febrem immoderate calidum, & humidū corpus humanū reddere, et singulas eius particulas potum frigidum, & siccum conuenire huic febrisumpta solummodo indicatione ab ipso morbo haud dubium est. Non immerito igitur nonnulli aquam cum aceto in potum pestilente febre laborantibus concesserunt. Ego succum mali granati acidi defæcatum, potū huic febre conuenientem esse arbitror. Cui si aquam plātaginis, aut acetosæ miscere uelis nihil nocueris. Modus sit, ut aquæ partem unam, succi duabus misceas. Quod si succi mali granati non detur copia, sic agito. Capillorum ueneris, aut politrici man. duos, berberorum tres, coquito in decē libris aquæ ad tertias ægro tanti propinato. Cæterum scire oportet in pestilenti febre laborantium uirtutes semper urgere, tum ob incessantes uomitus, tū maxime ob ingentē spiritus exolutionem. Hanc medicorum nonnulli respicientes uinum ministrandum suadent. Vt celsus qui uinum calidum meracius dare iubet. Qui uero ad morbum magis mentem dirigunt, uinum recte prohibent, aquamq; mixtā cum aceto ministrant. Cæterum cum urgentis uirtutis aut consuetudinis ratione, uinum ministrare oporteat, cum succo mali granati, aut aqua berberorum misceamus. Aut cū aqua plantaginis, aut acetosæ si illorū non detur copia. Modum iuxta rationem indicantium ex

tabellis inuenies. Cæterum quia in pestilenti febre accidit laborantibus nauseantem, ut plurimum habere uentriculum, ita ut statim quæ deuorant, aut bibant uomitu eijciant, incassum nostræ forent de cibo, & potu lubricationes, nisi ea addiderimus, quæ extra posita ad retentionem ciborum, & potuum inuent. Hæc autem sunt frigida astringentia, quæ non solum ad id, uerum ad infectionem pestilentem à uentriculo repellendam non parum proderunt. Succum cimarum tenerimarum uitis, aut uinæ acerbæ, partes tres, succum semper uinæ maioris partes duas, aceti decoctionis absinthij, & mentæ partem unam, & semis, cinamomi parum, misceto. Apponito multoties spongiam dictis succis frigidis madentem uentriculo, ante cibum.

Panem assum uino odifero madentem modico cinamomi super asperso, uentriculo apponito. Linteum multipliciter plicatum succo uinæ acerbæ madentem desuper imponito. Præterea aceti acerrimi partes tres, olei rosarum ex oleo immaturo partes duas, succum citoniorum partem unam, misceto tandiu donec crassescat, & permixtum sit, utere ut supra, efficacissimum est. Vsum caphoræ in ijs epithematibus, quæ uentriculo apponuntur non laudo. Ea si quidem, quæ præter modum refrigerant citra astrictionem, principi parti apponenda non esse, rationalis docet methodus. Sed de his alibi. Aceti acris untiā unam, pulueris reubarbari tosti drachmā unam, misceto, & ita esse finito per diem, & noctem. Post modum utere cum aqua rosarum, ut supra. Nec prætermittendum est eisdem epithematibus multoties uten-

DE VICTV FEBRICIT.

*dum non esse. Cunque nouum epithema apponere uo-
lueris, exiccare uentriculum lintheos oportet ut uesti-
gium præteriti non sit medicaminis.*

C A P. XXI.

In 4. de
ratione
uictus.

*FEBRIS colliquantis uictum infrigidantem, &
modico astringentem, et crassiore quam pro morbi ra-
tione esse oportet. Id sicut, & reliqua ab Hip. discimus
qui cum de febrium curatione ageret cum aluo liquida
absumente, & contabefaciente corpus, ijs sorbitiones
frigidiores, & crassiores exhibendas docuit. Potusque
uinosiore, & astringentiores delirio non obstante pro-
pinare iubet. Vnde colligimus, eum esse in colliquan-
te febre uictum exhibendum, qui corporis dissolutioni
ualeat subuenire, & si in morbum, aut eius sympto-
mata addere uideatur. In tertio cum de mulsa agat
nocumentis, signa liquefactuum febrium in hunc mo-
dum scribit. Biliosa quoque alui deijcit magis interdum
quidem, bona sed interdum quam decet redundantio-
ra, spumantioraq; quod biliosis magis, & his quibus tu-
mesacta sunt uiscera contingit. Magis præterea, quæ
dilutior est putum educit, magisque pulmonem lenit.
Meracior uero spumosa excrementa atque plusquam
conuenit ualde biliosa calidioraque quam dilutior agit
magis. Deiectiones autem huiusmodi habent quidem, et
alias, quæ graues sunt, offensas, neq; enim hypochondrio-
rum extinguunt ardorē sed excitant, inquietationemq;
& membrorum iactationem faciunt, intestinaq;, & se-
dem exulcerant. Qui ergo in morbis huiusmodi reli-
tis sorbitionibus malsa potius alterius uice, utetur, is*

si multa feliciter consequutus fuerit, nonne, & multa ei succedunt præter animi sententiam. Quibus in uerbis Hip. duplici nomine taxauit antiquos medicos, tum quia sorbitiones liquefacientibus in febribus demittebant, tum quia alterius potionis uice, mulsa utebantur. Quod autem alias in huiusmodi acutis febribus exceptis liquefacientibus sola mulsa ad iudicationem usque egrotantes alat, Gal. docet in hæc uerba. Significauit, et nunc manifestissime ad morbi usque iudicationem, sola uti mulsa consulens; nepe in solis, qui colliquefaciunt, morbis, uel in quibus hominum uirtus ad morbi usque iudicationem sufficere non possit, ad ptisanæ cremorem perueniemus. In alijs uero sola mulsa est commodius. Quod autem fluxus uentris syncere biliosus spumosusq; liquifacientem febrem indicet, asserit Gal. in expositio-
ne illius, quæ dilutior est sputum educit magis cum inquit. Hipp. igitur non immerito cum uel ex mulsa epota uel absque ipsa qui spumosa simul, & syncere biliosa deiecerit, febrem sciueris esse quæ liquefaciat, & ad tabem perducatur, &c. Quare hos tali cibo nutries. Sumpta in presenti à sola corporis dissolutione indicatione. Vi-
etum uero iuxta febris acumen conuenientem, ex ijs quæ in superioribus diximus colliges. Quæ dissolutioni corporis obstant triplicia sunt, nempe quæ corpus, & quæ humorem respiciunt, & quæ utrumque. Ad primum modum spectant ea quæ multum prestant corpori nutrimentum, & facilis coctionis sunt. Quæcunque potestate infrigidant, ad secundum. Infrigidantia uero cibaria quæcunq; astrictoria participat ui ad tertium opti

DE VICTV FEBRICIT.

mus igitur in colliquantibus febribus cibus fuerit, qui corpus nutriat infrigidet, & modice astringat. Capum igitur iuuenem crassum ita coquito. Hordei excorticati man. tres, uux acerbae, portulacae, plantaginis, uiridis coriandri, singulorum unum, bulliant simul, deinde collato ius, cuius, accipe partes tres, succi granatorum acidorum partem unam, sorbitionem cum pane crassam conficito. Panis infusus in succum granati acidi conuenit.

Ptisanam hordei non collatam parato in hunc modum. Duos pullos crassos coquito cum tribus hordei excorticati pugillis, portulacae uno, modicum antequam ab igne amoueas, immittito granorum mali granati acidi pugillum unum, finito ut coquatur tandiu quod rumpatur hordeum, & tenerrimum fiat, extrahito deinde hordeum, & adiecto pauco zucaro. administretur ijs. quorum uirtutes ob imbecillitatē laborāt. Cōuenientissimus cibus fuerit ijs qui colliquantibus febribus laborant. Infrigidat, roborat, & facillimae coctionis est, Aqua frigida cōmodissimus ijs potus, & remedium est, utrunque respiciens, & corpus, & humorem. Ad quā exhibendam exiguae coctionis signum spectandum esse nos docet Gal. quarto de ratione uictus, & in libris de Methodo. Mel ijs aduersissimum esse ab eodem didicimus. Sciendum præterea rectam uictus administrationem, & frigidae potum, præcipuum esse ad liquefacientes febres remedium, parumque auxiliij præstare medicamenta. Quare diligenter obseruandum est, ut boni sint nutrimenti, et facillimae coctionis cibaria, quae.

In fine
10. de
metho.

is offeremus. Quibus cum admiscere ea quæ refrigerare, & parū astringere ualeant utile erit. Optimusq; omnium quem sciam his cibus est, ptisana hordei, eo quod diximus modo parata. In ea si quidem omnia quæ necessaria sunt, insunt. Boni nutrimenti est, facilis coctionis, infrigidat, parumq; astringit. Quæ enim insigniter astrictoria ui polleat, ex eo incommoda sunt, quod causam morbosicam intra corpus detinent, cum ad omnem euacuationem uias obstruant.

CAP. XXII.

MORBILLVS, & uariola differunt, morbil-
lus in cute est instar morsus pulicum, à sanguine nimis bilioso ortum habens. Variola cutē magis in tumorem attollit, diuersiq; coloris est. Albæ uisuntur, ut plurimum, quandoque citrinæ, raro nigræ plumbeæ. Morbilli consimiliter non unum seruant colorem. Proinde uariolæ à sanguine nimis aquoso fiunt. Inter morbillos, & uariolas in eo conuenit, quod utraque pustula ab ebullitione sanguinis fit, natura prauum ab eo quod purum est separante, & ad cutē detrudente. Quapropter à tali expulsiōe naturam, crasso cibo, aut multo, aut duræ coctionis, tunc temporis distrahendā non esse recte quis colliget. Vt uero opus melius compleat, & ab internis ad cutem uersus cōmodius noxios humores depellat, et ne in aliqua interiorum partium humor detineatur, cibum parum infrigidantē leuiter astringentē his ministrare oportet. Qui enim huiusmodi est, particulas roborat, ut ualidus à se quod contristat depellant. Vim præterea repellendi calidū humorem habet.

DE VICTV FEBRICIT.

Qua propter ius Hispanarum lentium cum acetosa herba uiridi coriandro, oleo, aceto, & sale, & modico croci ijs conuenit.

Cucurbita etiam cocta cum portulaca, acresta, oleo, aceto, & sale,

Ptisana prout parauimus supra in colliquantibus febribus commodissima his sorbitio est. Fugienda omnia ea sunt quæ, aut sanguinis copiã augeant, aut in eius ebullitionem addant. Quare inter initia dummodo uires constent, gallinaceorũ iura uitanda sunt, & omnia dulcia, & unctiosa. Facta euacuatione totius nisi copiose erumpant, bonum erit in cibis minuere ea quæ astringunt, & eorũ quæ aperire ualeant, aliquid imponere, ut folia apij, aut petroselini. At cum eruptio subsidere iam incipit, bonum est in cibis ea quæ uentrem leniunt miscere. Vt prunas, uiolas, borraginem, & similia. Prunis autẽ, quæ astringente participant facultate, cuiusmodi Gallica sunt, & Hispana, per omne tẽpus uti licet decoctis cum politrigo plantagine, aut portulaca. Potus autem ijs, qui patiuntur morbillos, aut uariolas, sit aqua hordei cum politrigo, & malo granato cocta. Sunt qui lactucas decocta in aceto, medullam citruli, & angurie ijs qui uariolas, aut morbillos patiuntur exhibeant. Sunt, & qui aquam angurie in potum ministrant. Sed quantum sentio, huiusmodi cibaria his damno potius quàm inuamento sunt. Quandoquidem expulsionem naturæ obstant, & eruptionem pustularum retardant sua uehementi frigiditate. Nam huiusmodi ab intro ad cutem expulsiones à natura sunt, ma-

teria ob ebullitionem eo inclinata, utpote iam in uaporem transeunte ob substantiæ eius tenuitatem. Quapropter sicut ijs quæ calida, & fumosa sunt augenda ebullitio non est, sic nec ijs quæ ualde refrigerant extinguenda. Solum igitur ea ministranda sunt, quæ modicum refrigerent, & astringant. Ut per hæc roboratis siue in se collectis particulis melius fiat. ab intro ad extra expulso. Quapropter ficuum aridarum exhibitionem in ijs qui morbillis, aut uariolis laborant, ut pluribus nostrorum medicorum uisum est, ob id quod malas materias extra pellunt, non probo. Nam ob id ipsum quod caricas commendant, ego damnarem. Aiunt earum usu materias ab intro ad extra pelli. Cuius argumentum esse scabiæ ex earum immodico usu euenientem aiunt. Sed profecto ut opinor ipsa decipiuntur experientia. Non. n. id agunt carica quia malos humores ab intro ad extra pellunt, aut quia sanguinem mundificant ut opinantur, sed quia eum nimis calfacientes, ebullitionis modum ei præstāt. Vnde accidit, ut id quod in fumum, aut fuliginem ob calfactum sanguinem uersum est ad cutem à natura detrudatur. Quare non immerito uulgus fert, caricas scabiæ, & pruritum peculiariter inducere. Quapropter eas pueris, & iuuenibus prohibent. Quod autem nimis calfaciant, docet Dioscorides qui eas sitim inducere asseruit. Rasis etiam tertio Almanforis ex multo earum usu fieri pruritum, & pediculos affirmavit. Nec id alicui admirationi sit. Nam in ipsis est occultum lacticinium, ut recte sensit Auicenna. Haliabas etiam 5. theoricæ, cap. 19. eas in colericos mutari humoris scripsit. At si in

18.3. tra
stat. 2.
cap. 12.

DE VICTV FEBRICIT.

uentriculo humores superflui fuerint, inquit ille durafit ad digerendum carica, & ad corruptionem mutatur. Et inflationem uentositatemq; generat, & pessimum sanguinem. Auicenna similiter idem asseruit in hæc uerba. Et sicca quidem inquit in suis operationibus laudabilis est, uerum tamen sanguis generatus ex ea non est bonus. Verum id est, aridas ficas nimis abstergere, aperire & incidere. Quapropter commendantur à Gal. secundo alimentorum cap. v i i. præcipue cum nucibus & amigdalibus. Vt cunque res habeat caritas ob earum superfluam calfactionem uitandas esse in morbillis in caloris febrilis præsentia opinamur. Senibus tamen frigidis natura, ubi eruptio nimis diminuta est, utiles sunt & secure concedi possunt, præsertim in remissione caloris febrilis. Sua enim arida ficas apertione, subtiliatione, calfactione, humores adeo attenuat ut ad cutem facile ferantur. Vnde uariolas tunc temporis absq; læsione euocare solet. Quod Petrus Apennensis uir disertissimus asseruit, de morbillorum & uariolarum curatione agens.

C A P. XXIII.

ET ut speculationi huic nihil desit, non ab re fuerit de eo uictu differere quo uulgus utitur in uariolis, & morbillis, nempe salitis piscibus. Siue enim ab ipsa experientia percepto commodo, siue ratione id ostendente, apud Lusitanam plebem salitorum piscium usus lōgeuus obtinuit, ut parua aut nulla medicis fides adhibeatur contrarium suadentibus. Aliud tamen unus è nostris medicus natione Italus sentit, piscium salitorū

usum in morbillis, & uariolis reprobans. Nam ut ille ait apud non nullos è plebe Itala aut scholares opinionem esse, in uariolis recte ministrari. Verum si ab Aristotele recte dictum est, nõ uanam esse omnino famam quam uulgus ferat, nõ uanum utique erit inquirere an ratione aliqua qui salitis piscibus in uariolis utitur innitatur. Percipimus ex quotidiano usu salitos pisces pruritum inducere. Siue id salitorum piscium substantiæ concedas, siue caliditati & siccitati eorum, quibus ebullitionem sanguinis excitant. In omni autem ebullitione cõstat crassos humores in tenues solui, tenues in fumum digeri, fumos & fuligines ad cutem migrare. Huncq; esse modum quo generatim salita edulia pruritum ob qualitates inducant manifestas. Siue id eorundem substantiæ in uaporem digestæ, rapidæ ad cutem lationi ob salis incisiuam qualitatem, & acutam penetrationem tribuas. Quod non nulli caricis inesse firmiter credidere. Siue utrunque simul in causa sit. Verum est salitorum piscium usu, ab internis corporis partibus ad externas nonnullorum excrementorum lationem fieri. Quod cum ita sit, dubium non est quin aliquando in ijs morbis salitis piscibus locus sit. Nempe ubi natura segniter opus expulsionis aggreditur. Id autem si præter naturæ imbecillitatem accadat, aut deferuescente ebullitione fiet, qua inuatur natura, ut melius excrementa ad cutem detrudat, aut ob crassos, & lentos humores ad expulsionem talem ineptos, aut ob uiarum occlusionem. Quodcunque horum trium adsit, aut omnia, pisces salitos prodesse ratio demonstrat,

DE VICTV FEBRICIT.

& ob caliditatem, & siccitatem salitorum piscium, &
 non minime ob eorum incisionem, & acutam penetra-
 tionem. Cum ergo in frigido natura corpore non satis
 uariolæ erumpant ob aliquam trium diëtarum occasio-
 num, febrili calore non obstante, dandos esse pisces sali-
 tos cum plebe sentio. In succo tamen acetosæ per diem
 integram eos prius macerare oportet. Sitq; mediæ ata-
 tis salitura, quãto enim antiquiores sunt, eo calidiores,
 & sicciores euadunt. Vt supra ostensum est. Ad hæc pi-
 sces saliti partes corporis ob salis compressione in se
 inuicem collectas roborant. Quod siccis ficibus non
 inest, quinimmo contrarium. Id unum est ex ijs quæ
 cumulationem efficiunt expulsionem. Quod cibus inesse
 qui in uariolis ministratur, supra optauimus. Præterea
 si eueniat ut sit, pustulas intro erumpi, profecto nullo
 medicamine efficacius rumpes, saniem purgabis, exicca-
 bis, putredinemq; inde emanantem nullo alio citius ca-
 stigabis, ne ulteriorem concipiat corruptionem, sanas
 tandem particulas nullo alio quàm ex salitis piscibus ci-
 bo incolumius, ne emanantis corruptionis contagio affi-
 ciantur, seruabis. Nec ab re fuerit, ut cum intro erum-
 puntur, pro earum maturatione ficus aridas primo uo-
 rare, deinde piscibus uti. Meminisse tamen oportet in
 morbillis cauendum esse piscium salitorum usum. Et in
 ijs qui calidi, & sicci sunt natura. Vt igitur summatim
 dicam ubicunque eruptio incompleta est, si crassi & len-
 ti humores, aut uiarum obstructio in causa sint, febre
 non obstante, nec calido & sicco hominis temperamen-
 to, ficus aridas, & salitos pisces audacter ministrato.

Nec audienda est illorum sententia qui salitorum piscium usum ægris non conuenire scribunt. Nam absurdum est putare contraria salitorum piscium qualitate ægros affici non posse. Præterea tertio Almanforis scriptum est salitos pisces nullo modo fore ministrandos, nisi in die quo aliquis sibi medicari uoluerit, hoc est non cibi, sed medicinae gratia cōmendandos esse salitos pisces. Quod Auicenna asseruit cum dixit, unum est quod ipsorum nutrimentum est malum, unde plus uia medicinae sunt accipiendi quam uia cibi. E piscibus salitis laudauit Gal. sardam cum ait, in tertio de alimentorum. Pretiosissima est sardæ salitura.

CAP. XXIII.

HEMITRITEVS uerus, nempe quotidiana continua, & tertiana interpollata, mediæ rationis uictum exposcit. Hunc dico qui subtilior sit, quàm qui febribus interpollatis conuenit, crassior uero quàm continuis ab uno simplici humore. Cū singularū qualibet longior sit. Cunque natura duobus qualitate, & substantia contrarijs humoribus pugna sit, uiribus & tempore indiget, ut ambos uincat. Vtriusq; igitur causa, ne pe ut ad longum seruetur tempus, & ut uires contra utrumq; hostem habeat, ampliori opus habet alimonia. Cunque in superioribus in singulis febribus cibus ea misceuerimus, quæ peccantis humoris qualitates reprimāt, oportebit in hemitriteo, aut simul ea quæ cōtrariarum sint qualitatum, miscere, aut cibus uti temperatis. Ea quæ alterum illorum solum respiciunt administrare non icet. Nam utriusque febris medicus sit sollicitus oportet.

DE VICTU FEBRICIT.

tet. Cibus temperatum dico, qui à naturali calido solum patitur. Hunc hemitriteo laborantibus idoneum non esse ex eo intelliges, quod sanguinem qui ab eo in febribus generatur vitiose fore qualitatis necessum sit. Nam in tertiana febre ob bilis putrescentis calorem & acredinem, pars effectiua sanguinis extra naturalem temperiem est, nempe calidior & siccior. Quapropter cibus temperatus ob id quod à naturali calido solum patitur, nec particula intemperiem contrarijs qualitatibus ualet corrigere, eisdem afficietur. Quare sanguis qui ab eo generabitur calidior & siccior euadet, pro uisceris intemperie. Qui statim paulo momento in bilem uertatur. Simile iudicium in febre, quæ à pituita corpus præter naturaliter humectum efficiente, ortum habet. Quapropter miscenda sunt in cibo, quæ contrariarum sint qualitatum, aut id accipiendū in quo utraque qualitas reperiatur, quod magis probō. Quod si præter hæc incisium id sit, ante alia eligendum. Simplicium medicamentorum unum est acetum, quod præfatis sit facultatibus insigne. Vtrique enim conuenit humori, partibus insuper tenuibus præditum est, quibus incidit. Quapropter si id cum eo quod abstergere ualet miscueris, habebis id quod querimus. Moderate abstergentium zucarum unum est, quod febricitantibus plus conuenit. Quare mixtionem ex zucaro, & aceto quam syrupum acetosum medici nuncuparunt, hemitriteo maxime conuenientem esse putato. Quia uteris in hunc modum.

Thymi, petroselini, hordei ab uno cortice exuti, singu-

lorum manipulum, passularum enucleatarum unum, corticem unum raphani linguam uellicatis, salis parū, bulliant cum pulla crassa quantum satis, huius decocti accipito libram, syrupi acetosi acris quantum tollerauerit ægrotantis palatus. Iterum bulliant quousq; misceantur, dato ut bibat cum oportuerit, ex reliquo fac sorbitionem. Hac utere ante accessionem uehementiorem, & in eius inclinatione, in die uero mitiori eisdem utitor, pullæq; extremitates ægrotanti ministrato. Siluestrem capū, qui escam pererrans quæritet, coquito cū hordeo, radicibus apij, aceto, & sale, fac ut supra. Succu uiolarum mediæ magnitudinis uncias tres, pipere nigri grosso modo contusi grana triginta, infundito in succum uiolarum, & ita esse finito quousque transeant dies tres, postmodum cum iure misceto, ita ut ad uncias decē iuris, unciam unam succi imponas. Et quia uiolarum succus omni tempore haberi non potest, succus simul cum pipere coaguletur, et ad formam trochiscorum reddatur, ut singuli drach. unam contineant. Mixtionem ex pipere & succo uiolarū magni esse iuamenti in hemitriteo in quo pituita, & bilis pares habēt uires compositio ostendit. In eo enim in quo alter humorum superat, nec uerus, nec certus hemitriteus dici potest. In quo uero bilis, & pituita pares sunt robore, quem uerum & certum uocamus hemitriteū, meminit Hipp. in libro de morbis uulgaribus, horrificam febrem hemitriteum uocans, quia multoties in accessione una febricitantes horrescant. Nam horror medius est, inter rigorem quem bilis, & frigus quod pituita inducit.

DE VICTV FEBRICIT.

Cunque alter humorum superat, ita rigoris uel frigoris plus sit horror particeps. Quod si humor qui præualet in hemitriteo pituita fuerit, hoc cibo utere. Pullam, aut capum cum hordeo, radicibus apij, & ciceribus, aceto & sale coquito, fac ut supra. Ptisanam cum radicibus apij coctam, pipere & oximelite optimam ijs esse sorbitionem iudicato.

Quod si bilis superior fuerit, ita ut horror plus ad rigorem accedat. Pullam aut capum cum hordeo hepatica thymo petroselino, & apij radicibus sale et aceto coquito. Aqua hordei cum radicibus apij cocta, conueniens potus est uerum patientibus hemitriteum. Iis uero in quibus pituita superior est, aqua decoctionis radicis apij & seminis fœniculi dulcis. Potus uero qui hemitriteo laborantibus ratione uirium, & consuetudinis competat, ex potus tabellis querendus est. Iis uero qui hemitriteum pituitosum patiuntur, si temperamento sint frigido, non ab re erit radiculam zinziberis in cibus, & potibus addere, ut simul integra bulliat. Est unus ex arabibus medicis, qui hemitriteum patientem alit in die accessionis cucurbitis, spinacijs, attriplicibus, & similibus. Sed errat quantum sentio duplici ratione. Altera ab ipsa natura corporis sumpta, altera ab ipso cibo. In hora in qua natura intenta separationi est, frigida exhibenda non sunt cibaria, ne separationi naturæ obstant, & ne expulsionem periodicam, quæ ab internis partibus ad exteriores fit, ad contrarium repellant porosque occludant. Quorum causa paroxismus longior efficiatur. Vt ijs, qui diligenter cibariorum

bariorum naturas quid singulis horis ualeant efficere scrutantur, manifestum est. Iis adde cibos qui ex herbis oleribusue parantur corruptioni ob noxios esse, ex eo quod aquosum generent sanguinem, qui promptissime calorem extraneum concipiat. Prudentis consilijs igitur non est, huiusmodi cibos tunc ministrare, cum causa corrumpens ualidior est. Non aliter quam si ignauum, & imbecillum militem strenuæ inimicorū cohorti obijcias. Sed de hoc abunde supra diximus, ubi ostendimus cibū ex herbis, aut oleribus inutilem esse acute febricitantibus. Eosque in ægotantium damnum errare, qui citra occasionem herbis in cibos frequenter utuntur. Grauiusque eos peccare, qui ante accessiones herbas, aut olera ministrant, putantes se scopum attigisse. Quam in re nostrorum medicorum plurimi quottidie labuntur. Quando autem herbis, & oleribus in cibo utemur infra deo inspirante dicemus.

CAP. XXV.

FEBRIS in qua exteriora frigent, & calent interiora, à bili putrescente ortum habet. in qua febrili calore phlegmata crassa in exterioribus existentia dissolvente, accidit, partes externas in frigidari, æstuantibus internis. Subtili ideo indigent uictu, quia febrilis calor multoties in seipsum reduplicatur trāspiratione prohibita. Quapropter periculo non uacat hæc febris, sicut cum à reuocatione natiui calidi exteriora frigēt. Cibus ijs conuenit refrigerans. Cui misceantur ea quæ aperire, & ualenter incidere ualeant. Post calidam, & asperam totius corporis fricationem, hunc febricitanti

DE VICTU FEBRICIT.

cibum ministrato.

Pisanam cum radicibus apij, & petroselini, & lenticula aquæ parato, coquitoque sufficienter. Et cum syrupo acetoso, aut oximelite ægrotanti si frigida sit natura ministrato.

Alium, coquito pullam eisdem herbis, folijs raphani, hordes, & aceto fac potionem, et tenuem sorbitionem. Præterea infundantur in libra una aceti accerrimi, ficuū siccarū lib. unius tertiam finito per diem, & noctē, postmodum colletur. Huius aceti untias tres accipito, aquæ decoctionis radice apij lenticulæ aquæ untias quatuor, zucari quantum sufficit, coquito, & fac syrupum acetosum ijs convenientē. Cūq; hæc febris ab uno simplici accidit humore, ut à pituita ualde crassa, quæ putrescens exteriora nō ualet calfacere, aut suæ crassitie aut leuis putredinis occasione, ad febres phlegmaticas, aut melancolicas, aut colericas pro uictu eliciendo recurrendum est. A singulis enim prædictorū humorum originem posse habere, doctissimis uiris placitum est. Vnde bene dixit arabs, tu uero inquit non debes ad paroxismos respicere, nam potest esse quod sit quotidiana, tertiana, & quartana, & quæ quinto, & septimo periodicant. De ijs uero quibus à reuocatione caloris ad intro, accidit infrigidari in febribus extrema, alibi nobis sermo erit. Est alia febris in qua exteriora calent & interiora frigent. Quæ ab aliquibus empiala nominatur, à non nullis liparia ab alijs tenedos, sed nomina secundum Platonem contemnere oportet eos, quibus aliarum rerum incumbit inuestigatio. Hæc accidit cum

à putrescente bile caloremque febrile excitante, phlegmata crassa in interioribus concreta dissoluantur. Accidit, ut ijs solutis partes internæ frigescant. Viçtus ijs copiosioris alimonie exhiberi potest. Minus enim periculosa hæc ægritudo est, ut pote præternaturali calido in externas solum sæuiente partes. Miscenda igitur ea sunt quæ ualenter incidunt, & abstergant cum mediocri calore. Quapropter ijs cibis utere, quos hemitriteo phlegmatica conuenire diximus.

Gallus antiquus post lungam dimicationem cum altero, occidatur. Coquaturque cum hordeo, passulis enucleatis, pulegio, hyssopo, thymo, & uiolis, tempereturque cum oximelite acri, propinato quantum uno haustu sorbere possit, sorbitionem ne facias.

Præterea in aqua hordei conficito sorbitionem ex fure, & fermento, ut supra docuimus in febribus phlegmaticis. Sunt qui hanc quoque febrem à simplici pituita quæ non putriuit secundum totum euenire affirmet. Sunt, & qui à melancolia. Quorum uictus sunt ex supradictis petendi. Hoc tamen proprium ijs febribus inest. Omnia nempe quæ aperiendo exiccant ijs febribus incommoda ideo esse quod materiam crassiorem reddunt. Quæ magis tenues sunt partibus in halitus digestis. Cunque febrium quæ calorem & frigus simul operantur materias, crassos humores esse medici asserant, fit, ut qui ius ciceri, et muriâ ijs cõcedunt febricitantibus, parum salubriter cõsuluerint. Rectius, profecto fuerit, ijs uti, quæ humida existentia, abstergere, et incidere possint. Cum igitur huic feбри à simplici pituita depēdente ob-

DE VICTV FEBRICIT.

uiaueris, præsertim in homine frigida natura hunc cibum ministrato.

Senescentem gallum prædicto modo defatigatum parato ad hunc modum, chamæmeli man. unum, & semis, ficuum aridarum, passularum enucleatarum, singulorū man. unum, hordei ab uno cortice exuti man. tres, coquito sufficienter, et collato. Accipito iuris libram unā, adipis anatis recentis untias tres, aceti albi è pulegio untiam unam, salis parum, bulliant iterum donec permisceantur. Dato calidum quantum uno haustu sorbere possit. Efficacissimum est ad crassos humores, & lentos febrem generantes. Idem cum capo, & pulla efficere possis sed inefficacius. Dicatur hæc sorbitio ex adipe anatis. Superest de ea in qua simul calor, & frigus per totum sentiuntur, febre sermonē facere. Hæc à bile putrescente similiter ortum habet. Calore febrili crassa phlegmata partes internas, & externas occupantia dissolvente, accidit, ut agrotantis sensus minimas non percipiens differentias, calorem, & frigus in eadem parte esse iudicet. Victus ijs conueniens est, qui incidere, & abstergere, & exiccare utcunque ualeat. Phlegmata si quidem in hac febre facilius dissoluuntur quam in prædictis. Signum est frigus intro, & extra perceptū, quod lationem materiæ per omnes indicat partes. Latio uero eius liquefactionem, liquefactio obedientiam materiæ dissoluenti. Phlegmata igitur cum in duritiem non occaluere, aliquali indigent exiccatione. Quapropter talem ijs uictum ministrato.

Gallum senem, ut supra defatigatum coquito cum hor-

Sorbi-
tio ex
adipe
anatis.

deo, radicibus apij, petroselini, passulis enucleatis, ciceribus. Hora una antequam ab igne amoveas, projcito aceti albi è pulegio quantum satis, salis modicum, fac ut supra. Potus omnibus ijs sit aqua hordei cum semine fœniculi, & radice apij cocta. Iis uero qui intus frigent, & extra calent, uinum album prædicta aqua dilutum administretur.

CAP. XXVI.

SED quos nam uictus exigant singulæ febres, indicatione sumpta ab affectu, & ab eius causa abunde quidem dictum est. Nunc uero quos nam uictus symptomatum simul habita ratione adhibere conueniat tempestiuum est percurramus. Nam quemadmodum symptomata curationis quandoque indicationem ad se trahunt, sic, & uictus rationem. Uictus enim administratio pars curationis est. Id etiam sicut, et reliqua ab Hip. didicimus, quem à symptomatum etiam natura, et uehementia, uictum conuenientem inuestigare obseruamus. Ut in eo ubi autem dolor aliquis uexauerit, oximeli bibendum dabis, hyeme calidum, æstate frigidum. Quod si multa sitis fuerit melicrato utendum, et aqua Gal. in expositione ita ait. Nempe quantum ad morbum spectat, oximelite magis est utendum. Verum si æger accepto multo oximelite adhuc sitiuerit, melicratum dare oportet. Quod si ab ea re sitiuerit, aquam offerendam putato, & si aqua per se pota culpa non careat. Præterea infra ratione symptomatis superuenientis sorbitionis modum mutare iubet, cum inquit. Postea si dolor quispian uel periculum comparuerit sorbitio

i. de rce
uictus.

DE VICTV FEBRICIT.

nem dare oportet neque multam, neque crassam, &c. Sed inuestigare diligenter oportet, quæ symptomatis magnitudine mutare uictum oporteat. Initium huius inuestigationis ab Hip. etiam sumendum est, uero sapientissimo. Ille enim uictus rationem in sola effatu digna symptomatis magnitudine immutare uidetur, ut cum dixit. ἐὰν δὲ πολλὴ δίστα ἢ χαλὰ μελικρήτω χαλὰ ὕδατι. Hoc est si multa sitis fuerit melicrato, & aqua. Ratio id quoque suadet, ut non a symptomatum quacunque magnitudine sed ab ea quæ effatu digna est, curationis scopus mutandus sit. Nam cum symptomata, morborum effectus sint, ablatione causarum euanescent. Quapropter, ut effectus sunt nullius sunt capacia indicationis. Cum uero ad effatu dignam accrescunt magnitudinem, indicationem curationis præstant. Proinde cum effatu dignæ symptomatum magnitudines, sicut & cuius uis rei innumerae sint, sola ipsius magnitudinis ratione differentes, nisi aliquo signo magnitudinem symptomatum diffiniamus, incompletus, & omnino inutilis noster sermo esset. Sic igitur symptomatum magnitudo diffinienda est, ut eorum ratione uictus mutetur. Nempe cū alicuius præter naturalis dispositionis sunt causa. Quæ aut in morbum addat, aut naturæ vires exoluat. Quodcunque horum in corpore eueniat symptomatis magnitudinis causa, iusto tunc symptomata uictus rationem, et curatiuam indicationem suppeditat. Ut pleuritico parū sitienti oximeli, aut melicratū quæ ipsæ morbus exegerit offeres. Quod si multa siti uetetur, nō iis, quæ morbum, et eius causam respiciunt, sed

ijs quæ sitim mitigant uteris. Nam multa sitis sputum exiccat, & morbum incoctibilem reddit. Febrisque calorem auget. Quapropter melicratum, & aquam exhibebimus à symptomate indicatione sumpta. Nam aqua morbi gratia exhibenda non esset. Ob id quod doloris maturationi aduersa est. Sic ergo symptomatum magnitudo diffinienda est, ut ab eis ratio curationis et uictus indicationes sumantur. Cæterum huiusmodi symptomata cum ad dictam perueniunt magnitudinem hoc est uicem habent causæ ad morbum relata, aut urgentis, aut causæ sine qua morbus curari non possit uicem habent. Quapropter potior est quæ ab eis sumitur indicatio quam à morbo. Vt ex dogmate de complicatis affectibus colligitur. Hoc etiam manifestum est ex eo quod Hip. pleuritico ualde sitienti aquam concessit. Quam, si potio-
rem à morbo indicationem faceret, non exhiberet. Manifestum igitur est ex doctrina Hip. ut cū symptomata ad eā magnitudinē perueniunt ut in morbum addant, aut uires naturæ exoluāt, ab eis potio-
rem sumendam uictus esse indicationē. Danda nihilominus est opera, ut ea ministremus, quæ aut morbo si fieri possit conueniant, aut saltem inconmoda non sint.

i. de rōe
uictus.

CAP. XXVII.

FABRICITANTI patienti uigilias à bilioso humore ortum habentes hunc cibum ministrato.

Ex aqua hordei lac amigdalorum conficito mediocriter crassitie, cunque semicoctum fuerit, man. unum coriandri uiridis in mortario conterito, addito modico croci simul in ollam projicito. Zucari quantum satis ad-

DE VICTV FEBRICIT.

dito. Fac ut diccenter coquatur ad lentum ignem semper cum cocleari agitando quousque mediocriter crassum reddatur. Extrahito ab igne, & linteis circum uoluito, & tepidum ministrato. Hac sorbitione usus fui olim in Anglia. Erat Anglus dicturus coram Henrico Anglia Rege inuictissimo, & regni primoribus. Curabatque ut suo cum honore rem ageret. Cunque tempus instaret, paucis ante diebus in moderato studio, uigilanti cura, cerebrum adeo exiccavit, ut in uigilias incideret. Cunque apud amicos de ea re quareretur, nec diacodion, nec syrupo de papauere nec alijs id genus quæ in ei rimedim miserant somnum sibi conciliare posset. Tertiusq; dies instaret, quæ sibi sano capite opus erat, cunque ob imbecillitatem quæ uigilia induxerant parum sibi crederet, in maxima erat sollicitudine quid ageret. Accedens forte amicus hominem salutandi gratia rem audiens, consuluit, ut mea uteretur opera. Repente ipse ueniens, hominem inueni præter modum calfactum. Cunque arteriam tangerem, conieci porum ab esse hominem à febrili dispositione. In eamque lapsurum nisi præsentaneo remedio ad propriam reuocaretur temperiem. Cunque hæc ei retulissem, acclamauit ut omni diligentia id præstare uoluisssem. Cunque hominem bono esse animo iube rem, abi, sero rediens, solo iam occumbente hominem in capacissimo labro aqua tepida sedere iussi. Ibiq; hora una immorari permisi. Exiens lectum petijt, ibi cum parum quiesceret, homini lac supradictum exhibui, abiq; . Pueris admonitis, ut strepitum uitarent. Sequenti die mihi acce-

denti occurrerunt famuli gratias agētes quod heri uigilias & famularum uno remedio sanassem, inquiēbat enim eos, referentes herum solidam dormisse noctem. Quod si inconficiendo lacte micam panis in aqua rosarum infusam simul cum amigdalīs teras, crassiorē efficies sorbitionem magis nutriētem, & humectantem. Quod si crassiori uti uelis sorbitione hoc modo conficito.

Panem purissimum mediocris etatis in exiguas abrade particulas, tribusq; aquis lauato, deinde amigdalārū succum ex aqua hordei extrahito, simulq; cum pane coquito, ad lentum ignem semper agitando, cunque semicoctum fuerit, coriandrum uiridem quantum manu capi possit in mortario cum paucō croco conterito, & cum sorbitione quæ ad ignem est dissoluito, adiecto zucaro, simul omnia coquito, quousq; permisceantur, coctleari panem ad ollæ parietes atterens. Cōueniens hic cibis est exiccato & super calfacto cerebro, frigidos et humidos halitus ad caput mittit, naturæ cerebri nimis familiares. Lusitanarum quæ in ægrotantium commodum diligentiores sunt fœminæ, cum somnum conciliare student, sorbitionem sic parant.

Micam panis post ablutionem in aqua hordei coquunt, butiri recentis parum pro panis portione, aut oleum purissimum oliuarū eius loco iniiciunt. Cūq; ferè coctū est. Coriandrū uiride & croci parum conterunt, & in mortario cum sorbitionis modico dissolunt. Oui recentis (in aqua frigida horis tribus infusi) uitellum, cū sorbitione, quæ in mortario est, coclearis conquassatione

permiscunt, in ollam reijciunt, & cum zucaro simul co-
quunt, semper agitando cum cocleari donec percoctum
sit. Valens hic cibus est ad conciliandū somnum. Atta-
men quia multi nutrimenti est, continuus febribus, &
acutis non conuenit. Nisi facultatis imbecillitas id sua-
deret. Febribus ijs quæ periodice intermittunt, &
quiescunt bono temporis intervallo concedi posset.
Lactucas quæ mediæ sunt ætatis in aqua coquito, cunq;
percoctæ fuerint, aquam ab eis forti compressione ex-
trahito, cultello in exiguas portiunculas percutite, oleo,
aceto, sale, & zucaro pro portione inspersis, uigilias pa-
tienti dato ut cum pane deuoret. Qui uero uigilias ob
doloris uehementiam patiuntur. Cibis somnum indu-
cere ne speres, sed confestim relictæ ea artis medicæ par-
te quæ uictus rationem docet, ad utranque & quæ de
medicamentis agit, & quæ circa manus operationem
uersatur te confer, ab illis, quo hominem à dolore leues
auxilium petas. Sciens in hora doloris cibum quemcun-
que culpa non uacare. Præcipue qui facile acescunt,
aut in fumum abeunt. Vtraq; enim causa dolorem au-
get. Nam ptisana quæ ab Hip. ut conuenientissimus ci-
bus acute febricitantibus receptus est, in uehementia
doloris ab eodem damnatur in primo de ratione uictus
in morbis acutis, in hæc uerba. Nisi quis inquit dolorem
uel alui subductione, uel insecta uena, pro utriusuis
exigentia soluerit, ptisanam ita affectis dederit, preci-
pitæ aget in mortem. De reliquis cibis in hora doloris
ita ait. Præbent hæc non solum si ptisana intempe-
stue utantur, uerum & multo magis si quippiam aliud

quod ptisana inconuenientius sit, uel ederint uel biberint. Sed fortasse quis nobis obijciat Hipp. in prædictis locis ptisanam prohibuisse sicuti & cibos alios, non doloris sed inflammationis membrana succingentis coctas ratione, de qua ei sermo erat, quam dolorē appellauit. Vere ita res habet, non ob id tamen aufertur quod diximus, nempe in hora uehementis doloris, cibum quemcumq; & si leuissimum culpa non uacare. Quinimmo magno esse nocumento assero, hac ductus ratione. Doctor est ex ijs quæ maxime uirtutem corporis prosterunt ut Gal. uisum est. Ita ut nec uentriculus cibum recte coquat, nec hepar aut uenæ hunc in sanguinem commode mutant. Nec distributio præterea, nec appositio, nec excrementorum expulsio, nec ulla naturalium actionū commode peragatur. Tum ob dolorem actiones lædentes, tum maxime ob id quod intenta natura ad id quod contristat, sanguinem & spiritus, qui commune ad omnes actiones instrumentum est, ad locum doloris mittat. Unde si, ut loca coctioni deputata indigentiam patiantur. Quæ causa est, ut cibus perperam coquatur in uentriculo, hepate, & uenis, facileq; inde extraneum concipiat calorem. Et tandem additionis doloris causa fiat. Cum igitur loca coctioni deputata influentis calidi indigentiam patiantur, & obiectum in quod agunt calido extraneo obnoxium ob id (natura alio intenta) maneat, consulte medici agunt sanguinem in forti dolore mittentes. Ut quantū natura à consueta deficit cura, tantum sanguinis imminuatur. Iuxta illud minori curæ minus quod curet. Nec solum mittendus

DE VICTV FEBRICIT.

est sanguis, ut qui in iocinere & uenis est, succū ab extranea calore incolumen tueamur. Sed & cibo qui in uentriculo est consulimus, uomitum prouocātes. Cūq; hæc ita se habeāt, dementis consilij fuerit, cibum ea hora ministrare, qua eius à corpore eductio doloris remedium est. Qua in sententia Gal. est in expositione illius maius quidem malum est &c. Vbi ad hunc modum scribit. Contra, autem qui ob dolorem uel morbi acumen, euacuatione interdum magis quam repletionem indigēt. Immo qui cibum his exhibet, maximum operatur malum &c. Cæterum cum dolorū plures sint differentia, ita ut alij alternis inuadunt temporibus & remittant. Alij perpetuo torqueant. Horum nonnulli talem consueti sunt uehementiam, ut in uigilias laborantes deducant. Alij in inquietationes. Non una uictus ratio ab omnibus sumenda erit. Dolores igitur quicunq; laborantes inquietant omnem cibum & potum abscindunt. Vt in ijs quæ in primo libro differuimus abunde dictum est. Vbi ostendimus morbum cui continua coniuncta est inquietatio intra dies quattuor terminari ob eius uehementiam, & omnimodam ei abstinentiam conuenire. Vehementissimi quidem dolores sunt, qui laborantes in inquietationem deducant. De hoc locutus est citato loco Gal. cum dixit qui alimentum his ministrat, maximum operatur malum. Quod manifestum est ex ijs quæ in initio expositionis scripsit ubi uehementissimum dolorem ad hunc modum describit. Propter dolores sæpe quidem laborantes sine pulsu fiunt, & animi deliquia inturrunt, et in nullo motu moueri possunt. Similia bis ab

acumine morbi eueniunt. Sunt autem quibus non propter id uirtus laborat, sed ob uasorum quomodolibet factam euacuationem. Siue igitur ob excretionem sensui manifestam. Siue ob διαφύρσιον, id est in halitus digestionem, siue ob inedia, hi quidem alimento indigent & quàm celerrime refici. Contra autem qui ob dolorem, uel morbi acumen, euacuatione aliquando indigēt magis, quàm additione. Immo qui alimētum his porrigit, maximum operatur malum. Validum ex uerbis Gal. sumitur argumentum, laboranti uehementissimo dolore cum robore uirium, nullum exhibendum fore alimentum. Cum in eos qui ob dolorem imbecilles admodum facti sunt, ita ut absque pulsu fiant, & animi deliquio capiantur, maximum operari malum scribat. Ob dolores qui proxime à uehementissimis degenerant, unam decubitus formam seruare queunt laborantes. Somnū tamen capere non possunt. Quare talis ūs uictus ministrandus est, qualem morbis, qui ad septimum terminantur, conuenire diximus. Vigiliæ enim continuæ, ut in primo libro ostendimus unum sunt ex tribus symptomatibus, quæ morbum ad septimum terminant. Iis igitur qui ob dolorem perpetuas patiuntur uigiliās uictus per pocula conuenit. Sic Hip. uti uero potu oportet, si dolor aliquis affuerit, oximelite, hyeme quidem calido, æstate uero frigido. Si uero multa sitis fuerit, & melicrato & aqua. Quo in loco Hip. uictus formam à ratione duorum symptomatum diffiniuit, nempe à dolore & à multa siti. Dicens χρῆσθαι δὲ ποτὶ, ὡς ἀλγημάτων ἔχοντες οἷον μέλιτι, χαμῶνος μὲν θερμῶ, δέρας δὲ ψυχρῶ. καὶ δὲ πολλὰ δῖν

αα, καὶ μελκρότω καὶ ὕδατι. Vbi perperam quidam in
 hunc modum uertit. Vbi autem dolor aliquis uexaue-
 rit oximeli bibendum dabis. Non equidem id solū uult
 Hipp. ut oximelite cum dolor aliquis affuerit utamur.
 Sed duo nos in dictis uerbis docet. Nempe cum dolor
 aliquis affuerit uictu per pocula utendum esse. Secun-
 do declarat nobis conuenientem potum oximeli esse.
 Si enim eadem fuisset Hip. mēs ac traductor intelligit,
 breuius quidem sententiam protulisset ad hunc modum
 χρῆσθαι δὲ ὀξιμέλιτι μὲν ἀλγημάτι ἐχόντι &c. Hoc est uti uero
 oximelite si dolor aliquis affuerit. Id præterea facile
 erat ex mediæ quietis signo quod dictioni ποτῶ, coniun-
 ctum est elicere. Sed quod semper dicere sum solitus
 hic præterire silentio haud æquum censeo. Solius Hip.
 scripta de uerbo ad uerbum trasferenda fore. Ut incor-
 ruptam grauissimi uiri sententiam habeamus. Nullo
 quidem breuiloquus uir ocioso usus est uerbo. Quicun-
 que igitur in uertendo Hipp. curant elegantiam ser-
 monis, caueant in diuinas uiri sententias corrumpant.
 Ad propositum redeundo. Cum dolor, tali sit uehe-
 mentia ut uigilias inducat, uictum per pocula indicat,
 sorbitionesq; tunc temporis ministrandas non esse. Sed
 forsā quis nobis obiiciet. Hip. cum in dolore assiduo
 sorbitiones & cibum subtrahit, non doloris sed inflam-
 mationis, & acutæ febris ratione prohibet. Ut in pri-
 mo de ratione uictus cum scribit. Ad hæc si adhuc la-
 teris dolor continuis fuerit &c. Non solum ubi dolor
 acutæ febris cōiunctus est, uictus qui poculis sit crassior
 incommodus est, sed ubi dolor absque ulla sit febre.

Quod cum ostendemus, manifestum erit in dolore acuta febris coniuncto, cibum & sorbitiones Hipp. ratione symptomatis potius quam morbi prohibuisse. Ille igitur inde uictu sanorum ita scribit. Quibuscunque dolores sunt in uisceribus uel ex exercitatione uel alia quapiam ambulatione his confert sine cibo recreari. Potione uero uti &c. Ex ijs quæ statim subiungit, & apertius ex Gal. in expositione manifestum fit, de ijs qui absq; febre sunt doloribus locutum fuisse. Si igitur scripta Hip. uigilanti lectioni percurramus, nō solū cibum ijs prohibere, qui cū robore uirū doloribus infestantur, reperiemus, sed in eos qui imbecilles ideo effecti sunt, si quis uictus formam, aut quātitatem ad maius augeat, magnum operari malum affirmat. Vbi ad hunc modum scribit. Ingens si quidem malum est, si ob dolorem & acumen morbi imbecillitato porrigat quis potū uel sorbitionis plus, uel esculētum, imbecillitatem eam ex uasorum inanitione contigisse arbitratus &c. Quo in loco potum, sorbitionem, & esculentum non asserit male ijs exhiberi qui ob dolorem, aut morbi acumen imbecilles sunt, ut quidam opinatus est. Sed solum damnat additionem uictus formæ, aut quantitatis quibus ante imbecillitatem æger utebatur. Vt si tribus aquæ mulsæ cyathis Socratem acuta febre, uehementi capitis dolore, laborantem nutrias, ob dolorem autem, aut uorbi acumen in magnam incidat imbecillitatem, ita ut moneri nequeat, & absque pulsu fiat, caueas ut huic aut sorbitionem, aut plus tribus cyathis mulsæ ministres. Nam hoc quidem magnum malū esse affirmat. Quibus

DE VICTV FEBRICIT.

autem signis imbecillitatem, quæ à dolore aut morbi acumine & eam quæ à uasorum inanitione euenit discernere possimus supra ostensum est. Potus igitur quæ ijs concedemus talis sit ut aliquod præstet corpori nutrimentum, & doloris etiam causam respiciat. Vt oximeli quo utitur in lib. 1. de ratione uictus ad lateris dolorē, ut quod eius causam respiciat. Et in libro de uictu sanorum ad dolores uiscerum absq; febre, qui ab obstructione ortum habent, potione utitur cuius minimum in corpus ingrediens plurimum educat lotium. Et quia hæc inuestigatio ad eam artis medicæ partem quæ morborū speculatur remedia (*ὑγιαίνουσα* Græce dicitur) spectat, non est quod hic longiorem faciamus sermonem. Illuc te conser si quod reliquum huius speculationis est, quæris. Nos interim reliqua prosequamur præpositi. Vigilia interdum ex penuria uaporosi halitus cerebri humectantis euenit, & si quando ex defectu alimenti in uentriculo accidat, ut plurimum inclinante morbo fit. Iis præcipue qui bona ualitudine multum ingerere sunt soliti. In morborum incrementis, aut uigore, raro ob hanc solam causam uigilia accidunt. Difficileq; tunc id percipere, ui morbi uigiliarū magis perspicua causa, illam obscurante. Cum ergo hanc esse uigiliarum occasionem intellexeris, cibum dato qui facilis sit coctionis & substantiæ, quæ dulces ex se emittat halitus. Vt pisces petrosi, qui in hora uigeant, cocti cū anetho, petroselino, sale, & aceto, oleo, aut butiro recepti, & succo uuæ acerbæ, aut eius loco berberibus. Hunc cibum minstrauī cū essem in Anglia præclarissimo uiro domino

ro domino Guilielmo cidne serenissimi principis Anglorum, magno cubiculario dignissimo. Cum enim inclinante iam morbo uigilas pateretur, multaq; in huius gratiam apparata nil quicquam proficerent, rogavi hominem an uellet fluuiatiles ad cœnam pisciculos, quos gudions uulgarī sermone Angli appellant. Annuente inductoq; coquo modum apparandi impositi. Permissique, ut eisdem ad libitum uesceretur. Abij, in crastinum rediens percepi hominem nocte dulces cœpisse somnos. Ad huius cognitionem me potissimum induxerunt hominis habitus, & eius assuetudo. Iis accessit quod inclinante iam morbo nulla uidebatur ad uigilias inducendas iusta occasio. Quapropter diligenter oportet medicum contemplari actiones singularum corporis partium, quando imminuuntur, aut deficiunt, ratione indigentie nutrimenti, & quando acuminis morbi. Cunque primum contingit, cibus illico dandus est. Si secundum, maxime prohibendus. Qua in re sæpe labuntur nostræ ætatis medici, non discernentes alterutram actionum noxæ causam. Quod antiquis medicis prior Hip. obiecit in libro secundo de ratione uictus in morbis acutis in hæc uerba. Neque sanè horum ita peritos uideo medicos qui ut oportet dignoscant eas quæ in morbis contingunt uirium infirmitates, quæ ob uasorum quam *καταρρετιν* Græci dicunt. Et quæ ob aliam quampiam irritationem, & quæ ob *πόνον*, id est laborem, & quæ ob morbi acumen fiant.

DE VICTV FEBRICIT.

C A P. XXVIII.

SITIS febricitantibus quandoque tali est uehementia, ut indicationem curationis suppeditet. Id hoc modo discernas. Cum igitur sitis morbi materiae remouatur coctionem, aut nimia sputum exiccatione inhibet, aut ab ea corpus arescat, rationabiliter ab ea uictus ratio sumetur. Quare tunc dare operam medicum oportet, ut sitim leuet. Idque fiet cibo, & potu qui actu & potentia frigidi, & humidi sint. Omnium maxime, quæ sitim uincunt aqua frigida est. Præcipue quæ à medicis probatur. Secundo loco est aqua hordei. Tercio syrupus uiolaceus multa aqua dilutus, quem sic præparabis.

Aquam coquito in olla recenti ad unius quartæ partis absumptionem, ab igne amouens residere finito. Deinde aquam à sedimine separato, cuius accipito partes uiginti, syrupi uiolarum depurati, aut eius uilep partem unam. Bulliant ad lentum ignem, donec permisceantur. Deinde sub dio exposito ad Septentionem. Et frigidum exhibeto. Simili modo confici potest aqua zucari qua nostri recentiores multoties utuntur, Sed considerare diligenter oportet ne in uehementi linguæ totius quæ corporis squallore utamur ea nec abstergente ullo. Nam talia corpus siccius reddunt. Ut me experientia olim docuit. Cum essem in Anglia, Hispanum puerum periodica febre laborantem inuisi, habitu gracili, & præter modum squalido, eius lingua præ nimio squal-

lore arida ultra modū erat, ut uis loqui posset, indomitamq; sitim patiebatur. Frigidā puero exhibere mihi uisum est. Zucarnmq; imposui, ut aquarum crassitiem corrigeret. Cunque à potu frigida non leuaretur sitis, uitio aquæ illud tribuens, aquam destillationis buglosæ ut pote in qua nil crassum est cum zucaro ministraui. Cunque à copioso, & crebro illius potu siccior etiam euaderet, intellexi tandem in uehementi squallore, nimium aduersa esse quæ abstergendi facultatem habet. Ex eo quia corpus, & humores sicciora reddunt. Nam non aliter corpori quod uehementer exiccatum est, ea quæ abstergunt adhibentur, quam si lintea sordida absque aqueo humore sapone deterforio unguento diligenter perfrices, ut sordes detergeas. Quāto enim plus deterforij adhibueris eo nihil proficies. Nam sordes magis tenacius impinges. Oportet enim lintea aqua prius macerare, ut sordities quam abstergere cupis humecta fiat. Ut consueuerunt fœminæ, quæ doctiores in ea arte sunt, ut minores faciant expensas, diutius lintea in aqua macerare permittunt, rem illis usu monstrante. Cum igitur hominum corpora uehementer exiccata sunt, cauendum est ab usu abstergentium. Non sunt enim eo tempore detergendi humores, sed potius humectandi. At cum humectos satis reddideris, abstergentibus secure uti poteris. Hoc postea ab Hip. intellexi in primo de ratione uictus in morbis acutis ubi ita scribit. Verum dandæ sorbitionis quantitas hoc obseruabitur modo, nempe si morbus siccior quam, ut quissiam

DE VICTU FEBRICIT.

existimet fuerit, non multum dare oportet sed præbibe-
re ante sorbitionem uel mulsam, uel unum. Alterutrius
magis conueniat. Gal. in expositione signa commemo-
rans quibus cognoscitur siccus affectus, ita scribit. Et
sanè inquit superfluitatum nihil excernere, siccorum
omnium morborum nota est. Non immerito igitur
Hippoc. humectantium aliquod ante ptisanam adsumi
iubet, & c. Nec solum ea quæ abstergunt in dicto af-
fectu fugienda sunt, uerum, & quicunque cibus, &
sorbitionis. Nam solo potu humectante utendum est in
iis quorum lingua totumque corpus ultra modum arid-
a sunt. Si enim iis cibum, aut sorbitionem dederis,
partes sorbitionis quæ crassioris sunt substantiæ uentri-
culi tunicis præ nimia earum siccitate adhaerentes à fe-
brili calore deurentur potius quàm coquentur. Non
aliter quàm cibus illæ adhaerens comburi solet, humore
aqueo deficiente. Hæc ut arbitror fuit mens Hip. supra
citato loco, cum morbo ultra modum sicco existente, an-
te sorbitionem præbibe mulsam uel uinum ægrotantes
iubet uolens in tali affectu solo potu humectante prius
nutriendos esse laborantes donec ariditas soluatur. De
inde ad sorbitiones deuenire. Et hoc est quod intellexit
cum dixit ἀλλὰ προπίνειν πρὸ τοῦ πόφουματος, id est sed præ-
bibere ante sorbitionem oportet. Nec ideo quod Hip.
mulsam exhibere consulat, quæ mellis ratione abster-
gerere ualet, in Hispani pueri affectu aquam zucari
præter rationem prohibuimus. Quæ longæ inferior
est quam mulsæ in abstergendo. Nam cum Hip. in mor-

bo ultra modum squallido nec sorbitionem, nec cibum alium quęcunque recte exhiberi ob iam dictam rationem opinaretur, potum concessurus magis nutrientem elegit. Sunt autem quattuor de quibus agit in libris de ratione uictus. Nempe aqua hordei, mulsa, uinum, oximeli. In sicco affectu nec oximelitis, nec aquę hordei mentionem fecit. Alterum quia nimis incisuum est sicco affectui non conuenit. Aqua hordei prout potus est, parum nutrit ob tenuitatem. Mulsę autem, & uini meminit tanquam ea, quę magis nutruunt, & humectant. Electionem uero alterutrius medico relinquit, ac si intelligat in sicco affectu posse aliquando alterum ledere, & eorum alterum conuenire. Si enim à bilioso humore ob eius indomitam qualitatem siccus eueniat affectus uitanda magnoperę est mulsa, uinum uero exhibendum quod citra abstersionē incisionemue humectat. Et uires naturę ministrat. Quod si à nimis crasso humore coëtrici facultati repugnante, morbus siccior euadat, mulsa potius quàm uinum ministranda est. Tum ad humoris extenuandam crassitiem, tum ad humectandum corpus. Plus enim humectat mulsa quàm oximeli. Hanc fuisse Hip. mentem opinamur. Sed, & illud certo scimus quod siccitas, quę linguae, & toto corpori aduenit ob bilis ardentis qualitatem multo ualidior est, quàm quę à crassitie sola humorū prouenit. Quapropter recte supra additum est in uehementi siccitate uitandum esse aquam zucari, et quę abstergerendi uim habeant. Potumq; solo humectante utendum esse.

DE VICTV FEBRICIT.

Sentis ne studiose lector quā dicta mea cū Hip. conueniant scriptis. Quem unum uirum unde quaque sapientissimum admiror. Sed rectius mihi qui obijciat, me in curatione pueri Hispani fuisse lapsum, febrem tertianā patientis cum ualidissima, & linguæ, & totius corporis siccitate, qui ei aquam zucari ministrassem, nam manifestum erat uehementem illam siccitatem à qualitate bilis accerrimæ ortum traxisse. Quapropter uino diluto non aqua zucari nutriendus erat. Sed bene ualeant medicorum errores quibus à tergo morosa cōiuncta est pœnitentia, ut in posterum illud caueant attētioriꝫ cura remediorum qualitates, & affectus examinent. Ego uero ut moris est lusitanorum genti, errorem meum ingenuè fateri pium esse iudico. Eundemq; scriptis mandare. Vt posteros rei cautos reddam. Id enim est à uitio uirtutem, bonum à malo, ab obliquo rectū elicere. Scio enim hominis naturam talem esse, ut facile elabi possit. Quod si cum Homero sentiendum sit, intellectum hominis in terris talem esse qualem pater deorum atque hominum induxit in diem, medicorum errores profectò digni sunt uenia. Qui secretos corporum affectus rimātur. Quapropter cum erroribus maxime sit medicus obnoxius, pꝫ hominis officio eum uti iudico, qui Hipp. in primo de morbis uulgaribus adimplere conatur præceptum dicētis. In hoc te exerceto, ut saltem si non profis nequid noceas. Sed ad reliqua propositi reuertamur. In febre quæ cum ualidissima siccitate est, cibis parcendum est, solo humectante potu nutriendi sunt ægrotan-

tes. Vinumq; ijs exhibendū, quod natura aquosum sit. Item pullam crassam cum hepatica, hordeo ab utroque cortice exuto, prunis, passulis, floribus borraginis, et uiolis in copiosa aqua coquito, ut ius tenue fiat. Cūq; per cocta fuerint, collato. Ius aegrotanti tenue exhibeto, statimq; uinum dilutum in quo super natet frustulum panis quantum uno haustu bibere possit, dato. Ventriculo aliquid extra, quod humectare possit apponito. Quod si siccitas remissior fuerit, ijs quæ infrigidant, & humectant in cibis, et potibus utemur. Cucurbita cocta cibus est qui sitim compefcit. Lactuea etiā eo quo supra parauimus modo utilis est, cruda etiam cum eisdem deuorata maxime sitim reprimit. Oleum purissimum oliuarum immaturi partem unam, aceti albi partes duas, zucarī tres, simul misce, & cum pane utitor. Ad sitim sedandam, & ad alios quamplurimos usus confert. Panis præterea refrigerans conuenit prout parauimus supra cū de uictu qui tertianæ puræ competit ageremus, cibus est maxime aptus sitienti febricitanti. Sed, & sorbitio ex pane, & aqua hordei, & zucarō quam communiter panatellā uocant, confert. Conferunt, & cibaria ea quæ ex herbis, & fructibus parantur. Quorū omnium melones primum locum obtinent. Sunt qui ad sitim sedandam aquis distillatis endiuia, eichorij, buglosæ cum syrupo rosarum uel uiolearum, aut iulep utuntur. In febribus, quæ à causa calida ortum habent absque pituitæ mixtione æstate præcipue communis usus amplectendus est. Cæterum latere non oportet ubicunque crudi-

DE VICTU FEBRICIT.

humoris de pituita genere coctionem querimus, ut fe-
bri medeamur, magis lædere potum aquæ distillatæ
quàm aquæ naturalis. Illa quidem si frigida offera-
tur duplici nomine infrigidabit, actu, & potentia. Ma-
gis præterea penetrat in corporis interiora ratione
qualitatis igneæ. Vnde ab huiusmodi aquis magis pa-
ti natium calorem quàm à naturali manifestum est.
Quapropter in causa frigida, & ijs qui alicuius inte-
riorum viscerum imbecillitatem patiuntur, uitandas
esse distillationum aquas opinamur. Sed non præter-
mittendum est sitim quandoque à uentriculo, quando-
que ab iocinere, & pulmone, & renibus euenire pos-
se. Vt à Gal. in libris de locis affectis scriptum est.
Quæ à pulmone ortum habet, aqua hordei cum syru-
po uiclarum sedat. Ab hepata aquæ distillatæ frigida.
A uentriculo, potus aquæ frigida. A renibus, aqua
decoctionis liquiritiæ compescit.

C A P. XXIX.

PATIENTUR febricitantes aliquando distio-
nem appetentiæ, ut eorum corpora arefcant atrophia.
Cunque multiplices habeat causas nullus cibus simpli-
citer commendandus est ad inducendam appetentiam.
Sed prius causa inuestiganda est, ut quod utile ægrotan-
tibus sit inueniamus. Cæterum ommissis primarijs causis
appetentia deijcitur deficiente aliquo eorū, quæ ad in-
ducendam appetentiam necessaria sunt. Appetimus se-

cundum naturam homines hoc causarum ordine. Corpora nostra à vi continentis in halitus perpetuo digeruntur. Huic effluxui ut remedium restauratio à singulis nostri corporis particulis quaeritur. Restauratur uero id quod effluxum est, ab ea substantia, quæ singulis partibus apposita unica transmutatione in substantiam simplicis mutatur; (Cambium medici uocant) hæc rursus ab ea quæ in osculis tenuium uenarum est, instauratur. Non à rore ut aliqui opinati sunt. Quæ in exilibus uasis est, à sanguine qui in magnis continetur uasis renouatur. Vasa ab iocinere, hic tandè à uentriculo per meseraicas uenulas quas manus hepatis reète quidam nuncuparunt sugit. His trahentibus ad os uentriculi succus peruenit. Hunc partium eius aliqualis constrictionis excipit. Huius constrictionis sensus, fames est. Tres igitur summatim causæ consequentes in fame naturali apparèt. Attractio, constriction, & sensus oris uentriculi. Appetentia igitur quocunque horum deficiente diminui, & prosterni potest. Cæterum prima causa è tribus deficiente, remedium ab ea artis parte, quæ morbos curat petendum est. Minimam scias uim tunc inesse cibis cum naturalis totius corporis attractio deest. Aliquam sed exiguam si tertia. Magnam uero si secunda. Non solum igitur intemperies oris uentriculi cibi appetentiam deijcit, sed & humor quicunque sit, qui aut sensum oris hebetet, aut cōstrictionem partium eius prohibeat. Intemperies autem quæ ut in pluribus cibi fastidium generat calida est, cum utraque contra-

rietate sicca & humida humori coniuncta & absq; eo. Ceterum cum caliditas, & humiditas causa sunt deiectionis appetentiae, cappares cum aceto & conditæ oliuæ, ius lentium, profunt. Sed cum siccitati coniuncta est caliditas, & appetentiam deijcit, aqua frigida maxime iuuat. Nisi quid prohibeat. Lactuca, cucurbita, citrulli, melones, & id genus fructus maxime profunt. Quae de causa æstate his prius ad mensam utimur, ut calorem & siccitatem uentriculi reprimamus. Vnde ab ijs nosmetipsas ad cibos promptiores sentimus. Multa præterea sunt frigida & humida cibaria huic proposito conuenientia quorum supra meminimus. Sed quæ à fructibus petuntur, & ad appetentiam inducendam, & ad sitim sedandam efficaciora sunt. Deijcitur etiam ob defectum constrictionis partium oris uentriculi. Huic contraria dispositio est, quam quidam recentiorum medicorum uentriculi remollitionem, aut relaxationem dixerunt. Hæc non solum actioni facultatis appetentis sed & reliquis uentriculi actionibus aduersatur. Ortum habet ab humore pituitoso diu uentriculo insidente, & eius tunicas irrigante. Cuius meminit Gal. septimo de methodo, ubi in remedium huius uitij absinthij potionem concedit. Hæc relaxatio superficiem uentriculi leuem reddit. Vnde appetentiam deijcit. Hæc enim aut sensus exasperantis rei est, aut ex eo nascitur. Quam ob rem absinthium recte appetentiam inducere dicitur. Nam sua siccitate laxum uentriculum corrigit, amaritudine & astringitione leuem eius superficiem

exasperat. Quam ob rem cum ob relaxationem uentriculi deiciatur appetentia, absinthio utemur. Vnde ad hunc sensum recte à Dioscoride commendatum est, ad discutienda fastidia. Sed & cappares, & oliuæ hoc modo appetentiam excitant. Pisces quoque saliti efficacissimi sunt ad deiectam appetentiam suscitandam. Vnde supra cum de uariolis nobis sermo esset, & de pestilenti febre salitos pisces appetentiam excitare asseruimus teste Rasi. Fit & aliquando ut humor crudus uentriculi tunicis diu in hærens fastidium inducat. Quæcunque ergo hunc excernendi, & uentriculum exasperandi facultatem habent, appetentiam proprie inducere dicuntur ob id, quod ut plurimum à iam dicta causa nascuntur cibi fastidia. Talia sunt in calidis allium, & cepa. Allium si quidem excernendi uim habet. Ventrículumq; mordet, & exiccat ut asseruit Dioscorides. Vanum est quod de eo dicitur flatuosum esse, & cibi fastidia inducere. Nam experientia quotidiana scimus, aduersus flatum non læue remedium esse, & appetentiam excitare. Cui sententiæ astipulatur Gal. quarto de ratione uictus in morbis acutis. De allio supra à nobis habitus est sermo, ubi ostendimus omnes naturales uentriculi actiones roborare. Quicumque igitur à crudis humoribus dum uentriculo insidentibus cibi fastidium patiuntur, allio in succo uuæ acerbæ, aut acetosæ macerato efficacissime utentur. Sed & cepæ expurgandi uis inest, iuxta Dioscoridis sententiam, uentrículumq; mordet.

DE VICTV FEBRICIT.

Qua de causa appetentiam inuitat. Quicumque igitur ob exercitij defectum, aut ob debilem expultricem, ob dormientem oris uentriculi sensum habent, hacq; occasione cibum fastidiunt, cepa cruda utiliter uti possunt cum aqua sale & pipere in tenues laminas incisa, unde apud hæbreos in prouerbio est cepa absq; pane scrutatur. Sinapi etiam aceto & pane contusum sensum uentriculi acriorē reddit, excrementa eius transferēdo. Petroselinū cū cibo coctū, aut in uisceribus capi qui ad ignem coquitur immisum, citra eā quæ à manifestis sumitur qualitatibus actionē, appetentiā excitat. Crudum item cum aceto, et pane in mortario contusum mirum in modum prodest. Vnde angli petroselini carnis assis infixi nidore delectantur. Recte quidam ex recentioribus de eo sentit, calido & frigido conuenire uentriculo. Cum ergo à calore & siccitate prostrata est appetentia aqua frigida summum est remediū. Olei immaturi partes duas, aceti partes tres, simul misceto. Mixtis utere cum pane. Cum à calore & humiditate ortū habet, oliuæ, cappares, uua acerba & similia profunt. Cum uero à relaxatione partium oris uentriculi, saliti pisces, cappares, & reliqua cibaria quæ uentriculum exiccantia exasperant. Allia uero feruescēta cum succo uuæ acerbæ, aut acetosæ relaxationi frigido humori coniunctæ non inutilia sunt. Quod si ob hebetem uentriculi sensum, cibum fastidiant ægrotantes, cepa cum aqua sale & pipere inuat. Sinapi præterea cum pane aceto cōtusum prodest. In summa omnia

quæ discutere ualeant, & mordendi facultatem habeant. Est unus ex arabibus medicis qui ita scribit. Et ex eis quæ conferunt illis quorum appetitus prostratus est, propter debilitatem, sicut conualescentium, aut propter materiam humidam uiscosam est, ut comedant oliuas & aliquid de piscibus salitis. Sed re uera sicut oliuæ læsioni sunt ijs, quorum uentres humido & uiscofo humore abundant, ita & pisces saliti conualescentibus ijs, qui ob debilitatem cibum fastidiant. Nam iuxta huius medici sententiam propter sanguinis penuriam ijs deijcitur appetentia. Et subdit statim ut conualescentibus accidit, aut ijs qui euacuantur plurima euacuatione. Vtrisque cum cibum fastidiunt, piscium salitorum usum potius incommodo fore, quàm adiuumento opinor. Sed neque oliuæ conditæ hos meliores reddent. Sed si succum perdicis ijs obtulisset, offamq; panis in uino odorifero madentē & similia, citius his appetentiā reduceret, cum à prædictis causis cibum fastidirent. Sed indistincte admodum multa postmodum connumerat, quæ fastidium discutiunt adhuc modum. Ex promoucantibus appetitum sunt cappares præparatæ, menta, cepa, oliuæ, piper, gariophili, galanga, acetum, acetosa almuri, allea, cepa, opoponacum & mel. Hæc ille, quibus in uerbis multa absque ulla methodo connumerauit remedia, quibus conueniant dispositionibus ea non ad aptans. Quorum alia ex eo quia exiccant, & exasperant appetentiam inducunt, ut cappares præparatæ, & menta. Alia ob id quod astringēdo exiccant, ut ace-

tum acetosa myria, & conditæ oliuæ. Alia quia exiccando excrementa à uentriculo excernunt, ut allium piper, Alia quia mordendo oris uentriculi sensum acutiores reddunt, ut cepa, si quando ab excrementis expultricis facultatis, aut coëtricis uitio redundantibus hebes fiat. Hoc profectò docere est, remediorum nempe unumquodque singulis causarum à quibus morbus ortum habet contrarietatem obseruantes adaptare. Sed inter ea quæ indistincte numerat mellis meminit. Quod nec ratione nec experientia appetentiam posse inducere comperio. Nisi id melli concedas ob id quia abstergendi uim habeat. Hocq; modo plura sunt quæ appetentiam inducunt quàm quæ experientia ostendat.

C A P. XXX.

T V S S I S in febris cum à caliditate & siccitate absque humore ortum habet, hoc uictu utere.

Aquæ hordei libram unam, syrupi uiolarum, aut eius iulep partem decimam, misceto & utere.

Portulacæ costæ cum aqua & zûcero confert. Valde etiam prodest panis in aqua frigida infusus, zûcero uiolarum super asperso.

Fiat ptisana hoc modo. Hordei ab utroque cortice exuti manip. quinque, uiolarum recentium portulacæ, & prunorum ana manip. unum & semis, coquantur, in

aqua copiosa cum duobus pullis crassis paruulis, donec rumpatur hordeum & tenerrimum fiat. Coletur tandem & modico zucaro penidiarum addito, bullire hordeum cum decocto iterum finito donec permisceantur, utitor cum oportuerit. Sunt qui hunc cibum bordeatum nuncupent. Multum prodest calida, & sicca intemperiei iocineris, & pulmonis. Multum etiam his conuenit expressio quattuor seminum frigidorum (emulsionem medici uocant) ex aqua bordei cum zucaro penidiarum, & modico coriandri uiridis integri in ebullientem succum proiecti. Cum uero à phlegmate crasso ortum habet. Sorbitione furfuracea utere. Vtere & iure Galli antiqui prout supra parauimus.

C A P . XXXI.

AD obstructionem iocineris sorbitionem è furfure ad hunc modum parato, capillorum ueneris recentis manip. tres, aquæ è fonte libras tres, coquito intesta recenti quousque aqua fuluum nata sit colorem. Collatoq; , & in collaturam furfuris è recenti tritico manip. tres linteo excepti infundito, & toties exprimito donec decoctum albescat, fermenti trium dierum in æstate, & unius hebdomada in hyeme uncias tres simili modo in decoctum infundito, & toties exprimito quousque aqua candidior appareat. Cum zucaro tandem coquito tandiu quo ad crassitudinem sorbi-

Sorbi-
tio fur-
furacea,

DE VICTV FEBRICIT.

tionis perueniat. Obstructionibus iocineris plurimum ualet & lienis, præcipue addito scolopendrio, ut simul cum capillari herba coquatur. Valet & ad alios plurimo usus. Tussi à crassa pituita ortum habenti mirum in modum prodest cum hyssopo. Febribus etiam pblegmaticis, & ijs qui colica dolore uexantur, cum chamemelo. Alium ciet, renes mundificat, calculos, & arenas potenter pellit. Hoc unum huic sorbitioni incommodum est, quod appetentiam deicit, creber eius usus. Confert & ius cicerum, ut supra parauimus, adiecta hepatica si hepar afficiatur, aut cæterach si lien. Sorbitio præterea ex capite arietis decocti cum chamemelo, passulis, & reliquis cuius supra meminimus maxime prodest ad antiquas, & induratas obstructions.

C A P. XXXII.

FLUXVS uentris si statim inter morbi initia eueniat, sistendus ideo uidetur esse, quia eo tempore ui morbi potius quàm naturæ actione regulariter agentis euenit. Proinde cum speculatio hæc ad curatiuam methodum spectet, solum ea quæ ad uictus rationem attinent dicimus. Cæterum cum alius liquida inter febris initia à ui morbi irritata natura fiat, necesse est ut ex eo labor & uirium iactura sequantur. Quarum enim natura per seipsa auctor est effluxionum

fluxionum non morbi initio sed post crism sunt. Roborare igitur naturam à morbi uolentia oppressam expedit cibo crassiori, quam pro morbi acuminis ratione. Nam symptomati illud indulgendum est. Ut si Socratem ponas causo laborare cum aluo liquida, non potu solo (quem uictu alias causus exposcit) sed sorbitiuncula ex prisa cremore hunc nutries. Hoc uoluit Hyppocrates quarto de ratione uictus de causi alio genere agens, què nothum Gal. appellat, ubi sorbitiones attractorias dari iubet. Idem ab eodem in tertio cum de deiectionibus biliosis puris & spumosis ageret discimus. Sed de ijs satis in primo libro diximus. Sic ergo manifestum est ex dictis Hypp. & Gal. quibuscunque in febribus aluus ab initio liquida est, crassiori uictu febricitantes quam morbi acumen expescat, alendos esse. Nam ut plurimum huiusmodi uentris fluxus inter morbi initia euenientes si permanent, corpus absumunt contabesciuntq; Quà ob rem colliquantium febrium inditia sunt et effectus. Quod à Gal. in quarta de ratione uictus in expositione illius quibus aluus per febres &c. Scriptum est in hæc uerba. Nam ut cetera omittam cū aluus liquida esse possit, tum propter phlegmonem, tum propter contabescientem colliquantemq; febre, frigida potus phlegmoni contrarius est &c. Sed forsitan quis nobis illud Hippocr. secundo de ratione uictus obijciat. Ingens si quidem malum est, si ob laborem morbi que acumen imbecillitato porrexerit quis potu uel sorbitionem &c. duplicem imbecillitatem in febribus contingere posse

DE VICTV FEBRICIT.

dicimus. Alteraq; ex sola spiritus substantiæ resolutione fit. De qua intellexit Gal. cum loco citato dixit. Ob dolores sæpius ægri sine pulsu animique deliquia incurrunt & nullo pacto queunt moueri. Altera uero ex defectu materiæ ad eorū generationem, quam tetigit loco citato sub ijs uerbis. Sunt autem, inquit quibus non ob hæc uirtus offenditur, sed ob uasorum quomodolibet factam euacuationem. De primo imbecillitatis modo intellexit Hip. cum dixit ingens siquidem malum est &c. Vbi ostendimus secundum mentem Galeni, qui laborantibus huiusmodi imbecillitate cibum exhibent, maximum operari malum. Eos uero qui ob defectum materiæ ad generationem spiritus infirmiores sunt, cibari quàm celerrime oportet. Immo si quis tenui uictu hos alat, non parum lædet. In febribus autem quæ cum aluo liquida imbecillitates, sunt, eas partim ab euacuatione illa ortum habere suspicari medicum æquum est. Quapropter quantum euacuationi occasionis dat, eo tantū tenui uictui parcendum est, & crassiori indulgendum. Sed non abrefuerit Anglæ mulieris curationē referre, quæ ad iam dictorum intellectum non parum proderit. Pharmacolæ hispani uxor ardenti febre correpta est. Aluus perpetuo liquida erat, uigilias patiebantur, & uentriculi immoderatum ardorem. Deiectiones febrilem æstum non exstinguebant. Huic aquā ordeï solum propinandam fore aliqui suadebant, morbi nanq; acumē crassiorem uictum non expossere iudicabant. Alij medicaminibus peracuti morbi uim compescere melius esse.

esse. Alij immoderatum uentris profluuium, ijs quæ astringerent sistendum fore existimabant, ea de causa quia nullum ex eo ægrotans leuamen perciperet. Mea quidē preualuit sententia, ut nec astringentibus fluxus uentris cohiberetur, nec ad nulla medicamina tunc adesse occasionē, nullōq; alio eos tēpestiuius uti posse remedio, q̄ cassiori pro morbi ratione uictu, laborantis naturā roborare. Posse siquidem eo modo citæ alui symptoma minori ferre incōmodo. Quapropter crassa sorbitione ex pulla gallinacea conuenientibus herbis tēperata, mulierē per aliquot dies nutriui, nullo alio utens remedio. Sic quidem illa acutū morbum euasit, solo cōpetenti uictu. Unde collegi in febre acuta cū immoderato uentris fluxu, saluberrimū esse id solum medicū curare, ut naturam crassiori uictu roboraret. Sed qñ astringente cibo & potu utendū sit, deinceps considerandum est. In acutis febribus morbi effectricem causam extra corpus pellere modis omnibus damus operam. Cum autem aliqua euacuatio sponte euenit & si intempestiue fiat, ideo sistenda non est, quia noxiū humoris superabundantis excerni portionem suspicandum est. Et si in huiusmodi intempestiuis alui deiectionibus multum eius quod utile & nature conueniēs est euacuari certo sciamus, non ob id compescere aluum citam oportet. Nam maius ex retentione prauī humoris solet incommodum sequi, autē febre & incrementibus ob id symptomatibus robur virtutis deuorantibus, quā sit imbecillitatis damnum, quod contrarium operantes vereri possent.

DE VICTV FEBRICIT.

Quapropter consulentes febri & eius symptomatibus fluxum ventris non sistimus, uirium robori crassiori uictu prouidentes. Intelligendum tamen est, quod in solo eo qui ob liquefacientes febres fit fluxu, sorbitiones frigidiores & crassioris substantiæ offerimus, potusque qui astringentiora participant facultate. Vt liquefactioni plus obstat, non ut aluum sistant. Quod enim iam dissolutum ex membris est à violento febris incendio, retinere intra corpus consilium non est. Ob id diuinus Hippocrates cum in libris de ratione victus multis in locis meminisset fluxus alui in febribus, semel tantum potus astringentis, & crassioris substantiæ sorbitionis meminit. Nèpe cum alius liquida fuerit et liquefaciēs. Videtur mihi, inquit, sorbitiones frigidiores & spissiores offerendas esse & potus qui sistant uino siores uel etiam astringentiores. In reliquis autem aliquando purgationem adhibere suadet, tantum abest ut fluxus eos inhiberi consulat. Vt in eo liquidā aluū habenti &c. Præterea in eo sorbitiones attractorias. Quandoque pedes calefacere iubet caromatis & fascijs ob uolens, ita ut reliquo corpore frigidiores non sint. Ceterum scire oportet omnem uentris fluxum à duabus euenire causis, nempe à noxa facultatis expultricis aut retentricis. Vbi igitur aluus liquida ab irritata expultrice fit, fluxū astringentibus cōpescere haud tutum est, in morbis præsertim acutis. Cū uero ab imbecillitate retentricis aluus liquida fit, cibo & potu astringentibus cobibenda est in omni febre & in omni morbo. Incolliquantibus igitur febribus, ob id quod liquefactio

quefactio retentricis imbecillitatem magis quàm ex pultriciis fortitudinem aut irritationem arguit non immerito Hyp.craſſiores ſorbitiones frigidioresque, & potus qui ſi ſtant uiniſiores astringentiores que miſtrare iubet. Quibuſcunque igitur in morbis alius liquida ob retentricis imbecillitatem fiat, astringenti cibo & potu uti oportet. A ſymptomate potiore quàm a morbo ſumpta indicatione. Cum ijs tamen prius experiri oportebit, quæ moderate astringant, non penitus neglecta ea quæ a morbo ſumitur indicatione. Iis igitur cibarijs potiſſime utemur, quæ leuiſſime ſint coctionis, & bonum præſtent corpori alimentum, parumque grauent ventriculum. Ob defectum primi, carnes bouinæ non competunt, ob ſecundi, lenteſ, ob tertij riſum utile non eſt. Hepata gallinaceorum ſatis aſſa in vino aſtero infuſa non inutilia ſunt. Diu tamen in uentriculo immorantur, quapropter aſſa in vino infuſa in ſorbitiones diſſoluere expediet. Sic enim efficacius retentricem facultatem roborabunt. Succus perdiciſ ſatis aſſe omnia quæ exegimus habet eo tamen uti cum pane ægrotanti commodius erit. Phaſianus ſimiliter optima caro eſt, & magis nutrit, quàm perdix, minus tamen imbecilleſ particulaſ roborat. Caro enim Phaſiani media eſt inter perdicem & pullam gallinaceam. Quæ nam victuſ forma, & qualitaſ ijs qui liqueſcientibuſ detinentur febribuſ conueniat ſupra dictum eſt.

Series literarum.

A B C D E F G H I K L M N O P Q
R S T V X.

Omnes quaterniones, præter X duernionem.



VENETIIS PER IOANNEM RVBEVM
M D LVIII.